

AV. 23 DE ENERO, CON CALLE PÁEZ, PB. CONSULTORIO 11, TELEFONOS: (0257) 2521065 0414 -5777995



Guanare, 11/02/16

Nombre y apellido del paciente: Andrade de Jiménez, María Margarita

Edad: 76 años

Exámenes de Laboratorio: no Motivo de referencia: IUE

Médico o instituto que lo refiere: Dra. María Teresa Arenas

ECOSONOGRAMA RENAL

Se practica estudio con transductor convex de 3,5 MHz por vía transabdominal.

RIÑON DERECHO: 9,59 x 3,87 x 3,23 cm. Volumen: 62,77 ml.

Visible en su posición habitual, forma y tamaño normal, parénquima hipoecóico con el hígado. Seno renal de homogeneidad normal. Relación corticomedular acorde a la edadl, relación parénquima seno normal (3 a 1). No se observaron imágenes sugestivas de litiasis intrarenal.

RIÑON IZQUIERDO: 9,02 x 3,43 x 3,84 cm. Volumen: 62,21 ml.

Visible en su posición habitual, forma y tamaño normal, parénquima hipoecóico con el bazo. Seno renal de homogeneidad normal. Relación corticomedular acorde a la edadl, relación parénquima seno normal (3 a 1). No se observaron imágenes sugestivas de litiasis intrarenal.

VEJIGA: Vacía.

CONCLUSION: Signos ecográficos sugestivos de:

Ecohgrama renal normal







Pelvic Organ Prolapse: An Interactive Guide

POP-Q

Anterior Stage 3

Exam Date: 2/11/2016

Interactive Prolapse Evaluation

Uterus: Yes

-5 C:

D: -7

Aa:

Ba: 2

Ap:

Вр:

pb:

gh:

tvl:

4 10

1

-1

-1 3


Evaluation:

Stage 3

Leading Edge:

Anterior Wall

Print Exam Report



Explosions resid normal

CONCLUSION

00



AV. 23 DE ENERO, CON CALLE PÁEZ. PB. CONSULTORIO 11. TELEFONOS: (0257) 2521065 0414 -5777995



Guanare, 11/02/16

Nombre y apellido del paciente: Andrade de Jiménez, María Margarita

Edad: 76 años

Exámenes de Laboratorio: no Motivo de referencia: IUE

Médico o instituto que lo refiere: Dra. María Teresa Arenas

INFORME DE UROFLUJOMETRIA

El paciente es llevado al set de uroflujometria libre al manifestar deseo miccional, se instruye para la micción la cual realiza de forma voluntaria, mostrando una curva de morfología aplanada, alargada e irregular para un Qmax de 12,2 ml/s y un flujo promedio de 4,4 ml/sec. Tiempo de flujo: 1:05,2 mm/sec. Volumen miccional: 290,6 ml. Residuo urinario: 53,05 ml.

Conclusión diagnostica de acuerdo al nomograma de Liverpool - Haylen et al. :

Flujograma obstructivo (debaje del percentil 5th)

Comentarios y recomendaciones: Cura de prolapso anterior y posterior con malla para prolapso anterior y posterior

0426-4150476 Gladys Jimenez. 0414-9738964 Nieta

Caserio los Garzones - Ospino


UROLIT, C.A.
RIF. J-29697701-1
La Excelencia en Urología



UROLIT, ca Informe de flujometría Versión: 11 Rel 2



Paciente: Andrade de Jimenez, Maria Margarita Médico: José F. Melgar Maguilbray Institución: UROLIT, ca Comentario: INCONTINENCIA URINARIA Comentarios 2: Sexo: Mujer Número: Fecha Nacim.: 22/08/1939 Edad: 76 años Estudio: Uroflow Archivo: Fecha: 11/02/2016 Tiempo: 10:04:44



Resumen de flujometria


Valor Dev (Chica) -41 % -70 % Flujo máximo: 12.2 ml/s Flujo medio: mi/s 4.4 Tiempo de micción: 1:56.2 mm:ss.S -489 % Tiempo de flujo: 1:05.2 mm:ss.S Tiempo del pico de flujo: mm:ss.S -284 % 35.4 Volumen: 290.2 mi

Flujo a los 2 segundos: 0.4 ml/s Aceleración: 0.3 ml/s/s VOID: 12/290/-

Volumen residual: 53,05 ml

UROLIT, C.A.
RIF: J-29697701-1
La Excelencia en Urología

Melgal M nedoutslock chacologics 48,077 C.M. 85



LE PÁEZ. 1. 1065



Guanare, 11/02/16

iménez, María Margarita

eresa Arenas

ECUSUNOGRAMA RENAL

Se practica estudio con transductor convex de 3,5 MHz por vía transabdominal.

RIÑON DERECHO: 9,59 x 3,87 x 3,23 cm. Volumen: 62,77 ml.

Visible en su posición habitual, forma y tamaño normal, parénquima hipoecóico con el hígado. Seno renal de homogeneidad normal. Relación corticomedular acorde a la edadl, relación parénquima seno normal (3 a 1). No se observaron imágenes sugestivas de litiasis intrarenal.

RIÑON IZQUIERDO: 9,02 x 3,43 x 3,84 cm. Volumen: 62,21 ml.

Visible en su posición habitual, forma y tamaño normal, parénquima hipoecóico con el bazo. Seno renal de homogeneidad normal. Relación corticomedular acorde a la edadl, relación parénquima seno normal (3 a 1). No se observaron imágenes sugestivas de litiasis intrarenal.

VEJIGA: Vacía.

CONCLUSION: Signos ecográficos sugestivos de:

Ecohgrama renal normal

Dr José F Melger