APELLIDOS FERNANDEZ CADENAS Lesioloso) 14-02-55 SOLTERA 08-06-11 06-2021 VENEZOLANO flewent Any costillo de pertes de la t.osis f. ene ex lis. + let. foris i amonte evoluis precus fosica \$D. Let. 25.5 /20:00 Inf. When he buce aufulihu Refael Assech.

Kit de teperatomiav Or, Pedro A. Marcano Briti) Seis (6) confo, ser ; Sufures - desurela (0) 1 (The cot for & son fle (00) 1 coffee from co (00) 1 Vicor 1 (00) 2 (1) frobre. 10) 1 9 Serdex. It o alulal. 1 for o adhisino) ceuclésicos (3 amp +v) ; confisi. Fino (3 amp TV) 3 Befide ejaujens 5 1 topa Bocco 9 Salacans 08%. Etnes en le 500 cc O. Mainoso foro V 9 feles # 16 8 18. 9 grantes 3 pares # 8. (Fora Examinar) Lic. Juse Gregorie



UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL ESTE

Av. 23 de Enero al lado del Hospital Clínico del Este. Guanare - Portuguesa.

GUANARE. 05 DE ENERO DE 2016 Teléfono 0257-4161639

INFORME MEDICO

Quien suscribe RAFAEL PARRA BALZA, portador de la cedula de identidad N 10.053.048 CARDIOLOGO en ejercicio, hace constar que FERNANDEZ CADENA, PARMENIA DEL CARMEN. C.I. 4.958.772 acude a esta consulta con los diagnósticos:

- 1. HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA ESTADIO 2
- 2. DIABETES MELLITUS TIPO 2
- 3. INFECCION URINARIA
- 4. STATUS POST SCA: AI ALTO RIESGO (19/014/13)
- 5. NEUROCISTICERCOSIS

Por lo cual debe recibir de manera PERMANENTE Y REGULAR los siguientes medicamentos:

MEDIDAS HIGIENICO DIETETICAS

REGIMEN ALI) TENTICIO, NO INGERIR GRANDES CANTIDADES DE ALIMENTO (1 TAZA). BAIA SAL, SIN CRASAS (SOLO PUEDE COMER HAMON DE PAVO O POLLO Y QUESO PAISA). HARINAS (AREPA JARROZ, PLETANO). CAMEUR, PASTA, YUCA...) HASTA EL MEDIO DIA UNA SOLA RACION NO COMBINAR CARBOHIDRA TOS (EJEMPLO ARROZ Y PLATANO). NO INGERIR BEBIDAS NEGRAS REFRESCOS. DULCES (ENDULZAR CON SPLENDA) MERENDAR UNA FRUTA ENTRE CADA COMIDA Y ANTES DE DORMIR TOMAR MAS DE 8 VASOS DE AQUA DIARIAMENTE.

- TRATAMIENTO MEDICO:
 - O IBERSARTAN 300 MG : UNA TAB A LAS 8 AM
 - C ATENOLOL \$0 MG : UNA TAB A LAS \$ AM Y 08 PM
 - O TENSOMAX NIFEDIPINA LP 30 MG : UNA TAB A LAS 08 PM
 - O ASPIRINA 100 MG: UNA TAB CON EL ALMUERZO.
 - CLOPIDOGREL 75 MG : UNA TAB DIARIA
 - o MICROSER 16 MG : UNA TAB CADA 2 HORAS.
 - O NIMODIPINA 30 MG: UNA TAB CADA 12 HORAS.
 - SOMAZINA \$00 MG : UNA TAB
 - O BIEUGLUCON, UMA TAB CADA 12 HORAS
 - O ZOLTUM : UNA TAB DIARIA
 - O ATOVAROL HO MG : UNA TAB LUEGO DE CENAR
- SE DEBE REALIZAR:
 - o MAPA

CAMAS ESPATE AS PAICE TER DE

CONSULTA MEDICA . DE CARDIOLOGIA Y ANGIOLOGIA , ELECTRICARDIOGRAMAS , ELO ARDIOGRAMAS ESPÉCAS ARRITMIA , MAPA , PRUEBA DE ESFIERZO , EVALUACIONES CARDIOVASURARES PREO ERATORIAS M.S.D.