CONSULTA DE UROLOGÍA SULTA DE UROLOGIA Vajaran wande Ja jaha Comple Nobstanione y my our V Esmeron (1 supella) Ete Loge 13 sept 4 Cleffication () 10/10/11 10/6/2 **XINSULTA DE UROLOGÍA** yajur conde · Profesi Layoda Threm cal 3, supolie) Sutra Sectar 1 (45651) 10/10/15

UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICAS DE JOSE GREGORIO TERAN

Consult 18 C. M. P. Carrera 4 Nº 6-9 Guanare

Teléfono: 0257/2521788 R.IjF: V 07382410-5 Email: terangua@hotmail.com Ticked 6635 Inhadencione> Quirdagias

DR JOSE GREGORIO TERAN

Nefrólogo

50690: 50690 1705: 1705 C.L.: V-7382410

Fecha de Emisión: 04/10/17

Pag. Nro.

Nro. Informe: 01701

INFORME MEDICO

Paciente: RAF.C.L.

CONDE YAJAIRA

1529264

Edad:

50

Sexo:

Estado Civil:

REFERENCIA UROLOGIA

SE TRATA DE PACIENTE YAJAIRA CONDE CON DX

años.

PIONEFROSIS IZQUERDA RIÑON DERECHO (INICO FUNCIONANTE

SE REQUIERE NEFRECTOMIA IZQUIERDA.. CUYO ORGANO YA NO SE LE APRECIA PARENQUIMA FUNCIONANTE

ATTE

Atentamente,





I.P

MAGENES PORTUGUESA C.A.

R.I.F. J-29774281-6 Carrera 4. Edificio Centro Médico Portuguesa. Nº 6-29 Telf. (0257) 2511816, 2531853, 2515159; Fax. (0257) 2512940 Guanare Edo. Portuguesa

NOMBRE: YAJAIRA CONDE.

FECHA:09.10.17

EDAD: 40 AÑOS

UROTAC

Se realiza estudio en cortes axiales, coronales y sagitales, simples, milimétricos, previo topograma en equipo helicoidal.

Riñón derecho: 11x 5,1cm , con morfología y densidades tomográficas normales, sin signos de lesiones focales parenquimatosas ni dilatación del sistema excretor. Uréter derecho no opacificados, sin signos de dilatación.

Riñón izquierdo: 13,4 x 7,4cm , aumentado de tamaño con pérdida de su morfología, con aspecto de gran bolsa hidronefrotica, calcificaciones dispersas.

Uréter izquierdo no opacificados, dilatado en todo su trayecto con imagen calcificada en tercio inferior mide 1,2cm, obstructiva.

Vejiga con forma, paredes y tamaño normal.

Resto de elementos visibles del abdomen con aspecto tomográfico normal.

Conclusión:

Uropatía obstructiva renal izquierda. Hidronefrosis grado IV. Bolsa hidronefrotica, condicionada por Ureterolitiasis izquierda. Correlacionar con clínica y antecedente patológico. Se sugiere valoración y conducta por Urólogo.

Resto de UROTAC simple, dentro de lo normal, como lo descrito.

Dra. Yidanna Torres M. Médico Imagenólogo C.M.P 2365M.S.A.S65764.

Dra. Yido