

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^? = 100$ **2**

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$
- $10^3 = 1000$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^x = 3$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^? = 100$ **2**
- $10^? = 1000$ **3**
- $10^? = 3$ $\log(3)$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^? = 100$ **2**
- $10^? = 1000$ **3**
- $10^? = 3$ $\log(3)$
- $\log(1) =$; $\log(10) =$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^? = 100$ **2**
- $10^? = 1000$ **3**
- $10^? = 3$ $\log(3)$
- $\log(1) = \mathbf{0}$; $\log(10) =$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = \mathbf{0}$; $\log(10) = \mathbf{1}$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) =$; $\log(0,1) =$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) =$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) =$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) =$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) =$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$

4

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$
- $10^{\log(48)} = ?$

4

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$ **4**
- $10^{\log(48)} = ?$ **48**

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$ **4**
- $10^{\log(48)} = ?$ **48**
- $\log(100 \times 1000) = ?$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$ **4**
- $10^{\log(48)} = ?$ **48**
- $\log(100 \times 1000) = ?$
- $\quad = \log(100) + \log(1000)$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$ **4**
- $10^{\log(48)} = ?$ **48**
- $\log(100 \times 1000) = ?$
- $= \log(100) + \log(1000)$
- $= 2 + 3$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$ **4**
- $10^{\log(48)} = ?$ **48**
- $\log(100 \times 1000) = ?$
- $= \log(100) + \log(1000)$
- $= 2 + 3$
- $= 5$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$
 - $10^{\log(48)} = ?$
- 4**
- $\log(100 \times 1000) = ?$
 - $= \log(100) + \log(1000)$
 - $= 2 + 3$
 - $= 5$
- 48**
- $\log\left(\frac{1000}{10}\right) = ?$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$
 - $10^{\log(48)} = ?$
- 4**
- $\log(100 \times 1000) = ?$
 - $= \log(100) + \log(1000)$
 - $= 2 + 3$
 - $= 5$
- 48**
- $\log\left(\frac{1000}{10}\right) = ?$
 - $= \log(1000) - \log(10)$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est l'**exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$
- $10^{\log(48)} = ?$

4
48

- $\log(100 \times 1000) = ?$
- $= \log(100) + \log(1000)$
- $= 2 + 3$
- $= 5$
- $\log\left(\frac{1000}{10}\right) = ?$
- $= \log(1000) - \log(10)$
- $= 3 - 1$

Récapitulatif : logarithme décimal

NE PAS RECOPIER

1. Définition et valeurs

- $\log(b)$, c'est **l'exposant** à mettre sur 10 pour obtenir b .
- $10^2 = 100$ **2**
- $10^3 = 1000$ **3**
- $10^{\log(3)} = 3$ **$\log(3)$**
- $\log(1) = 0$; $\log(10) = 1$
- $\log(100) = 2$; $\log(0,1) = -1$

2. Règles à retenir

- $\log(10^x) = x$
- Pour $x > 0$, $10^{\log(x)} = x$
- La fonction $\log$ est **croissante**.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$
- $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$

3. Mini-exemples

- $\log(10^4) = ?$
- $10^{\log(48)} = ?$

4
48

- $\log(100 \times 1000) = ?$
- $= \log(100) + \log(1000)$
- $= 2 + 3$
- $= 5$
- $\log\left(\frac{1000}{10}\right) = ?$
- $= \log(1000) - \log(10)$
- $= 3 - 1$
- $= 2$