

## Задачи студенческого конкурса Санкт-Петербургского Математического Общества. 2010 год.

Вниманию петербургских студентов-математиков предлагается домашний конкурс. Подобные конкурсы проводились неоднократно в прошлом. Большинство участников представляло мат-мех СПбГУ, на предыдущем конкурсе один из победителей был с физ-фака.

Победители конкурса получают премии Матобщества.

Студенты из других городов или стран могут присылать свои решения по электронной почте (см. ниже) на русском или английском языке. Жюри обещает проверить их и сообщить результаты проверки участникам. Большое количество способных студентов в мире и скромные финансовые возможности Общества не позволяют, к сожалению, обещать премии иногородним участникам.

Идея конкурса (в отличие от олимпиад) в решении задач, в основном, исследовательского характера, которые не решаются одним приемом, а требуют серьезных и неспешных раздумий.

Конкурс проводится под эгидой Санкт-Петербургского математического общества. Образовано жюри в составе Д. В. Карпов, А. И. Назаров, Ф. В. Петров (председатель).

В конкурсе могут принимать участие студенты всех курсов. Итоги среди первокурсников будут подводиться отдельно, если только они не победят всех, как случилось. Допускаются коллективные (не более трех человек) работы.

В предлагаемом списке имеются задачи различной трудности, от сравнительно несложных до нерешенных проблем. Участники могут выбрать задачи по вкусу и подавать решения *любого набора* задач, *даже одной*. Принимаются решения частей задач, состоящих из нескольких пунктов.

Условия задач размещены на мат-мехе СПбГУ и на студенческой странице сайта Санкт-Петербургского математического общества

Срок подачи работ **15 мая 2010 г.**

Текст решений должен быть аккуратно оформлен и подписан (фамилия, имя, отчество, университет, факультет, курс, группа).

Решения можно (этот способ рекомендуется!) набрать в TeXе и послать .tex, .dvi или .pdf файл по адресу [fedyapetrov@gmail.com](mailto:fedyapetrov@gmail.com); сдать Татьяне Олеговне Евдокимовой (мат-мех, кафедра анализа, комн. 4518) или оставить на вахте в ПОМИ РАН (наб. р. Фонтанки, 27) на имя Ф. В. Петрова с пометкой *студенческий конкурс*.

## Условия задач

1. Плоскость разбита на параболы (каждая точка плоскости принадлежит ровно одной параболе). Обязательно ли все их оси сонаправлены?
2. а) Существует ли такое сепарабельное банахово пространство  $X$ , что любое банахово пространство  $Y$ , изоморфное  $X$ , линейно изометрично  $X$ ?  
б) А не сепарабельное?
3. Рассмотрим утверждение  $P(k, n)$ : если в некотором поле  $-1$  есть сумма  $k$  квадратов, то  $-1$  есть сумма конечного количества  $n$ -ых степеней.  
а) Докажите  $P(1, n)$  при всяком  $n$ .  
б) Докажите  $P(k, 4)$  при всяком  $k$ .  
в) Верно ли утверждение  $P(k, n)$  при всех  $k, n$ ?
4. Функция  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  удовлетворяет уравнению  $f(x) = f(\frac{x}{2}) + f(\frac{x+1}{2})$  для всякого  $x \in [0, 1]$ . Обязательно ли  $f(x) = c(1 - 2x)$  при некотором вещественном  $c$ , если  
а)  $f \in C^2[0, 1]$ ; б)  $f \in C^1[0, 1]$ ; в)  $f \in C[0, 1]$ ?
5. Простое число  $p > 3$  и целые  $a, b$  таковы, что  $a^2 + ab + b^2$  делится на  $p$ . Докажите, что  $(a + b)^p - a^p - b^p$  делится а) на  $p^2$ ; б) на  $p^3$ .
6. 1-периодическая непрерывная функция  $f(x)$  такова, что для всякого иррационального  $x$  суммы  $f(x) + f(2x) + \dots + f(nx)$  ограничены некоторой константой, зависящей только от  $x$ , но не от  $n$ . Докажите, что  $f(x)$  — тригонометрический многочлен (то есть многочлен от  $\cos 2\pi x$  и  $\sin 2\pi x$ ).
7. Докажите, что при всяком натуральном  $n$  на плоскости можно выбрать многоугольники  $F, F_1, F_2, \dots, F_n$ , получающиеся друг из друга параллельными переносами, так, что никакие два из них не имеют общих внутренних точек, но  $F$  и  $F_i$  имеют общие (граничные) точки при всяком  $i = 1, 2, \dots, n$ .
8. Рассмотрим в  $\mathbb{R}^d$  сферу  $S^{d-1}$  и точку  $P$ . Назовем характеристикой вписанного в сферу симплекса  $T$   
а) произведение объема  $T$  на сумму квадратов расстояний от  $P$  до вершин  $T$ ;  
б) произведение объема  $T$  на сумму квадратов попарных расстояний между вершинами  $T$ .  
Докажите, что если вписанный в сферу многогранник разбит на вписанные в нее тетраэдры, то сумма характеристик не зависит от способа разбиения  $\alpha$ ) при  $d = 2$ ;  $\beta$ ) при  $d = 3$ ;  $\gamma$ ) при произвольном  $d$ .
9. Рассмотрим топологическое пространство  $\mathbb{R}^\infty$  всех вещественных последовательностей  $(x_1, x_2, \dots)$  с топологией прямого произведения. Назовем две последовательности  $x, y$  эквивалентными, если  $x = \lambda y$  при некотором  $\lambda > 0$ . Пространство ненулевых классов эквивалентности, наделенное фактортопологией, назовем  $S$  (это бесконечномерный аналог сферы). Докажите, что пространство  $S$   
а) хаусдорфово, но  
б) любая непрерывная функция  $S \rightarrow \mathbb{R}$  постоянна.
10. Для данного  $q > 1$  положим

$$F(t) = \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} \frac{x dx}{\sqrt{1 + tx - |x|^q}},$$

где  $x_1$  и  $x_2$  — корни знаменателя. Легко видеть, что  $x_{1,2}(0) = \mp 1$  и  $F(0) \equiv 0$ .

а) Вычислите  $F'(0)$ .

б) Найдите все значения параметра  $q$ , для которых  $F'(0) = 0$ .

11. Для положительного рационального числа  $x$  обозначим через  $\ell(x)$  высоту цепной дроби числа  $x$  (иными словами,  $\ell(x)$  есть количество шагов в алгоритме Евклида для числителя и знаменателя дроби, задающей  $x$ .) Так,  $\ell(17/5) = 3$ , так как  $17/5 = 3 + 1/(2 + 1/2)$ . Докажите а) при  $r = 2$ ; б) при любом положительном рациональном  $r$ , что для некоторых положительных констант  $c_1(r)$ ,  $c_2(r)$  имеет место неравенство  $c_1(r) \cdot \ell(x) \leq \ell(rx) \leq c_2(r) \cdot \ell(x)$ .

Постарайтесь получить как можно лучшие оценки на  $c_1(r)$ ,  $c_2(r)$  в терминах  $r$ .

12. В графе  $G$  (неориентированном, без петель и кратных ребер)  $3n$  вершин, при этом размер (количество вершин) максимальной клики (полного подграфа) равен  $n$ , и найдутся три непересекающиеся клики размера  $n$ . Обозначим через  $f(n)$  наименьшее количество цветов, в которое заведомо можно покрасить такой граф.

а) Докажите, что  $f(5) = 8$ .

б) Докажите, что  $f(n) \leq 8n/5$  при всех  $n$ .