

근골격계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 근골격계 (CHAPTER 8).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19
- 문 20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37
- 문 38
- 문 39
- 문 40
- 문 41
- 문 42
- 문 43
- 문 44
- 문 45
- 문 46
- 문 47
- 문 48
- 문 49
- 문 50
- 문 51
- 문 52
- 문 53
- 문 54

문 01 고관절 관절염 진단검사

문항 75세 여자의 오른쪽 고관절에 관절염이 의심될 때 예상되는 진단검사 결과는?

보기

1. 골밀도가 증가되어 있음
2. 척주의 추간판이 파열됨
3. 오른쪽 고관절의 관절강이 좁아져 있음
4. 대퇴골두(femoral head)에 압박골절이 보임
5. 오른쪽 고관절의 골두에 석회화가 보임

문 02 콜히친 부작용

문항 급성 통풍을 진단받은 75세 남자에게 콜히친(colchicine) 정맥투여를 한 후 관찰해야 하는 부작용은?

보기

1. 설사
2. 실신
3. 고열
4. 심정지
5. 골수억제

문 03 구획증후군

문항

75세 남자가 대퇴골 골절로 입원하여 골절정복 수술을 하고 오른쪽 다리에 전체 석고붕대를 적용하고 있다. 수술 후 6시간이 경과하였을 때 통증조절을 위해 모르핀이 정맥투여되고 있음에도 석고붕대를 한 다리에 통증이 여전히 심하고 발이 바늘로 찌르는 듯 따끔거린다고 호소한다. 오른쪽 족배동맥의 맥박이 촉진되지 않으며 발톱의 모세혈관 재충전검사에서 지연된 충전반응을 보이고 발에 부종이 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 구획증후군
2. 말초혈관염
3. 수술부위 감염
4. 급성 폐색전증
5. 급성 심부정맥 혈전증

문 04 류마티스 관절염 진단기준

문항

손목관절의 통증을 호소하여 내원한 45세 여자에게 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis; RA)이 의심되었다. 다음 건강력 문진내용 중 RA 진단기준에 해당하는 내용은?

보기

1. 반점이 최근 심해졌어요.
2. 다리를 구부릴 때마다 소리가 납니다.
3. 양쪽 관절에 통증이 두 달 이상 지속됩니다.
4. 오후가 되면 관절이 뻣뻣하고 움직이기 힘들어요.
5. 지난주부터 팔목 관절에 증상이 시작되었어요.

문 05 고관절 전치환술 후 금기자세

문항 75세 여자가 고관절 전치환술(total hip replacement; THR)을 받고 퇴원하였다. THR 부위가 이탈되는 위험이 있어 피해야 할 자세는?

보기

1. 복위
2. 양와위
3. 고관절 굴곡
4. 무릎의 신전
5. 고관절의 외회전

문 06 근력 사정(2점)

문항 근골격계 신체검진으로 근력을 사정하고 있다. 손상된 손의 근력이 2점이었다면 어떤 상태인가?

보기

1. 일상 활동을 하기에 충분함
2. 근육의 수축이 전혀 느껴지지 않음
3. 중력에 거슬러 손을 들어 올릴 수 있음
4. 근육이 약간 수축하는 것이 느껴지나 움직임이 거의 없음
5. 몸 가까이 손을 끌어당길 수 있으나 들어 올릴 수 없음

문 07 골관절염 초기 중재

문항 72세 여자가 6개월 전부터 손가락 말단 지골간 관절이 붓고 통증이 심해져서 내원하여 골관절염을 진단받았다. 미국 류마티스학회에서 권장하는 골관절염 환자의 초기 중재는?

보기

1. 운동과 체중감소
2. 조기 관절 치환술
3. 고용량 스테로이드
4. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs)
5. 철저한 진단검사가 완료된 후 치료시작

문 08 류마티스 관절염 통증조절

문항 다음 중 류마티스 관절염 환자의 통증을 지속적으로 조절하기 위해 가장 효과적인 중재는?

보기

1. 냉찜질
2. 규칙적 운동
3. 고용량 스테로이드
4. 심부 열패드 적용
5. 경피적 전기신경자극(TENS)

문 09 급성 요통 신경학적 장애

문항 급성 요통을 호소하는 환자의 건강사정 결과 신경학적 장애가 의심되는 내용은?

보기

1. 방광 기능장애를 보임
2. 심각한 외상 병력이 있음
3. 양와위에서 통증이 있음
4. 하지의 반사, 근력, 감각이 저하됨
5. 양쪽 발목에 대칭적인 부종이 관찰됨

문 10 팔렌검사 / 수근관증후군

문항 56세 여자가 손등을 90도로 맞대고 60초를 버티게 하는 팔렌검사(Phalen test) 시 통증을 호소하였다면 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. ulnar tunnel syndrome
2. carpal tunnel syndrome
3. tarsal tunnel syndrome
4. radial tunnel syndrome
5. myofascial pain syndrome

문 11 발목 염좌 초기 48시간

문항 발목 염좌로 인한 손상이 있는 환자에게 첫 48시간 동안 제공되어야 할 중재는?

보기

1. 저항성 발목 운동
2. 휴식과 발목 상승
3. 발목의 저항도 스트레칭
4. 열과 냉찜질 교환요법
5. 방사선 촬영 후 정형외과 의뢰

문 12 대퇴골 스트레스 골절 초기 중재

문항 대퇴골에 스트레스 골절이 나타난 환자에게 제공되는 초기 중재는?

보기

1. 일상활동을 지속하도록 한다.
2. 수술을 통해 골절정복을 한다.
3. 활동을 한 후에는 얼음찜질을 한다.
4. 매일 수동적인 관절범위운동을 시행한다.
5. 뼈에 추가적인 부담을 주지 않기 위해 휴식한다.

문 13 전신홍반루푸스 진단검사(ANA)

문항 다음 중 양성이 나올 때 전신홍반루푸스(systemic lupus erythematosus)의 진단기준에 포함되는 검사는?

보기

1. HLA-B27
2. rheumatoid factor (RF)
3. anti-nuclear antibody (ANA)
4. Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
5. High sensitivity C-reactive protein (HS-CRP)

문 14 급성 통풍 치료에 부적절한 약물

문항 Hydrochlorothiazide를 복용하고 있는 고혈압 환자에게 엄지발가락의 극심한 통증이 발생하여 통풍으로 진단받았다. 다음 중 급성 통풍을 치료하기 위해 적절하지 않은 약물은?

보기

1. Allopurinol
2. Prednisone
3. Colchicine
4. Indomethacin
5. Naproxen

문 15 요통 영상진단 시점

문항

2주 전 뒷마당에서 나무를 심다가 발생한 요통을 호소하여 50세 남자가 내원하였다. 허리의 통증은 오른쪽 다리로 가끔 방사되며 통증이 있으면 ibuprofen을 먹었다고 한다. 특별히 건강상 문제는 없으며 건강한 편이었다. 이 환자의 통증이 어느 정도 지속된 후 영상진단검사가 요구되는가?

보기

1. 통증 발생 2주 후
2. 통증 발생 4주 후
3. 통증 발생 6주 후
4. 통증 발생 8주 후
5. 영상진단검사가 요구되지 않음

문 16 골다공증 골밀도검사 대상자

문항

다음 골다공증의 위험군으로 판단되어 골밀도검사 스크리닝이 요구되는 대상자는?

보기

1. 몸집이 작고 과체중인 30대 여자
2. 주 1회 음주하는 40세 아시아 여자
3. 골절된 적이 없는 55세 폐경 후 여자
4. 비교적 건강한 편인 65세 남자
5. 류마티스 관절염이 있는 60세 남자

문 17 요추좌상 활동 교육

문항

40세 남자가 무거운 책상을 들다가 발생한 요통이 있어 내원하여 요추좌상(lumbar strain)으로 진단받았다. 걷기만 해도 요통이 심해진다고 하여 일상활동을 하기가 두렵다고 호소하는 환자에게 할 수 있는 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 침상안정을 하시면 요통이 완화됩니다.
2. 일상활동은 하시더라도 걷는 것은 피하세요.
3. 앞으로 3일간 모든 일상활동을 중지하세요.
4. 일상활동을 하다가 통증이 나타나면 침상안정합니다.
5. 일상활동과 함께 걷기를 건딜 수 있는 만큼 조금씩 늘려가세요.

문 18 족저근막염 중재

문항

평소 건강하던 45세 남자가 등산을 다녀온 후 왼쪽 발 뒤꿈치에 심한 통증이 있어 내원하였다. 아침에 일어나서 발을 디딜 때 극심한 통증을 느낀다고 하며 외상 병력은 없다고 한다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 항생제
2. 휴식과 얼음찜질
3. 고용량 스테로이드 정맥투여
4. 5km/hr 속도로 매일 1시간 걷기
5. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs) 장기복용

문 19 골관절염 1차 치료약물

문항 골관절염이 있는 65세 환자가 비약물적 치료중재를 받은 후에도 통증이 지속되고 있다. 미국 류마티스학회에서 권장하는 통증완화를 위한 1차 치료약물은?

보기

1. Naproxen
2. Steroid
3. Ibuprofen
4. Tramadol
5. Acetaminophen

문 20 골관절염 통증 미완화 중재

문항 75세 여자가 오른쪽 무릎에 경증의 골관절염을 진단받았다. 비교적 건강한 편으로 다른 만성질환은 없으며, 무릎 통증으로 acetaminophen 2000 mg을 매일 투약하고 있는데 통증이 완화되지 않는다고 한다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. NSAIDs로 처방을 변경한다.
2. acetaminophen을 하루 4000 mg으로 증량한다.
3. acetaminophen 현재 용량을 유지하면서 물리치료를 병행한다.
4. acetaminophen 현재 용량을 유지하면서 수술여부를 고려한다.
5. 48시간 침상안정을 한 후 일상활동에서 통증유발 활동을 피하도록 한다.

문 21 어깨 외상 초기 중재

문항

50세 남자가 사다리를 타고 작업을 하다 떨어져 벽에 오른쪽 어깨를 부딪친 후 심한 통증이 있어 내원하였다. 통증 강도는 10점 척도에서 7점 정도라고 하며, 통증이 어깨로부터 팔까지 방사된다고 한다. 초기 중재로 적절한 것은?

보기

1. 진통제를 정맥투여 한다.
2. 물리치료를 받도록 의뢰한다.
3. 오른쪽 어깨와 팔에 방사선 촬영을 요청한다.
4. 오른쪽 어깨를 3일간 고정하여 움직이지 않도록 한다.
5. 휴식을 취하고 얼음찜질과 함께 진통제(naproxen)를 1주일간 처방한다.

문 22 경골 스트레스 골절 설명

문항

장거리 마라톤에 참가했던 60세 남자가 다리통증으로 응급실에 내원하여 경골에 스트레스 골절(tibial stress fracture)을 진단받았다. 앞으로의 치료단계를 묻는 환자에게 적절한 설명은?

보기

1. 2주간 휴식 후 치료를 시작합니다.
2. 진통제는 회복을 지연시키므로 금합니다.
3. 방사선 촬영을 하여 진단을 확인하게 됩니다.
4. 휴식과 함께 다양한 대체운동이 처방됩니다.
5. 일상생활을 하면서 목발을 사용하게 됩니다.

문 23 통풍 위험요소

문항 급성 통풍성 관절염을 진단받은 환자가 자신이 왜 질병에 걸렸는지 문의하였다. 다음 중 통풍의 위험요소에 해당하는 것은?

보기

1. 비만
2. 여자
3. 흡연
4. 관절의 외상
5. 류마티스 관절염

문 24 골관절염 증상

문항 골관절염 환자가 호소하는 증상을 가장 잘 설명한 것은?

보기

1. 얼굴의 홍조
2. 휴식 시 나타나는 요통
3. 피부병변이 동반되는 곤봉형 손가락
4. 체중 부하관절에 오후부터 심해지는 통증
5. 이른 아침 관절에 대칭적으로 나타나는 뻣뻣함

문 25 골관절염 혈액검사 결과

문항 골관절염이 의심되는 환자의 혈액검사에서 예상되는 결과는?

보기

1. 만성적 염증상태
2. C반응 단백(CRP) 수준 상승
3. 검사결과 특이사항 없음
4. antinuclear antibody(ANA) titer 상승
5. Rheumatoid factor 상승

문 26 류마티스 관절염 사망원인

문항 류마티스 관절염 환자의 대표적인 사망원인은?

보기

1. 감염
2. 심근경색
3. 종양
4. 신부전
5. 패혈증

문 27 SLE와 임신

문항 26세 여자가 피로와 관절통증이 있어 내원하여 전신홍반루푸스(SLE)를 진단받고 치료 중이다. 증상이 호전되면서 퇴원을 앞두고 있을 때 환자는 간호사에게 곧 아기를 가지려고 계획하고 있다고 말하였다. 이 환자에게 할 설명으로 옳은 것은?

보기

1. SLE 환자는 임신 가능성이 없습니다.
2. SLE 환자는 유산의 위험이 높습니다.
3. SLE의 증상이 조절되면 임신이 가능합니다.
4. 임신이 되면 SLE 치료는 중단되어야 합니다.
5. SLE 환자가 임신하면 태아에게도 루푸스가 나타납니다.

문 28 드퀘르뱅 건초염(그림)

문항

사무직으로 일하던 20대 여자가 주먹을 쥐거나 손목을 돌릴 때 통증이 있어 내원하였다. 최근 보고서 작성이 많아 늦게까지 컴퓨터 작업을 했다고 한다. 다음 그림과 같이 손목을 돌릴 때 급성의 심한 통증을 호소한다면 다음 중 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 방아쇠 수지(trigger finger)
2. 드퀘르뱅 건초염(DeQuervain tenosynovitis)
3. 뒤퍄트렌 구축(Dupuytren's contracture)
4. 요골신경 손상(radial nerve injury)
5. 수근관증후군(carpal tunnel syndrome)

p.163 원문(그림 포함)

문 29 골다공증에 도움되는 항고혈압제

문항

항고혈압제를 복용 중인 75세 여자가 골다공증으로 진단받았다. 이 환자의 항고혈압제 중 골다공증에도 도움이 되는 약물은?

보기

1. 이뇨제
2. 베타차단제
3. 칼슘통로차단제
4. 안지오텐신 II 수용체 길항제
5. 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제제

문 30 임신부 진통제 선택

문항

현재 임신 3개월인 30세 여자가 아들과 놀이동산에 다녀온 후 오른쪽 무릎에 통증이 심해 밤에 잠을 잘 수 없어 내원하였다. 진통효과를 위해 임신부가 선택할 수 있는 약물은?

보기

1. Prednisone (Sterapred)
2. Acetaminophen (Tylenol)
3. Naproxen sodium (Aleve)
4. Baby aspirin (Bayer)
5. 저용량 Ibuprofen (Advil)

문 31 무릎 Grade II 염좌 초기 중재

문항

50세 남자가 아침에 조깅을 하다가 발을 헛디뎈 무릎이 뒤틀린 후 통증이 심해져 내원하였다. 무릎이 심하게 부어 있고 만지면 통증을 호소한다. Grade II 염좌로 진단받았을 때 환자에게 설명하는 적절한 초기 중재는?

보기

1. 손상된 무릎에 방수드레싱을 부착한 후 온수 샤워를 한다.
2. 첫 24시간동안 냉찜질을 하다가 이후 온찜질을 지속한다.
3. 2시간마다 침상밖으로 나와 목발로 지지하여 가볍게 걷게 한다.
4. 24시간 후 무릎의 관절범위 운동을 다시 확인하여 등척성 운동을 시작한다.
5. 지금부터 48시간 동안 냉찜질을 간헐적으로 적용하고 손상된 다리를 상승시킨다.

문 32 NSAIDs 위장장애 기전

문항

류마티스 관절염을 진단받고 장기간 비스테로이드성 항염제(NSAIDs)를 복용하던 70세 여자가 위장장애가 있어 내원하였다. 관절염 약을 복용하는데 왜 위장장애가 생기냐고 묻는 환자에게 할 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 약물이 직접 위 점막을 자극하므로
2. 프로스타글란딘 합성을 강화시키므로
3. 약물의 효과로 위장관 운동이 감소하므로
4. 위장관 점막을 보호하는 물질의 합성을 억제하므로
5. 류마티스 관절염 진통효과를 위해 고용량이 처방되므로

문 33 NSAIDs 위병변 고위험 환자

문항

다음 중 비스테로이드성 항염제(NSAIDs)에 의한 위병변이 발생할 위험이 가장 높은 환자는?

보기

1. 오랜 기간 하루에 4번씩 아스피린을 복용하는 72세 관절염 환자
2. 현재 흡연하고 있으며 월경통이 심하여 매달 월경 기간에 naproxen을 6번 복용하는 40세 여자
3. 요통이 있으면 ketoprofen을 주당 1~2회 복용하는 43세 확장성 심근병증 환자
4. 발목염좌로 지난주 ibuprofen을 복용하였고 주말에는 4~6캔의 맥주를 마신 28세 남자
5. 계절이 바뀔 때마다 편두통이 나타나면 아스피린을 최대용량으로 복용하는 18세 여자

문 34 섬유근육통 추가교육 필요

문항 섬유근육통을 진단받은 환자에게 퇴원교육을 하였다. 환자가 말한 내용 중 추가교육이 필요하다고 생각되는 경우는?

보기

1. 커피는 한잔으로 줄여보겠습니다.
2. 짜고 기름진 음식은 피하고 건강식으로 먹으려고요.
3. 생활하면서 스트레스를 받지 않으려고 노력할게요.
4. 유연성 강화를 위해 스트레칭 프로그램에 참가할 거예요.
5. 통증관리를 위해 매일 아침 조깅을 시작하려고 합니다.

문 35 골관절염 주 치료목표

문항 골관절염의 주 치료목표는?

보기

1. 관절기능을 보존한다.
2. 연골의 파괴를 예방한다.
3. 연골의 생성을 촉진시킨다.
4. 일상활동을 최대수준으로 향상시킨다.
5. 통증 없이 매일 뛸 수 있게 한다.

문 36 급성 통풍발작 주요 요인

문항 통풍 환자에게 급성 통풍발작을 초래하는 주요 요인은?

보기

1. 활동과다
2. 고도 비만
3. 고요산혈증
4. 알코올 과다섭취
5. 퓨린 함유 음식의 과다섭취

문 37 통풍에 이노제 금기 이유

문항 통풍 환자에게 이노제 처방을 금하는 이유는?

보기

1. 급성 통풍발작을 초래하므로
2. 혈장 용량을 변화시키기 때문에
3. 전해질 불균형이 초래되므로
4. 사구체여과율을 감소시키므로
5. 신장에서 요산이 배설되는 것을 감소시키므로

문 38 DVT 위험이 가장 낮은 경우

문항 다음 중 심부정맥 혈전증(DVT)의 발생 위험이 가장 낮은 경우는?

보기

1. 무릎 전치환술을 받은 70세 여자
2. 담낭절제술을 받은 건강한 35세 여자
3. 복부동맥류 수술을 받은 60세 남자
4. 고관절 전치환술을 받은 건강한 80세 여자
5. 관상동맥조영술을 받은 비만인 50세 남자

문 39 류마티스 관절염 중증도 설명

문항 류마티스 관절염을 진단받은 35세 여자가 자신의 엄마도 이 질환으로 고생하는 것을 보았다며 어느 정도 심각한 질병인지 물었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 심각한 질병이 아니고 정상에 가까운 생활을 유지하실 수 있습니다.
2. 심각한 전신질환으로 5년 생존율이 4기 호지킨병이나 3혈관 관상동맥질환과 유사합니다.
3. 질병의 진행속도가 빠르지 않아 이전에 비해 덜 심각한 단계로 분류하고 있습니다.
4. Epstein-Barr 바이러스에 의해 노출되어 발생하는 질환으로 치료가 가능합니다.
5. 침범된 국소 부위만 기능소실을 가져오므로 일상활동에 미미한 장애가 예상됩니다.

문 40 여성 운동선수 3징후

문항 정기 신체검진을 하러 고등학교 여자 배구팀이 내원하였다. 이들을 검진하면서 나타난 다음 징후 중 여자 운동선수들에게 신체손상을 초래하는 세 징후(female athlete triad)에 포함되는 것은?

보기

1. 높은 불안감
2. 낮은 자존감
3. 서맥
4. 섭식장애
5. 족저근막염

문 41 골다공증 교육(약물 거부)

문항 골다공증을 진단받은 62세 여자가 호르몬 대체요법을 포함하여 골밀도를 높이는 어떤 약도 복용하지 않겠다고 거부하였다. 이 환자의 건강관리를 위해 효과적인 교육내용은?

보기

1. 관절전치술에 대한 정보
2. 매년 골밀도 사정을 해야하는 이유
3. 칼슘섭취와 함께 체중부하운동을 하는 효과
4. 칼슘배설을 촉진시키는 음식종류
5. 호르몬대치요법의 장단점

문 42 혈우병(혈관절증)

문항 생후 8개월의 남아가 양쪽 무릎에 혈관절증(hemarthrosis)과 혈뇨가 있어 내원하였다. 외상 병력은 없으나 부모는 아이가 항상 멍이 잘 들곤 했다고 말하였다. 이 환아에게 의심되는 상태는?

보기

1. 가정 폭력
2. 백혈병
3. 혈우병
4. 특발성 혈소판감소증
5. 류마티스 관절염

문 43 무릎 전치환술 후 합병증

문항 무릎 전치환술을 받고 입원 중인 환자에게 가장 흔히 나타나는 합병증은?

보기

1. 욕창
2. 패혈증
3. 지방색전증
4. 신전근 기능장애
5. 심부정맥혈전증(DVT)

문 44 욕창 설명

문항 요양원에서 장기간 침상생활을 하는 85세 남자에게 발생한 욕창에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 욕창 치료에서는 항생제를 사용할 수 없다.
2. 연쇄상 구균이 패혈성 욕창을 발생시키는 주요 균이다.
3. 노인의 영양상태를 향상시키면 욕창의 위험이 줄어든다.
4. 갑상선 저하증은 노인에게 욕창 발생을 촉진시킨다.
5. 둔부에 적용하는 패드는 욕창 발생을 촉진시킨다.

문 45 노인 변비 요인

문항 노인에게 변비를 초래하는 대표적인 요인은?

보기

1. 부동
2. 불안
3. 이뇨제
4. 고단백식이
5. 다량의 수분섭취

문 46 강직성 척주염 중재

문항 강직성 척주염을 진단받은 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 침상안정
2. 금염(gold salts)
3. 스테로이드 경구투여
4. 스테로이드 관절내 주입
5. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs) 처방

문 47 고관절 THR 후 DVT 근거

문항

오른쪽 고관절 전치환술을 받은 80세 여자가 수술 후 3일째인 오늘 아침 왼쪽 다리의 부종과 통증이 있으며 신체검진 시 Homan 징후가 양성이다. 심부정맥 혈전증(DVT)을 의심하는 근거에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 고관절 수술 후 DVT는 주로 80세 이상에서 나타난다.
2. 수술 후 항응고제 투여가 금기이므로 DVT 위험이 높아진다.
3. 고관절 전치환술 후 50% 이상의 환자에게 DVT가 발생한다.
4. DVT 환자의 대부분은 Homan 징후가 양성이다.
5. 고관절 전치환술의 경우 압박스타킹이 금기이므로 DVT 발생이 높아진다.

문 48 DVT 가장 심각한 합병증

문항

심부정맥 혈전증(DVT)의 가장 심각한 합병증은?

보기

1. 뇌색전
2. 폐색전증
3. 심근경색
4. 말초혈관염
5. 말초혈관색전

문 49 지방색전증

문항

교통사고로 내원한 40세 여자가 골반 골절을 진단받고 입원하였다. 입원 2일째 호흡곤란과 고열(39°C)이 있으며 의식의 혼돈을 보인다. 신체검진에서 Homan 징후는 음성이었으며 양쪽 폐 하엽에 수포음이 들리고 흉부 방사선에서 폐 전반적으로 폐포 충만성 병변(alveolar filling pattern)이 보이며 동맥혈가스분석에서 저산소증이 있다. 이 환자에게 가장 의심되는 상태는?

보기

1. 폐색전증
2. 지방색전증
3. 수술후 무기폐
4. 흡인 폐렴
5. 수술부위 감염

문 50 경추 신경근증 / 추간판탈출 중재

문항

50세 여자가 급성 경추 신경근증과 흉추 5번의 추간판탈출증을 진단받았다. 이 환자에게 가장 효과적인 중재는?

보기

1. 경추 견인
2. 능동적 저항운동
3. 스테로이드 정맥투여
4. 수동적 관절범위 운동
5. 경추 칼라(cervical collar)

문 51 고관절 외전근 평가검사

문항 다음 중 골반의 안정성을 위한 고관절 외전근의 능력을 평가하기 위한 검사는?

보기

1. Phalen's test
2. Tinel's sign
3. Trendelenburg test
4. Kernig's sign
5. Homan's sign

문 52 요통 감별진단

문항 심한 요통이 있는 환자의 감별진단으로 고려되어야 하는 것은?

보기

1. 간염
2. 담석증
3. 골수염
4. 심근경색
5. 소화성 궤양

문 53 대퇴골두 무혈관성 괴사 요인

문항 걸을 때 통증이 있어 절뚝거리게 되어 내원한 40세 남자가 대퇴골두의 무혈관성 괴사를 진단받았다. 무혈관성 괴사를 초래하는 가장 흔한 요인은?

보기

1. 외상
2. 알코올 중독
3. 고지혈증
4. 류마티스 관절염
5. 스테로이드 복용

문 54 장기 스테로이드 복용자 수술 전 검사

문항 류마티스 관절염으로 장기간 스테로이드를 복용하고 있는 50대 여자가 일반 마취로 담낭절제술을 받기로 예정되어 있을 때 수술 전 시행해야 할 검사는?

- 보기**
1. 심전도
 2. 심초음파
 3. 흉부 방사선촬영
 4. 스트레스 검사
 5. 경추방사선촬영

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.