

a
800 km
50°N
40°N
30°N
20°N
90°E
100°E
110°E
120°E
130°E
Birdwatchers, 2014–2023
No record
1–10
11–100
101–1,000
>1,000
Desert-flagged counties
b
Composition of records in flagged counties
Passer montanus 2.4
Tadorna ferruginea 1.5
Motacilla alba 1.5
Hirundo rustica 1.4
Pica serica 1.2
Milvus migrans 1.2
Falco tinnunculus 1.1
Buteo hemilasius 1.1
Streptopelia decaocto 1.1
Podiceps cristatus 1.0
16 desert specialists, combined 2.3
0
1
2
3
Share of species records (%)
c
Table S17 subgroups replicated exactly
–2.10%
Power
National 93%
Non-desert 91%
Non-desert, effort terms 97%
Desert 18%
Desert, effort terms 24%
Desert, corrected 24%
Desert, north-western provinces 9%
Three-North 38%
−6
−3
0
3
6
9
Effect per s.d. of PSI (% of outcome mean)
d
Analytical power by design
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Power
MDE –5.6%
National
Non-desert
Desert
Desert, corrected
−8
−6
−4
−2
0
True effect per s.d. of PSI (% of outcome mean)