
a
Within ±2 quarters: 77%
(95% CI 68–84%; n = 100)
Sites
0
10
20
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Sentinel-2 break minus GRW quarter
b
Consistent
GRW late
GRW early
Sites vs TZ-SAM dates (%)
0
25
50
75
100
1,782
1,211
1,339
1,662
1,423
510
60
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GRW year of construction
c
Cohen's κ = 0.62 (95% CI 0.61–0.63), n = 14,279 sites
Area (%) 0 25 50 75 100
GLC_FCS30D dominant class
Barren 82 18
Grassland 12 73 12 1
Cropland 2 5 85 1 6
Forest 2 46 47 4
Shrub 6 32 61 1
Water 2 3 94 1
Wetland 27 61 11
Impervious 1 4 26 67
Barren
Grassland
Cropland
Forest
Shrub
Water
Impervious
CLCD v1.0.5 dominant class
d
Forest turbines in sampled strata: 8,180 (95% CrI 6,420–9,220)
Both products: forest
6/6 images; N = 3,721
CLCD only: forest
8/9 images; N = 5,346
GLC only: forest
5/10 images; N = 892
0%
25%
50%
75%
100%
Share interpreted as forest (Beta posterior, 95% CrI)