

CELSO TAVARES

Cód.:2337 Idade:63A Data Nasc.: 10/12/1953

Conv.:UNIMED

A/C: DR. **CELSO TAVARES**

CRM: 1754

DATA EXAME:17/04/2017

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

Técnica de exame:

Realizados cortes multiplanares em aparelho de alto campo 1,5T nas ponderações T1 e T2 .

Os seguintes aspectos observados:

Acrômio levemente ganchoso, sem sinais de inclinações patológicas.

Alterações degenerativas da articulação acrômio-clavicular caracterizado por osteófitos marginais, irregularidade da superfície com leve alargamento do espaço articular e edema da medular óssea subcortical no componente acromial.

Bursa subacromial/subdeltoidea sem anormalidades significativas.

Tendinopatia do supraespinhal caracterizado por irregularidade e alteração de sinal intrassubstancial, sem sinais de roturas nítidas ou transfixações.

Leve tendinopatia do subescapular e do infraespinhal caracterizado por alteração de sinal intrassubstancial, sem rotura / transfixações.

Tendão da cabeça longa do bíceps com espessura e intensidade de sinal preservados.

Pequeno acúmulo de líquido intra-articular no compartimento glêno-umeral, com distensão líquida da bainha do tendão da cabeça longa do bíceps.

Lábio da glenoide com morfologia e intensidade de sinal preservado.

Não há sinais de lesão condral profunda no compartimento glêno-umeral.

Trofismos musculares preservados.

Alterações fibrocísticas no osso subcortical no aspecto posterior da cabeça umeral.

H.: 18:07



DR. THIAGO RODRIGUES T. CAVALCANTI - RQE 3310
CRM: 4888 -

ESTAMOS FUNCIONANDO TAMBÉM AOS SÁBADOS NA UNIDADE PONTA VERDE

CELSO TAVARES

Cód.:2337 Idade:63A Data Nasc.: 10/12/1953

Conv.:UNIMED

A/C: DR. **CELSO TAVARES**

CRM: 1754

DATA EXAME:17/04/2017

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO

Conclusão:

Estudo de ressonância magnética do ombro direito evidenciando:

Alterações degenerativas da articulação acrômio-clavicular.

Tendinopatia do supraespinhal, do subescapular e do infraespinhal, sem sinais nítidos de roturas nítidas ou transfixações.

Pequeno derrame intra-articular no compartimento glêno-umeral, com distensão líquida da bainha do tendão da cabeça longa do bíceps.

Alterações fibrocísticas no osso subcortical no aspecto posterior da cabeça umeral.

Documentado em 05 filmes.

H.: 18:07



DR. THIAGO RODRIGUES T. CAVALCANTI - RQE 3310
CRM: 4888 -

ESTAMOS FUNCIONANDO TAMBÉM AOS SÁBADOS NA UNIDADE PONTA VERDE