

Folheto informativo: Informação para o doente utilizador

Corsodyl Dental 2mg/ml Solução para lavagem da boca
Gluconato de Clorhexidina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

- 1.O que é Corsodyl Dental e para que é utilizado
- 2.O que precisa de saber antes de utilizar Corsodyl Dental
- 3.Como utilizar Corsodyl Dental
- 4.Efeitos secundários possíveis
- 5.Como conservar Corsodyl Dental
- 6.Conteúdo da embalagem e outras informações

- 1.O que é Corsodyl Dental e para que é utilizado

Para a inibição da formação da placa bacteriana.

Como um adjuvante no tratamento e prevenção da gengivite, e manutenção da higiene oral, particularmente em situações onde a escovagem não pode ser adequadamente aplicada (i.e. após cirurgia oral ou em pacientes física ou mentalmente deficientes).

Também para uso num regime pré e pós cirurgia periodontal para promover a cicatrização gengival.

É útil no tratamento de ulcerações aftosas, infeções orais de candida e estomatite da dentadura..

Usado na prevenção de doenças periodontais após tratamento.

- 2.O que precisa de saber antes de utilizar Corsodyl Dental

Não utilize Corsodyl Dental:

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao gluconato de clorhexidina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Corsodyl Dental

Só para uso oral (externo). Não engolir.

Manter fora dos olhos e ouvidos. Se a solução entrar em contacto com os olhos, lavá-los imediatamente e abundantemente com água.

Em caso de dor, inchaço ou irritação da boca, pare de usar o produto e consulte um profissional de saúde.

A descoloração dos dentes e língua pode ocorrer. Estas manchas não são permanentes e podem ser grandemente prevenidas pela redução do consumo de chá, café e vinho tinto e pela escovagem diária com uma pasta dentífrica convencional antes do uso da solução, ou, no caso das próteses, pela limpeza das próteses com um produto convencional. Todavia, em certos casos pode ser necessária uma profilaxia profissional (remoção e polimento) para remover as manchas completamente.

Corsodyl Dental solução para lavagem da boca é incompatível com agentes aniónicos que estão normalmente presentes em dentífricos convencionais. Portanto, estes devem ser usados pelo menos 5 minutos antes de Corsodyl dental solução para lavagem da boca (lavando a boca com água entre as aplicações) ou a diferentes alturas do dia.

Outros medicamentos e Corsodyl Dental:

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Não são conhecidas interações clinicamente significativas.

Corsodyl Dental é incompatível com agentes aniónicos, como o Laurilsulfato de sódio (ver secção “Advertências e Precauções”).

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não há evidência de qualquer reação adversa no feto proveniente do uso de Corsodyl Dental solução para lavagem da boca durante a gravidez ou lactação. Assim, não é recomendada nenhuma precaução especial.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não tem efeitos.

Este medicamento contém óleo de rícino hidrogenado polioxilo 40. Pode causar reacções cutâneas.

3.Como utilizar Corsodyl Dental

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

Via tópica bucal.

Bochechar durante cerca de um minuto com 10 ml de Corsodyl Dental solução para lavagem da boca, duas vezes ao dia.

Na cirurgia odontológica deve-se recomendar o paciente a bochechar com 10 ml durante um minuto antes do tratamento.

Para o tratamento da gengivite, é recomendado um tratamento de cerca de um mês, embora alguma variação na resposta possa ser esperada.

No caso de ulceração aftosa e infecções orais de candida, o tratamento deve ser prolongado 48 horas após a sua resolução clínica.

Para o tratamento da estomatite da prótese, as próteses devem ser limpas e submergidas em Corsodyl dental solução para lavagem da boca por quinze minutos duas vezes ao dia.

Em caso de persistência dos sintomas consulte o seu médico ou dentista.

Crianças e Idosos:

Não há qualquer recomendação especial de dosagem tanto para pacientes idosos como para crianças a partir dos 12 anos de idade. A dose normal para adulto está adequada, a não ser que o contrário seja aconselhado pelo dentista ou médico. Crianças com 12 anos ou menos não devem usar o produto, a não ser que seja recomendado por um profissional de saúde.

Se utilizar mais Corsodyl Dental do que deveria
Não existem casos relatados.

Não exceder a dose máxima recomendada.

Ingestão Acidental:

A clorhexidina administrada oralmente é pouco absorvida. Os efeitos sistémicos são improváveis mesmo se forem ingeridos grandes volumes. Todavia, a lavagem gástrica pode ser aconselhável usando leite, ovos crus, gelatina ou sabão suave. Emprego de medidas de suporte apropriadas.

Devido ao conteúdo de álcool (7%), a ingestão de grandes quantidades na criança requer atenção; procurar conselho médico para ação apropriada.

Caso se tenha esquecido de utilizar Corsodyl Dental

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Doenças gastrointestinais:

Casos isolados: Descoloração: Uma coloração superficial do dorso da língua pode ocorrer. Esta desaparece após a descontinuação do tratamento. Coloração dos dentes e restaurações de silicato ou compósito também podem ocorrer. Os dentes manchados que já tenham sido restaurados com materiais coloridos e com má margens ou superfícies rugosas, que não sejam adequadamente limpos por profilaxia profissional podem requerer a substituição do material de restauração. Similarmente quando a escovagem normal não é possível, como por exemplo com fixações intermaxilares, ou com aplicações ortodônticas extensivas, a remoção e o polimento podem ser necessários uma vez resolvidas as condições anteriores.

Casos isolados: Descamação oral: Pode ocorrer descamação, dor, irritação e inchaço da mucosa oral (ver 4.4 Advertências e precauções).

Casos isolados: Inchaço da glândula parótida: Tem sido relatado muito ocasionalmente, o inchaço da glândula parótida durante o uso de elixires de clorhexidina. Em todos os casos ocorreu uma resolução espontânea com a descontinuação do tratamento.

Doenças do Sistema Nervoso:

Gosto: Distúrbios transitórios do paladar e uma sensação transitória de dormência, ardor e queimadura na língua podem ocorrer no início do uso da solução. Normalmente estes efeitos diminuem com o uso continuado. Se persistirem, consulte um profissional de saúde.

Doenças do Sistema Imunitário:

Casos isolados: Reações de hipersensibilidade e anafilaxia à clorhexidina têm sido relatadas, mas são extremamente raras. Pare de usar Corsodyl Dental e consulte imediatamente o seu médico se apresentar: erupções cutâneas, inchaço dos lábios, língua, garganta e rosto ou dificuldade em respirar.

Casos isolados: Reações alérgicas: Podem ocorrer ocasionalmente reações irritantes da pele a preparações de clorhexidina

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Corsodyl Dental

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL.. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Corsodyl Dental

- A substância ativa é o Gluconato de Clorhexidina.
- Os outros componentes são: Óleo de rícino hidrogenado polioxilo 40, glicerol, sorbitol líquido (não cristalizável), aroma de hortelã- pimenta e água purificada.

Qual o aspeto de Corsodyl Dental e conteúdo da embalagem

Contentor: Frascos de cor âmbar de polietileno tereftalato orientado (PET) de 300 ml ou 600 ml de capacidade nominal, com solução transparente a levemente opalescente com odor a menta.

Tampa: Tampa vedante de rosca de polipropileno branco de grau alimentar.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Haleon Portugal, Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3
Aquiparque Miraflores
1495-131 Algés
Portugal

Fabricante

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Benzstrasse 25
71083 Herrenberg
Alemanha

Este folheto foi revisto pela última vez em