FOLHETO INFORMATIVO

Este Folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar ALOSPRAY, solução para pulverização cutânea com precaução para obter os devidos efeitos.

Conserve este Folheto.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico. Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

ALOSPRAY

USO EXTERNO

Frasco de vidro âmbar de 30 ml

Composição: Digluconato de cloro-hexidina 10 mg/ml.

Excipientes: Álcool isopropílico, glicerina, polisorbato 80, alantoína, ácido cítrico e água purificada.

Forma farmacêutica: Solução para pulverização cutânea.

Classificação ATC: D08AC02

Classificação fármaco - terapêutica:

Grupo 13 - Medicamentos usados em afecções cutâneas.

- 13.1. Anti-infecciosos de aplicação na pele
- 13.1.1 Anti-sépticos e desinfectantes

Indicações terapêuticas, Posologia e Modo de administração:

Desinfecção de queimaduras leves, pequenas feridas superficiais, gretas, erosões dérmicas.

Modo de usar: Aplicar 1 ou 2 vezes depois de lavar a ferida.

Contra-indicações: *ALOSPRAY*, *solução para pulverização cutânea* não deve ser utilizado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida à cloro-hexidina ou a qualquer um dos seus excipientes. Em doentes com lesões a nível do crânio ou da coluna vertebral e quando não estiver garantida a integridade da membrana do tímpano, a utilização de *ALOSPRAY*, *solução para pulverização cutânea* deve ser ponderada em termos de risco / benefício.

Precauções especiais de utilização: Evitar o contacto directo do produto com os olhos, meninges, cérebro ou ouvido médio. Ocorrendo um contacto inadvertido com os olhos deve proceder-se imediatamente a abundante lavagem com água.

APROVADO EM 19-07-2015 INFARMED

ALOSPRAY, solução para pulverização cutânea pode provocar o aparecimento de manchas acastanhadas nos tecidos (roupas) com que tenha contactado se aqueles forem lavados com produtos contendo hipoclorito (lixívia). Na limpeza desses tecidos deve usar-se produtos à base de peróxido ou perborato.

Usar com precaução em bebés recém-nascidos, especialmente em prematuros. Alospray pode causar queimaduras químicas na pele.

Interacções medicamentosas e outras: Não aplicar ao mesmo tempo que *ALOSPRAY*, solução para pulverização cutânea outros produtos na área de pele a ser tratada, nomeadamente sabões, detergentes ou outros agentes aniónicos. A eficácia de cloro-hexidina é reduzida nesse caso.

Comunique ao seu Médico ou Farmacêutico qualquer efeito adverso observado com a utilização deste produto.

Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Conservar ao abrigo da luz.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Medicamento não sujeito a receita médica.

Fabricado e comercializado por:

PARACÉLSIA - Indústria Farmacêutica, SA Rua Antero de Quental, 639

4200-068 Porto

Número da Autorização de Introdução no Mercado (INFARMED):

xxxxxxx - ALOSPRAY, frasco de vidro âmbar de 30 ml.

Data da elaboração deste texto:

APROVADO EM 19-07-2015 INFARMED