Folheto informativo: Informação para o doente

Dermofix 500 mg Comprimido Vaginal Nitrato de Sertaconazol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-los a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doenca.

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

O que é Dermofix Comprimido Vaginal e para que é utilizado

O que precisa de saber antes de utilizar Dermofix Comprimido Vaginal

Como utilizar Dermofix Comprimido Vaginal

Efeitos indesejáveis possíveis

Como conservar Dermofix Comprimido Vaginal

Conteúdo da embalagem e outras informações

O que é Dermofix Comprimido Vaginal e para que é utilizado

Um comprimido vaginal de Dermofix contém 500 mg de Nitrato de Sertaconazol. Dermofix Comprimido Vaginal está indicado no tratamento da Candidíase vulvovaginal

Dermofix Comprimido Vaginal pertence à classe farmacoterapêutica: 7.1.2 – Medicamentos de Aplicação tópica na vagina – Anti-infecciosos.

O que precisa de saber antes de utilizar Dermofix Comprimido Vaginal

Não utilize Dermofix Comprimido Vaginal

Em caso de hipersensibilidade (alergia) ao fármaco ou a outros derivados azólicos.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Dermofix Comprimido Vaginal.

A aplicação de Dermofix Comprimido Vaginal deve ser feita preferencialmente ao deitar, de forma a favorecer a ação local e a absorção vaginal.

Recomenda-se cuidado com a roupa íntima, devido à possibilidade de corrimento vaginal.

Outros medicamentos e Dermofix Comprimido Vaginal Interações não estão descritas na bibliografia.

Efeitos em grávidas, lactentes, crianças, idosos e doentes com patologias especiais Não se detetaram níveis plasmáticos após a aplicação de grandes quantidades de Sertaconazol. Apesar disso, não está demonstrada a sua inocuidade nem no recémnascido nem em mulheres grávidas, pelo que deverá ser avaliada a relação benefício-risco antes da sua utilização durante a gravidez ou aleitamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas não estão descritos na bibliografia.

Como utilizar Dermofix Comprimido Vaginal

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Posologia usual com referência à dose máxima:

Aplicação única de 1 comprimido vaginal de 500 mg, de preferência ao deitar.

Modo e via de administração:

Dermofix Comprimido Vaginal é para uso vaginal devendo ser aplicado com o auxílio de um aplicador descartável.

Durante a administração, a doente deve deitar-se de costas e colocar as pernas ligeiramente fletidas introduzindo profundamente o aplicador na vagina.

Indicação do momento mais favorável à administração do medicamento: Dermofix Comprimido Vaginal dever ser aplicado ao deitar.

Duração do tratamento médio:

Salvo indicação médica em contrário, a duração média do tratamento é de 1 dia.

Atitude a tomar quando for omitida uma ou mais doses: Não se aplica.

Medida a adotar em caso de sobredosagem e/ou intoxicação:

A forma de apresentação de Dermofix Comprimido Vaginal descarta a possibilidade de intoxicação consecutiva à sua aplicação local intravaginal.

Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Efeitos indesejáveis mais frequentes:

Os efeitos indesejáveis deste medicamento são, geralmente, ligeiros e transitórios. Surgem ocasionalmente alterações geniturinárias (sensação de queimadura uretral, prurido vaginal, vaginite, retenção urinária, cistite) e, raramente, alterações alérgicas/ dermatológicas (eritema, exantema, prurido, dermatite por contacto) e neurológicas (cefaleias).

O tratamento deve ser interrompido de imediato se o doente tiver algum episódio intenso de cefaleia, irritação e/ ou hipersensibilidade.

## Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos, indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não incluídos neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do sítio da internet:

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram (preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita).

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a fornecer mais informações sobre a

segurança deste medicamento.

5. Como conservar Dermofix Comprimido Vaginal

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize Dermofix Comprimido Vaginal após o prazo de validade impresso na embalagem.

Conservar Dermofix Comprimido Vaginal na sua embalagem de origem à temperatura ambiente até 30°C.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações Qual a composição de Dermofix Comprimido Vaginal

- A substância ativa é o Nitrato de Sertaconazol.
- Os outros excipientes são: gliceril tribehenato, amido de milho, óxido de sílica coloidal, estearato de magnésio, carboximetil amido, celulose microcristalina Qual o aspeto de Dermofix Comprimido Vaginal e conteúdo da embalagem Uma embalagem de Dermofix Comprimido Vaginal contém 1 comprimido vaginal + 1 aplicador descartável.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado Ferrer Portugal S.A. Alameda Fernão Lopes, nº 12, 9º andar 1495-190 Algés Portugal

Fabricantes
Ferrer Internacional, S.A.
C/ Joan Buscallà, 1-9
E-08190 Sant Cugat del Vallès -Barcelona
Espanha

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, Lda. Avenida das Indústrias - Alto de Colaride - Agualva 2735-213 Cacém Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em