

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Anacervix Forte 600 mg / 15 mg Comprimidos revestidos  
Piracetam / Vincamina

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto

1. O que é Anacervix Forte e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Anacervix Forte
3. Como utilizar Anacervix Forte
4. Efeitos secundários possíveis
- 5 Como conservar Anacervix Forte
- 6.Outras informações

### 1. O QUE É Anacervix Forte E PARA QUE É UTILIZADO

Grupo farmacoterapêutico: 2.13.1 Sistema nervoso central. Outros medicamentos com acção no sistema nervoso central. Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas.

Anacervix Forte está indicado no tratamento do déficite cognitivo ligeiro associado à idade.

### 2. ANTES DE UTILIZAR Anacervix Forte

Não utilize Anacervix Forte

Nos casos de neoformação cerebral com hipertensão intracraniana.

Tome especial cuidado com Anacervix Forte

Em caso de insuficiência hepática ou renal grave.

Utilizar Anacervix Forte com outros medicamentos

O Anacervix Forte pode potenciar a acção dos barbitúricos, e antagonizar o efeito das anfetaminas.

Gravidez e aleitamento

Ainda que não se tenham registado efeitos teratogénicos, é aconselhável prescindir da sua administração durante a gravidez e o aleitamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Informações importantes sobre os excipientes de Anacervix Forte

Anacervix Forte comprimidos revestidos contém lactose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar o medicamento.

### 3. COMO UTILIZAR Anacervix Forte

Administrar por via oral.

Utilizar Anacervix Forte sempre de acordo com as indicações do médico ou farmacêutico.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Dose habitual: 3 comprimidos revestidos administrados às principais refeições

A duração do tratamento, depende da situação clínica e da sua evolução.

Se utilizar mais Anacervix Forte do que deveria

A administração eventual de doses muito elevadas e superiores várias vezes às utilizadas em clínica pode dar lugar a transtornos digestivos, diarreia e hipotensão. Nesses casos deve-se favorecer a diurese e eventualmente administrar-se 0,25 mg de Sulfato de atropina.

Em caso de ingestão accidental, deverá dirigir-se ao hospital mais próximo, levando este folheto, procedendo-se a tratamento sintomático.

Caso se tenha esquecido de utilizar Anacervix Forte

Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

Se for omitida a administração de uma ou mais doses, o tratamento deve continuar.

Se parar de utilizar Anacervix Forte

Não é necessária qualquer precaução especial, para a suspensão do tratamento. Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico

### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Não foram reportados efeitos indesejáveis, devido ao uso de Anacervix Forte.

Se detectar qualquer efeito secundário não mencionado neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

### 5. COMO CONSERVAR Anacervix Forte

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25° C.

Não utilize Anacervix Forte após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior a seguir à abreviatura utilizada para prazo de validade (“VAL.”).

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize Anacervix Forte se verificar sinais visíveis de deterioração.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.

Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Anacervix Forte

As substâncias activas são: o Piracetam e a Vincamina. Um comprimido revestido de Anacervix Forte contém 600 mg de Piracetam e 15 mg de Vincamina.

Os outros componentes são:

Núcleo: povidona K30, amido de milho, lactose e estearato de magnésio;

Revestimento: hipromelose E4M premium, etilcelulose N50, polissorbato 80; celacefato e óleo de rícino.

Qual o aspecto de Anacervix Forte e conteúdo da embalagem

Anacervix Forte apresenta-se na forma farmacêutica de comprimidos revestidos, acondicionados em blisters de PVC/Alu, em embalagens com 20 ou 60 comprimidos revestidos. É possível que não se encontrem comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Angelini Pharma Portugal, Unipessoal Lda

Rua João Chagas, nº 53 – 3º Piso

1499-040 Cruz Quebrada - Dafundo

Fabricante

Farmalabor - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova

3150-194 - Condeixa-a-Nova

Portugal

Medicamento sujeito a receita médica.

Este folheto foi aprovado pela última vez em