

1.4 Algumas funções importantes

Cap. 1– Funções reais de uma variável real

M.Elfrida Ralha (eralha@math.uminho.pt)

M.Isabel Caiado (icaiado@math.uminho.pt)

outubro 2015

[MIEInf] Cálculo-2015-16

1 / 46

Funções trigonométricas

Funções trigonométricas inversas

Funções exponenciais e logarítmicas

Funções hiperbólicas

Funções hiperbólicas inversas


[MIEInf] Cálculo-2015-16

2 / 46

A. Funções trigonométricas diretas


Seno

$$\begin{aligned}y &= \sin x, \\ D_{\sin} &= \mathbb{R}, \\ CD_{\sin} &= [-1, 1]\end{aligned}$$



Cossecante

$$\begin{aligned}y &= \operatorname{cosec} x, \\ D_{\operatorname{cosec}} &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \\ CD_{\operatorname{cosec}} &= \mathbb{R} \setminus]-1, 1[\end{aligned}$$




[MIEInf] Cálculo-2015-16

3 / 46


Cosseno

$$\begin{aligned}y &= \cos x, \\ D_{\cos} &= \mathbb{R}, \\ CD_{\cos} &= [-1, 1]\end{aligned}$$



Secante

$$\begin{aligned}y &= \sec x, \\ D_{\sec} &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}, \\ CD_{\sec} &= \mathbb{R} \setminus]-1, 1[\end{aligned}$$



[MIEInf] Cálculo-2015-16


4 / 46

Tangente

$$y = \operatorname{tg} x,$$

$$D_{\operatorname{tg}} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\},$$

$$CD_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R}$$




Cotangente

$$y = \operatorname{cotg} x,$$

$$D_{\operatorname{cotg}} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\},$$

$$CD_{\operatorname{cotg}} = \mathbb{R}$$



- ▶ As funções seno, cossecante, cosseno, secante, tangente e cotangente são contínuas;
- ▶ As funções seno, cossecante, cosseno e secante são periódicas de período 2π ;
- ▶ As funções tangente e cotangente são periódicas de período π ;
- ▶ A função cosseno é par;
- ▶ A função seno é ímpar;

- ▶ Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$ tem-se

(a) $\cos^2 x + \sin^2 x = 1;$ (fórmula fundamental da trigonometria)

(b) $1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z};$

(c) $1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x, \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z};$

(d) $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x;$ (fórmula da adição para o seno)

(e) $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$ (fórmula da adição para o cosseno)

Em particular

(f) $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$ (fórmula da duplicação para o seno)

(g) $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x;$ (fórmula da duplicação para o cosseno)

(h) $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x;$

(i) $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y.$

Recorde que

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

B. Funções trigonométricas inversas

- ▶ As funções **seno**, **cossecante**, **cosseno**, **secante**, **tangente** e **cotangente** são funções não bijetivas pelo que não possuem inversa.
- ▶ Considerando restrições apropriadas destas funções, é, no entanto, possível definir as correspondentes funções inversas.

Arco-seno

- ▶ Para a função seno a restrição bijetiva padrão é

$$\begin{array}{ccc} \text{sen} : & \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] & \longrightarrow [-1, 1] \\ & x & \longmapsto \text{sen } x. \end{array}$$

A sua inversa, que se designa por **arco-seno** – lê-se **arco (cujo) seno** – é a função

$$\begin{array}{ccc} \arcsen : & [-1, 1] & \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ & y & \longmapsto \arcsen y, \end{array}$$

onde $\arcsen y$ indica o único arco/ângulo do intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ cujo seno é igual a y . Assim,

$$x = \arcsen y, y \in [-1, 1] \iff y = \text{sen } x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Arco-cossecante

- ▶ Para a função cossecante a restrição bijetiva padrão é

$$\begin{array}{ccc} \text{cosec} : & \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\} & \longrightarrow \mathbb{R} \setminus]-1, 1[\\ & x & \longmapsto \text{cosec } x. \end{array}$$

A sua inversa, que se designa por **arco-cossecante** – lê-se **arco (cuja) cossecante** – é a função

$$\begin{array}{ccc} \text{arccosec} : & \mathbb{R} \setminus]-1, 1[& \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\} \\ & y & \longmapsto \text{arccosec } y, \end{array}$$

onde $\text{arccosec } y$ indica o único arco/ângulo do intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$ cuja cossecante é igual a y . Assim,


$$x = \text{arccosec } y, y \in \mathbb{R} \setminus]-1, 1[\iff y = \text{cosec } x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}.$$

Arco-seno

$$y = \arcsen x,$$

$$D_{\arcsen} = [-1, 1],$$

$$CD_{\arcsen} = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$




Arco-cossecante

$$y = \text{arccosec } x,$$

$$D_{\text{arccosec}} = \mathbb{R} \setminus]-1, 1[,$$

$$CD_{\text{arccosec}} = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$$



Arco-cosseno

- Relativamente à função cosseno, a restrição bijetiva padrão é

$$\begin{array}{ccc} \cos : [0, \pi] & \longrightarrow & [-1, 1] \\ x & \longmapsto & \cos x. \end{array}$$

A sua inversa, que se designa por **arco-cosseno** – lê-se **arco (cujo) cosseno** – é a função

$$\begin{array}{ccc} \arccos : [-1, 1] & \longrightarrow & [0, \pi] \\ y & \longmapsto & \arccos y, \end{array}$$

onde $\arccos y$ indica o único arco/ângulo do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é igual a y . Assim


$$x = \arccos y, y \in [-1, 1] \iff y = \cos x, x \in [0, \pi].$$

Arco-cosseno

$$y = \arccos x,$$

$$D_{\arccos} = [-1, 1],$$

$$CD_{\arccos} = [0, \pi]$$



Arco-secante

- Para a função secante a restrição bijetiva padrão é

$$\begin{array}{ccc} \sec : [0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \setminus]-1, 1[\\ x & \longmapsto & \sec x. \end{array}$$

A sua inversa, que se designa por **arco-secante** – lê-se **arco (cuja) secante** – é a função

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{arcsec} : \mathbb{R} \setminus]-1, 1[& \longrightarrow & [0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\} \\ y & \longmapsto & \operatorname{arcsec} y, \end{array}$$

onde $\operatorname{arcsec} y$ indica o único arco/ângulo do intervalo $[0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$ cuja secante é igual a y . Assim,

$$x = \operatorname{arcsec} y, y \in \mathbb{R} \setminus]-1, 1[\iff y = \sec x, x \in [0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}.$$

Arco-tangente

- Para a função **tangente** considera-se a restrição bijetiva

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{tg} : \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \operatorname{tg} x. \end{array}$$

A sua inversa, designada por **arco-tangente** – lê-se **arco (cuja) tangente** – é a função

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{arctg} : \mathbb{R} & \longrightarrow & \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\\ y & \longmapsto & \operatorname{arctg} y, \end{array}$$

onde $\operatorname{arctg} y$ indica o único arco/ângulo do intervalo $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ cuja tangente é igual a y . Assim


$$x = \operatorname{arctg} y, y \in \mathbb{R} \iff y = \operatorname{tg} x, x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

Arco-secante

$$y = \operatorname{arcsec} x,$$

$$D_{\operatorname{arcsec}} = \mathbb{R} \setminus]-1, 1[,$$

$$CD_{\operatorname{arcsec}} = [0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$$



Arco-cotangente

- Relativamente à função **cotangente**, considera-se a restrição bijetiva

$$\begin{aligned} \cotg :]0, \pi[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \cotg x, \end{aligned}$$

cujas inversa é a função **arco-cotangente** – lê-se **arco (cujas)** **cotangente** – definida por

$$\begin{aligned} \operatorname{arccotg} : \mathbb{R} &\longrightarrow]0, \pi[\\ y &\longmapsto \operatorname{arccotg} y, \end{aligned}$$

onde $\operatorname{arccotg} y$ indica o único arco/ângulo do intervalo $]0, \pi[$ cuja cotangente é igual a y . Então


$$x = \operatorname{arccotg} y, y \in \mathbb{R} \iff y = \cotg x, x \in]0, \pi[.$$

Arco-tangente

$$y = \operatorname{arctg} x,$$

$$D_{\operatorname{arctg}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\operatorname{arctg}} = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$




Arco-cotangente

$$y = \operatorname{arccotg} x,$$

$$D_{\operatorname{arccotg}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\operatorname{arccotg}} =]0, \pi[$$




C. Funções exponenciais e logarítmicas

Propriedades da função exponencial


Para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}$, a função exponencial de base a , a^x , $a > 0$ verifica

- (a) é uma função contínua;
- (b) $a^{x+z} = a^x a^z$;
- (c) $(a^x)^z = a^{xz}$;
- (d) se $b > 0$, $(ab)^x = a^x b^x$;
- (e) se $a > 1$, é crescente;
- (f) se $a = 1$, é constante;
- (g) se $0 < a < 1$, é decrescente.



- Para todo¹ o $y \in]0, +\infty[$ e $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, define-se a **função logaritmo na base a** , denotando-se $\log_a y$, como a função inversa da função exponencial de base a , isto é

$$x = \log_a y \iff a^x = y \quad \forall y \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}.$$



¹Para $a = 1$ a função a^x não é bijetiva, logo não admite inversa.


► Propriedades da função logaritmo

Para quaisquer $x > 0$, $z > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, a função logaritmo de base a , $\log_a x$, $a > 1$ verifica

- (a) é uma função contínua;
- (b) $\log_a(xz) = \log_a x + \log_a z$;
- (c) $\log_a \frac{x}{z} = \log_a x - \log_a z$;
- (d) $\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x$.

- Fala-se em função **exponencial natural** quando a base da função exponencial é o número de Euler e : e^x .
- O **logaritmo natural** de y , denotado $\ln y$, é função inversa da função e^x , isto é

$$x = \ln y \iff e^x = y \quad \forall y \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R};$$



Funções exponencial e logarítmica de base e

D. Funções hiperbólicas diretas

- A função **seno hiperbólico** é a função real de variável real definida por

$$\begin{aligned} \text{sh} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \end{aligned}$$

- A função **cossecante hiperbólica** é a função real de variável real definida por


$$\begin{aligned} \text{cosech} : \mathbb{R} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{cosech } x = \frac{2}{e^x - e^{-x}}. \end{aligned}$$

Senos hiperbólicos

$$y = \text{sh } x,$$

$$D_{\text{sh}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\text{sh}} = \mathbb{R}$$




Cossecante hiperbólica

$$y = \text{cosech } x,$$

$$D_{\text{cosech}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$CD_{\text{cosech}} = \mathbb{R}$$



- A função **cosseno hiperbólico** é a função real de variável real definida por

$$\begin{aligned} \text{ch} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}. \end{aligned}$$

- A função **secante hiperbólica** é a função real de variável real definida por


$$\begin{aligned} \text{sech} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{sech } x = \frac{2}{e^x + e^{-x}}. \end{aligned}$$

Cosseno hiperbólico

$$y = \text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$D_{\text{ch}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\text{ch}} = \mathbb{R}$$




Secante hiperbólica

$$y = \text{sech } x = \frac{2}{e^x + e^{-x}},$$

$$D_{\text{sech}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\text{sech}} =]0, 1]$$



A função **seno hiperbólico** é

- ímpar;
- estritamente crescente;
- $D_{\text{sh}} = \mathbb{R}$;
- $CD_{\text{sh}} = \mathbb{R}$.

A função **cosseno hiperbólico** é

- par;
- não monótona mas
 - estritamente decrescente em $] - \infty, 0[$;
 - estritamente crescente em $[0, +\infty[$;
- $D_{\text{ch}} = \mathbb{R}$
- $CD_{\text{ch}} = [1, +\infty[$.

A função **cossecante hiperbólica** é

- ímpar;
- é não monótona mas é decrescente em $] - \infty, 0[$ e em $]0, +\infty[$;
- $D_{\text{cosech}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- $CD_{\text{cosech}} = \mathbb{R}$.

A função **secante hiperbólica** é

- par;
- não monótona mas
 - estritamente crescente em $] - \infty, 0[$;
 - estritamente decrescente em $[0, +\infty[$;
- $D_{\text{sech}} = \mathbb{R}$
- $CD_{\text{sech}} =]0, 1]$.

- ▶ A função **tangente hiperbólica** é a função real de variável real definida por

$$\begin{aligned} \text{th} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{th } x = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}. \end{aligned}$$

- ▶ A função **cotangente hiperbólica** é a função real de variável real definida por


$$\begin{aligned} \text{coth} : \mathbb{R} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{coth } x = \frac{\text{ch } x}{\text{sh } x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}. \end{aligned}$$

Tangente hiperbólica

$$y = \text{th } x,$$

$$D_{\text{th}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\text{th}} =]-1, 1[$$




Cotangente hiperbólica

$$y = \text{coth } x,$$

$$D_{\text{coth}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$CD_{\text{coth}} = \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$$



Observação

A função **tangente hiperbólica** é

- ▶ ímpar;
- ▶ estritamente crescente;
- ▶ $D_{\text{th}} = \mathbb{R}$
- ▶ $CD_{\text{th}} =]-1, 1[$.

A função **cotangente hiperbólica** é

- ▶ ímpar;
- ▶ estritamente decrescente;
- ▶ $D_{\text{coth}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- ▶ $CD_{\text{coth}} = \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$.

- ▶ Para a função seno hiperbólico, sh, também se usa a notação **senh**;
- ▶ De modo análogo, para a função cosseno hiperbólico, ch, também se usa a notação **cosh**;

Algumas propriedades das funções hiperbólicas

Para todo $x, y \in \mathbb{R}$ tem-se

- ▶ $\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x$;
- ▶ $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$; (análogo à fórmula fundamental da trigonometria)
- ▶ $1 - \operatorname{th}^2 x = \operatorname{sech}^2 x$;
- ▶ $\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$;
- ▶ $\operatorname{sh}(x + y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y$.

Em particular

- ▶ $\operatorname{sh}(2x) = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$; (fórmula da duplicação para o seno hiperbólico)
- ▶ $\operatorname{ch}(2x) = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$; (fórmula da duplicação para o cosseno hiperbólico)
- ▶ $\operatorname{sh}(x - y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y - \operatorname{sh} y \operatorname{ch} x$;
- ▶ $\operatorname{ch}(x - y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y - \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$.

[MIEInf] Cálculo-2015-16

33 / 46

E. Funções hiperbólicas inversas

- ▶ Argumento do seno hiperbólico
- ▶ Argumento da cossecante hiperbólica
- ▶ Argumento do cosseno hiperbólico
- ▶ Argumento da secante hiperbólica
- ▶ Argumento da tangente hiperbólica
- ▶ Argumento do cotangente hiperbólico

[MIEInf] Cálculo-2015-16

34 / 46

Argumento do seno hiperbólico

- ▶ A função seno hiperbólico é bijetiva.
- ▶ A sua inversa, que se designa por **argumento do seno hiperbólico**, é a função

$$\begin{aligned} \operatorname{argsh}: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ y &\longmapsto \operatorname{argsh} y, \end{aligned}$$

Assim,

$$x = \operatorname{argsh} y, y \in \mathbb{R} \iff \operatorname{sh} x = y, x \in \mathbb{R}$$

e

$$\operatorname{argsh} y = \ln \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

[MIEInf] Cálculo-2015-16

35 / 46

Como definir $\operatorname{argsh} y$?

Para $x \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} y = \operatorname{sh} x &\iff y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \iff y = \frac{e^{2x} - 1}{2e^x} \\ &\iff e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 && \text{equação do 2.º grau em } e^x \\ &\iff e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}. \end{aligned}$$

A solução com o sinal $+$ é a única admissível, pois

$$e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad y - \sqrt{y^2 + 1} < 0, \forall y \in \mathbb{R}.$$

Mas

$$e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \iff x = \ln \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right),$$

donde

$$\operatorname{argsh} y = \ln \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

[MIEInf] Cálculo-2015-16

36 / 46

Argumento da cossecante hiperbólica

- ▶ A função cossecante hiperbólica é bijetiva.
- ▶ A sua inversa, que se designa por **argumento da cossecante hiperbólica**, é a função

$$\begin{aligned} \operatorname{argcosech}: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ y &\longmapsto \operatorname{argcosech} y, \end{aligned}$$

Assim,

$$x = \operatorname{argcosech} y, y \in \mathbb{R} \iff \operatorname{cosech} x = y, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

e


$$\operatorname{argcosech} y = \ln \left(\frac{1}{y} + \sqrt{\frac{1}{y^2} + 1} \right), \quad \forall y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Argumento do seno hiperbólico

$$y = \operatorname{argsh} x,$$

$$D_{\operatorname{argsh}} = \mathbb{R}$$

$$CD_{\operatorname{argsh}} = \mathbb{R}$$




Argumento da cossecante hiperbólica

$$y = \operatorname{argcosech} x,$$

$$D_{\operatorname{argcosech}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$CD_{\operatorname{argcosech}} = \mathbb{R}$$



Argumento do cosseno hiperbólico

- ▶ A função cosseno hiperbólico não é bijetiva mas é possível considerar a sua restrição bijetiva

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}: [0, +\infty[&\longrightarrow [1, +\infty[\\ x &\longmapsto \operatorname{ch} x \end{aligned}$$

- ▶ A inversa desta restrição, que se designa por **argumento do cosseno hiperbólico**, é a função

$$\begin{aligned} \operatorname{argch}: [1, +\infty[&\longrightarrow [0, +\infty[\\ y &\longmapsto \operatorname{argch} y \end{aligned}$$

Assim,

$$x = \operatorname{argch} y, y \in [1, +\infty[\iff \operatorname{ch} x = y, x \in [0, +\infty[$$

e

$$\operatorname{argch} y = \ln \left(y + \sqrt{y^2 - 1} \right), \quad y \in [1, +\infty[$$

Argumento da secante hiperbólica

- ▶ A função secante hiperbólica não é bijetiva mas é possível considerar a sua restrição bijetiva

$$\begin{aligned} \operatorname{sech}: [0, +\infty[&\longrightarrow]0, 1] \\ x &\longmapsto \operatorname{sech} x \end{aligned}$$

- ▶ A inversa desta restrição, que se designa por **argumento da secante hiperbólica**, é a função

$$\begin{aligned} \operatorname{argsech}:]0, 1] &\longrightarrow [0, +\infty[\\ y &\longmapsto \operatorname{argsech} y \end{aligned}$$

Assim,

$$x = \operatorname{argsech} y, y \in]0, 1] \iff \operatorname{sech} x = y, x \in [0, +\infty[$$

e


$$\operatorname{argsech} y = \ln \left(\frac{1}{y} + \sqrt{\frac{1}{y^2} - 1} \right), \quad y \in]0, 1]$$

Argumento do cosseno hiperbólico

$$y = \operatorname{argch} x,$$

$$D_{\operatorname{argch}} = [1, +\infty[$$

$$CD_{\operatorname{argch}} = [0, +\infty[$$




[MIEInf] Cálculo-2015-16

Argumento da secante hiperbólica

$$y = \operatorname{argsech} x,$$

$$D_{\operatorname{argsech}} =]0, 1]$$

$$CD_{\operatorname{argsech}} = [0, +\infty[$$



41 / 46

A função **argumento do seno hiperbólico** é

- ▶ contínua;
- ▶ estritamente crescente;
- ▶ $D_{\operatorname{argsh}} = \mathbb{R}$
- ▶ $CD_{\operatorname{argsh}} = \mathbb{R}$.

A função **argumento do cosseno hiperbólico** é

- ▶ contínua;
- ▶ estritamente crescente;
- ▶ $D_{\operatorname{argch}} = [1, +\infty[$;
- ▶ $CD_{\operatorname{argch}} = [0, +\infty[$.

[MIEInf] Cálculo-2015-16

42 / 46

Argumento da tangente hiperbólica

- ▶ A função tangente hiperbólica não é sobrejetiva mas é possível considerar a sua restrição bijetiva

$$\begin{aligned} \operatorname{th}: \mathbb{R} &\longrightarrow]-1, 1[\\ x &\longmapsto \operatorname{th} x \end{aligned}$$

- ▶ A inversa desta restrição, que se designa por **argumento da tangente hiperbólica**, é a função

$$\begin{aligned} \operatorname{argth}:]-1, 1[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ y &\longmapsto \operatorname{argth} y \end{aligned}$$

onde

$$x = \operatorname{argth} y, y \in]-1, 1[\iff \operatorname{th} x = y, x \in \mathbb{R}$$

e

$$\operatorname{argth} y = \ln \left(\sqrt{\frac{1+y}{1-y}} \right), y \in]-1, 1[.$$

[MIEInf] Cálculo-2015-16

43 / 46

Argumento da cotangente hiperbólica

- ▶ A função $\operatorname{coth}: \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ não é sobrejetiva mas é possível considerar a sua restrição bijetiva

$$\begin{aligned} \operatorname{coth}: \mathbb{R} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \\ x &\longmapsto \operatorname{coth} x \end{aligned}$$

- ▶ A inversa desta restrição, que se designa por **argumento da cotangente hiperbólica**, é a função

$$\begin{aligned} \operatorname{argcoth}: \mathbb{R} \setminus [-1, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ y &\longmapsto \operatorname{argcoth} y \end{aligned}$$

onde

$$x = \operatorname{argcoth} y, y \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1] \iff \operatorname{coth} x = y, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

e

$$\operatorname{argcoth} y = \ln \left(\sqrt{\frac{y+1}{y-1}} \right), y \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$$

[MIEInf] Cálculo-2015-16


44 / 46

Argumento da tangente hiperbólica

$$y = \operatorname{argth} x,$$

$$D_{\operatorname{argth}} =]-1, 1[,$$

$$CD_{\operatorname{argth}} = \mathbb{R}$$




Argumento da cotangente hiperbólica

$$y = \operatorname{argcoth} x,$$

$$D_{\operatorname{argcoth}} = \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$$

$$CD_{\operatorname{argcoth}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



A função **argumento da tangente hiperbólica** é

- ▶ contínua;
- ▶ estritamente crescente;
- ▶ $D_{\operatorname{argth}} =]-1, 1[$
- ▶ $CD_{\operatorname{argth}} = \mathbb{R}$.

A função **argumento da cotangente hiperbólica** é

- ▶ contínua;
- ▶ decrescente;
- ▶ $D_{\operatorname{argcoth}} = \mathbb{R} \setminus [-1, 1];$
- ▶ $CD_{\operatorname{argcoth}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$