

## Tópicos de Matemática Discreta

folha 16 -


## 6. Grafos

**6.1.** Descreva formalmente cada um dos seguintes grafos e determine matrizes de incidência e de adjacência de cada um deles.






- **6.2.** Desenhe um grafo que tenha como matriz de adjacência a matriz  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ .
- **6.3.** Desenhe um grafo que tenha como matriz de incidência a matriz  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$
- **6.4.** Dos seguintes grafos, diga quais são bipartidos, indicando uma partição do conjunto dos seus vértices.



**6.5.** Considere o seguinte grafo G.




- (a) Indique o(s) caminho(s) de a a h de menor comprimento.
- (b) Indique o(s) caminho(s) de a a h de maior comprimento que não têm vértices repetidos.
- (c) Indique um caminho de a a h sem arestas repetidas, mas com vértices repetidos.
- (d) Indique um ciclo de G de comprimento 7.
- (e) Indique todos os ciclos de G cujo vértice inicial é a.

## Tópicos de Matemática Discreta


— folha 17 —


- 6.6. Dê exemplo, caso exista, de:
  - (a) um grafo sem vértices de grau ímpar;
  - (b) um grafo sem vértices de grau par;
  - (c) um grafo com exatamente um vértice de grau ímpar;
  - (d) um grafo com exatamente um vértice de grau par;
  - (e) um grafo com exatamente dois vértices de grau ímpar;
  - (f) um grafo com exatamente dois vértices de grau par.
- **6.7.** Um  $conjunto\ de\ desconexão\ de\ um\ grafo\ conexo\ G$  é um conjunto de arestas cuja remoção dá origem a um grafo desconexo.
  - (a) Encontre conjuntos de desconexão para o grafo de Petersen



com 3, 4 e 5 arestas.

(b) Encontre conjuntos de desconexão com o menor número possível de arestas para os grafos seguintes:





**6.8.** Construa todas as árvores possíveis com 6 vértices.