

Dados preliminares sobre diversidade e uso de microhabitat por uma taxocenose de anfíbios num brejo na área urbana de Alfenas-MG.

Diogo B. Provete (IC)*; Marcelo J. Sturaro (IC); Mario A. Sacramento (IC); Pedro B.B. Oliveira; Pedro H. F. Dias; Renato A. J. Gaiga; Rodolfo C. Rodrigues; Vinícius X. Silva (PQ) dbprovete@gmail.com.

Laboratório e Museu de Zoologia, Departamento de Ciências Biológicas, UNIFAL-MG. R. Gabriel M. Silva, 714. Centro Alfenas-MG. 37130-000.

Palavras Chave: Insetos aquáticos, poça permanente, girinos.

Introdução

A fragmentação é o processo no qual um habitat contínuo é dividido em porções menores, mais ou menos isoladas, que apresentam condições ambientais distintas entre si¹. Populações isoladas em fragmentos tendem a ficar mais suscetíveis à extinção. No entanto, essas pequenas porções de habitat em locais antropizados, como a área urbana permitem condições controladas (área reduzida, comunidades menores e menos complexas, migrações praticamente nulas dependendo do grupo). Tais condições possibilitam testar mais facilmente algumas hipóteses ecológicas como área de vida, partilha de recursos e estimativas populacionais. Os anfíbios por serem pouco vageis e muito dependentes da água, são particularmente úteis para estudos desta natureza. Apresentamos aqui dados preliminares sobre diversidade e uso de microhabitat por adultos e girinos de espécies de anuros num brejo na área urbana de Alfenas-MG.

Materiais e Métodos

A área de estudo inclui os 23.407 m² de uma nascente que se localiza na região central de Alfenas-MG (21° 25' 06,28" S e 45 ° 56' 57,40" W), possuindo uma poça permanente resultante do represamento da água. O local foi visitado durante duas semanas nos meses de setembro e outubro de 2006, totalizando 48 horas de observação. Neste período foram registrados sítio e horário de vocalização dos anuros adultos, bem como os encontros visuais². Para as coletas de girinos e predadores/competidores potenciais foi utilizada uma puçá. O uso de microhabitat pelos girinos foi registrado numa ficha que levava em conta a presença/ausência de vegetação aquática, de insetos e peixes, profundidade e aspecto da água, tipo de fundo, a posição na coluna d'água dos girinos, posição horizontal e vertical e tipo de vegetação.

Resultados e Discussão

Foram registrados em média 37 indivíduos adultos/dia, pertencentes a 6 espécies, *Dendropsophus minutus* (8 exemplares), *Hypsiboas albopunctatus* (3), *H. lundii* (3), *Leptodactylus*

labyrinthicus (3), *L. ocellatus* (3) e *Physalaemus cuvieri* (17); 4 espécies tinham representantes na forma larval: *H. albopunctatus* (15), *L. labyrinthicus* (2), *P. cuvieri* (30) e *Chaunus* sp. (150). A coleta de potenciais predadores/competidores aquáticos registrou 95 indivíduos, distribuídos nos táxons: Odonata [*Idioneura* sp. (3), *Tramea* sp. (2), *Erythrodiplax* sp. (2), *Aeshna* sp. (2)], Hemiptera [*Belostoma* sp (15), Veliidae (10), Notonectidae (3)] e Ephemeroptera [Baetidae (1)]. Também foram encontrados gastrópodos (25), hirudíneos (2) e lebistes (*Poecilia reticulata*) (30). Quanto ao uso de microhabitat, *P. cuvieri* permaneceu a maior parte do tempo ($p < 0,05$) no solo e em locais onde havia gramíneas. *L. ocellatus* encontrava-se quase submerso no lago. *L. labyrinthicus* vocalizava dentro da lagoa em locais rasos onde havia vegetação aquática. *H. albopunctatus* e *D. minutus* vocalizavam a cerca de 1m de altura na vegetação marginal, próximo ao lago. Foi encontrada uma espécie característica de ambientes florestados (*H. lundii*, vocalizando entre 1,20m e 160m num estrato arbustivo de Araceae). Os girinos de *H. albopunctatus*, *L. labyrinthicus* e *P. cuvieri* são bentônicos, ocorreram em locais onde não havia vegetação aquática e co-ocorreram com lebistes. Os girinos de *Chaunus* sp. foram encontrados agregados e imersos entre a desova característica na borda do lago.

Conclusões

Embora na região central de Alfenas, o local representa uma área de preservação permanente por conter uma nascente. Apesar de baixa riqueza de anuros, alguns padrões foram observados, como espécies de menor biomassa em maior abundância e vice-versa e ao menos uma espécie com grande número de girinos, mas nenhum adulto registrado. Os dados aqui apresentados servirão de subsídio para estudos mais detalhados, ampliando inclusive o tempo de observação.

¹Cerqueira, R. et al. Fragmentação: alguns conceitos. In: Rambaldi, D. et al. *Fragmentação de ecossistemas*. Brasília: MMA. s.ed. 2003. 510p.

²Crump, M.L.; Scott JR, N.J. Visual encounters surveys. In: HEYER, W.R. et al. (Ed.) *Measuring and monitoring biological diversity, standard methods for amphibians*. Washington: Smithsonian Inst. Press. 1994. 363p.