

3º CONGRESSO DE BRASILEIRO DE HERPETOLOGIA



x sair

Início

Consulta

Listagem por autor principal

Listagem por título

Contato

Descrição da biologia reprodutiva de *Phasmahyla cochranæ* Bokermann, 1966 (Anura, Hylidae).

Grupo Taxonômico: Anfíbios - Anuros Categoria: Comportamento/ Etologia

Phasmahyla cochranæ é um Phyllomedusinae endêmico de Mata Atlântica que apresenta o modo reprodutivo de depositar suas desovas em ninhos elaborados com folha única e pendente sobre remansos em riachos de corredeiras no interior de florestas situadas acima dos 800m. Suas exigências ambientais a credenciam como uma espécie bioindicadora do grau de conservação de uma área. Entretanto, sua baixa frequência e a atual escassez de estudos auto-ecológicos não permitiram acumular muitos dados sobre a sua biologia. Este trabalho teve como objetivos a observação e descrição do comportamento reprodutivo (formação do amplexo, confecção do ninho foliar e desova) de *Phasmahyla cochranæ*, a fim de acumular dados que sirvam de subsídio para elaboração de projetos de preservação, monitoramento e manejo dessa espécie presumivelmente ameaçada de extinção em Minas Gerais. A área de estudo compreendeu a vegetação marginal de um trecho da Cachoeira das Sete Quedas, localizado entre 950 e 1000m de alt. dentro do Parque Estadual Nova Baden, Lambari-MG (21° 56' 35" S, 45° 19' 02" W), com 214,47ha de relevo montanhoso e clima tropical de altitude. O método de observação foi o "animal focal", aplicado desde o momento de visualização do casal em amplexo até o término da confecção do ninho, quando foram registrados comprimento rostro-cloacal, massa corpórea e deslocamento do casal, além da altura do ninho e sua distância da margem, temperaturas do ar e da água e a duração dos eventos. A sequência comportamental foi toda fotografada. As atividades de procura e observação, realizadas durante o ano de 2006, resultaram num esforço amostral de 369 horas-homem. Com isso, foi possível encontrar dois casais em fevereiro e dois em outubro, em alturas que variaram de 0,7 a 1,7m da superfície da água. Durante o amplexo axilar, o macho permaneceu em contato íntimo com o dorso da fêmea e com os orifícios genitais de ambos continuamente justapostos. Não foram observados comportamentos explícitos de corte ou de disputa entre machos pela posse da fêmea. Foi bastante comum o macho apresentar uma coloração com tonalidade diferente daquela exibida pela fêmea. Os casais apresentaram-se mais ativos por volta das 23h00min e o tempo gasto para a confecção dos ninhos durou em média 02hs09minutos. Com base nas observações foi possível dividir esquematicamente o processo reprodutivo em sete fases. Fase 1: encontro entre macho e fêmea e formação do amplexo (somente um casal teve esta fase observada pois os outros três casais já se encontravam em amplexo e executando a fase seguinte quando foram visualizados). Fase 2: patrulhamento do casal na vegetação marginal e até no solo à procura de local adequado para a desova (duração média de $48,5 \pm 8,5$ minutos e deslocamento médio de 229 ± 80 cm, amplitude de altura do ninho = 161-343cm; n = 4). Fase 3: escolha e experimentação da folha e de sua face foliar para a desova ($38,5 \pm 36,3$ min). Fase 4: formação e selagem do orifício inferior do ninho ($37,5 \pm 15,9$ min), local por onde os girinos, após a eclosão, escorregam e caem sobre a água. Fase 5: deposição dos ovos e das cápsulas gelatinosas e concomitante selagem das bordas laterais da folha (60 ± 6 min). Fase 6: formação e selagem do orifício superior do ninho (42 ± 32 min). Fase 7: abandono do ninho e separação do casal ($2,5 \pm 1,3$ min).

Autor(es)

SILVA, Mario Antonio Sacramento

PROVETE, Diogo Borges

SILVA, Vinicius Xavier da

E-mail

mariosacra@msn.com

dbprovete@gmail.com

vinic@unifal-mg.edu.br

Instituição

Efoa/Ceufe

UNIFAL-MG (Universidade Federal de Alfenas)

Efoa/Ceufe