



IX CONGRESSO
LATINOAMERICANO DE
HERPETOLOGIA

V CONGRESSO
BRASILEIRO DE
HERPETOLOGIA

2011 • Curitiba • Brasil
16 a 22 de julho • EXPO-UNIMED CURITIBA



Estrutura de comunidade de anfíbios anuros na fase larval em ambientes lóticos e lênticos em Paranapiacaba, Santo André, São Paulo

Grupo Taxonômico: Anfíbios - Anuros **Categoria:** Ecologia / Historia Natural

Os padrões de distribuição espacial e temporal das espécies de anfíbios anuros são influenciados pelas condições físicas e químicas do ambiente, além dos recursos disponíveis. O conjunto de informações disponíveis sugere que os fatores abióticos e bióticos influenciam a estruturação da comunidade em diferentes níveis. O objetivo principal deste estudo é avaliar quais aspectos são importantes para estruturar a comunidade de girinos em ambientes lóticos e lênticos do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Os objetivos deste estudo foram: 1) Determinar a distribuição espacial e temporal; 2) Avaliar a sazonalidade em relação à riqueza de espécies e a influência de parâmetros climáticos (temperatura do ar, umidade relativa e pluviosidade) na distribuição temporal dos girinos; 3) Determinar a similaridade na composição e abundância de espécies de anuros na fase larval entre as comunidades; 4) Determinar a diversidade beta entre as comunidades. Amostramos 3 corpos d'água lóticos e 2 lênticos mensalmente entre Janeiro e Agosto de 2010, totalizando um esforço amostral de 80 horas/pessoa. A diversidade beta dos corpos d'água foi calculada com o método da homogeneidade multivariada de dispersão de grupos, a similaridade entre os corpos d'água foi analisada com o índice de Chao-Morisita para múltiplas comunidades. A eficiência da amostragem foi avaliada pelo cálculo dos estimadores de riqueza ACE. Os fatores abióticos variaram ao longo dos corpos d'água. Nós coletamos no total 8 espécies (riqueza estimada pelo ACE 12 espécies, IC: 8,4 – 50,6). Os ambientes lênticos tiveram a maior abundância de girinos, além das maiores riqueza e diversidade. Os dois grupos de habitats: poças e riachos, diferiram em relação à composição de espécie e na diversidade beta. A similaridade média das comunidades foi de 0,185 (IC: 0,172 – 0,198). A riqueza de espécies não variou sazonalmente (Rayleigh $z = 0,911$; $p = 0,402$), sendo que o pico da riqueza ocorreu em Julho. Provavelmente isto ocorreu porque durante o período amostral houve predominância de espécies típicas de inverno. No entanto, nenhuma das variáveis climáticas influenciou nem a abundância nem a riqueza de espécies (riqueza: R^2 ajustado = 0,337; $F(2,5) = 2,783$; $p = 0,154$; abundância: R^2 ajustado = 0,408; $F(3,4) = 2,613$; $p = 0,188$). As espécies puderam ser divididas em três grupos com relação à distribuição temporal: sendo 38,4% consideradas reprodutoras prolongadas, 38,4% intermediárias e 23% explosivas. Os dados obtidos indicam que a região de estudo apresenta uma forte diferenciação no padrão de ocupação dos corpos d'água diminuindo o pool de espécies que se interagem entre si, possibilitando assim sua coexistência local.

Autor(es)

Negri, Daniel
Provete, Diogo
Laporta, Jose

Email

danieldin@hotmail.com
dbprovete@gmail.com
joselaporta1@gmail.com

Instituição

Centro Universitário Fundação Santo André
Universidade Federal de Goiás
Centro Universitario Fundação Santo André