



IX CONGRESSO
LATINOAMERICANO DE
HERPETOLOGIA

V CONGRESSO
BRASILEIRO DE
HERPETOLOGIA

2011 • Curitiba • Brasil

16 a 22 de julho • EXPO-UNIMED CURITIBA



Análise preliminar da biodiversidade herpetofaunística sul mineira no contexto do Programa Biota Minas

Grupo Taxonômico: Anfíbios - Anuros **Categoria:** Inventários

Anfíbios e répteis ainda são grupos pobremente conhecidos no mundo, porém mais especialmente no Brasil, que ostenta o primeiro lugar do mundo em número absoluto de espécies de anfíbios e está entre os primeiros em riqueza de répteis. Paradoxalmente, declínios mundiais de anfíbios têm mobilizado muitos pesquisadores e conservacionistas e já se tem cogitado reduções comparáveis ou até piores entre os répteis. Dentro do contexto do Programa Biota Minas, esse projeto procurou fazer um levantamento rápido da herpetofauna pelas áreas consideradas prioritárias para conservação na região Sul do Estado de Minas Gerais e uma comparação preliminar da diversidade biológica herpetofaunística entre essas áreas. A área de estudo compreendeu 16 municípios distribuídos por 5 regiões consideradas prioritárias para o Sul de Minas: Região de Guaxupé (1 município), Região de Monte Belo (1), Região do Planalto de Poços de Caldas (1), Região das Várzeas do Rio Sapucaí (1) e Região da Serra da Mantiqueira (12). A Região da Serra da Mantiqueira incluiu mais municípios (12) por possuir área muito maior que as demais regiões. De cada município foi selecionado um remanescente de Mata Atlântica (por ser alguma unidade de conservação, maior tamanho, ou grau aparente de conservação), que foi visitado para um diagnóstico rápido por coleta ativa, durante 2 dias, por 2 herpetólogos. As excursões de coleta ocorreram entre dezembro e fevereiro dos anos de 2010 e 2011. O esforço total de coleta somou 512 horas.homem. Os exemplares coletados foram sacrificados, fixados em formol 10% e preservados em álcool 70% na Coleção Herpetológica Alfred Russel Wallace (CHARW) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Foram coletados 519 exemplares (505 anfíbios anuros e 14 répteis) de 70 espécies (62 de anfíbios anuros e 8 de répteis). As localidades em ordem decrescente do Índice de Diversidade de Shannon para herpetofauna foram: Delfim Moreira (H=2,259; riqueza=12 espécies), Caxambu (H=2,082; riqueza=10 espécies), Virgínia (H=2,044; riqueza=8 espécies), Santa Rita do Jacutinga (H=1,974; riqueza=13 espécies), Monte Belo (H=1,905; riqueza=9 espécies), Extrema (H=1,775; riqueza=9 espécies), Camanducaia (H=1,717; riqueza=8 espécies), Cambuí (H=1,696; riqueza=7 espécies), Guaxupé (H=1,696; riqueza=7 espécies), São Gonçalo do Sapucaí (H=1,561; riqueza=5 espécies), Pouso Alegre (H=1,557; riqueza=5 espécies), Bocaina de Minas (H=1,477; riqueza=10 espécies), Aiuruoca (H=1,449; riqueza=10 espécies), Poços de Caldas (H=1,386; riqueza=7 espécies), Maria da Fé (H=1,381; riqueza=7 espécies), Passa Quatro (H=1,373; riqueza=9 espécies). A análise de cluster (UPGMA) comparando as composições de espécies dessas localidades gerou os seguintes agrupamentos: (((Camanducaia, Delfim Moreira))((Caxambu, Monte Belo, Virgínia, Cambuí, Guaxupé, Maria da Fé, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí))(Passa Quatro, Aiuruoca, Bocaina de Minas)) Santa Rita do Jacutinga Extrema))).

Autor(es)

Silva, Vinícius
Sacramento, Mario
Provete, Diogo

Email

vxsilva@gmail.com
mariosacra@msn.com
dbprovete@gmail.com

Instituição

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal de Goiás