



Congreso Argentino de Herpetología

Resúmenes

**Puerto Madryn, Chubut, Argentina
17-20 Septiembre de 2013**



Asociación Herpetológica Argentina



Centro Nacional Patagónico (CONICET)



Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

The role of environmental and spatial gradients on pond-dwelling anurans metacommunities dynamics

M.V. GAREY¹; D.B. PROVETE²; C.F.B. HADDAD³ & D.C. ROSSA-FERES⁴

¹Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Av. Tancredo Neves, 6731 - Bloco 4, Caixa Postal 2044, CEP 85867-970, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. michel.garey@unila.edu.br ²Departamento de Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, CEP 74001-970, Goiânia, Goiás, Brasil ³Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Caixa Postal 199, CEP 13506-900, Rio Claro, São Paulo, Brasil. ⁴Laboratório de Ecologia Teórica, Departamento de Zoologia e Botânica, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rua Cristóvão Colombo, 2265. Bairro: Jardim Nazareth, CEP 15054-000, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil.

Both spatial and environmental gradients influence species distribution and consequently species richness. However, empirical studies analyzing the metacommunity structure of terrestrial vertebrates are scarce, especially amphibians. Our goal was to evaluate the influence of pond morphology, and spatial variables on the species richness in a pond-dwelling anurans metacommunity in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. We sampled 15 water bodies monthly, recording the richness and abundance of calling males as well as eight environmental variables related to pond morphology. We conducted a partial linear regression analysis to disentangle the environmental, spatial, and spatially structured environmental variation in anuran richness among ponds. We modeled spatial variables using distance-based Moran's Eigenvector Maps. We found 20 species (mean 5.1 species/pond), and the variation in richness among water bodies was mainly influenced by environmental gradients (42%). The spatial distribution of water bodies (30%), and the spatially structured environmental variation (25%) also influenced the species richness distribution. These results suggest a dynamic of mass effect in maintaining species richness in ponds. The highest richness was recorded in environments with few floating vegetation. Nonetheless, habitat use varied among species, and the distribution of individual species was related to different environmental variables. This result demonstrates that each species has different environmental requirements which influenced the spatial distribution of species. Since species had specific associations with environmental variables and the total species richness was related to environmental variables, the preservation of several types of environments in the study area is important for the maintenance of this anuran metacommunity. COMMUNITY ECOLOGY, SPECIES RICHNESS, SPATIAL DISTRIBUTION, ATLANTIC RAINFOREST

Monitoreo de herpetofauna en áreas de Caatinga del Noreste de Brasil

M. GOGLIATH; M. MATOS; C. CARNEIRO; P.A. NICOLA & L.B. RIBEIRO

Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga. Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil. melbiologa@gmail.com, marllamatos17@hotmail.com, carinacarneiro@yahoo.com.br, patinicola@yahoo.com.br, ribeiro.lb@gmail.com

El Proyecto de Integración del Río São Francisco (PISF) es una obra del Gobierno Federal que tiene como objetivo transportar agua para cambiar la realidad social y económica de la región más seca de Brasil. Consiste en dos grandes canales (Eje Este y Eje Norte) que cortan 700 km del bioma Caatinga. Una de las acciones condicionantes del emprendimiento es el monitoreo de la fauna y flora, que tiene como uno de sus fines dar directrices para la conservación. Adicionalmente, permitirá ampliar el conocimiento científico sobre la Caatinga, un bioma exclusivamente brasileño fuertemente amenazado por la antropización y con insuficiente conocimiento sobre su fauna. Este trabajo tiene como objetivo presentar los datos consolidados del período de Marzo/2012 a Mayo/2013 del monitoreo de la herpetofauna del PISF. En total, 21 áreas con diferentes fitofisionomías fueron muestreadas, totalizando 234 días de trabajo de campo. La metodología de muestreo utilizada consistió en 4 líneas de pitfalls, cada una compuesta por 4 baldes (20l) dispuestos en Y, distantes 50 metros uno del otro (14.976 días/balde), además de la busca activa diurna (702 horas/personas) y nocturna (936 horas/persona). Hasta el momento, se registraron 69 especies pertenecientes a 27 familias. La familia con mayor número de especies fue Hylidae, (10 especies) seguida por Dipsadidae (9 especies). Cerca del 60% de las especies registradas son generalistas y de amplia distribución en la Caatinga, 4,3 % dependientes de la red de drenaje, 5,8% relictuales. Estas últimas, más raras en inventarios, son especies que se diferenciaron en un tiempo donde el espacio geográfico de las Caatingas poseía más humedad y por tanto mayor cobertura vegetal. Actualmente, son encontradas solamente en áreas con clima más ameno. El Índice de Jaccard demostró una moderada similitud entre los ejes (0,478), que posiblemente está influenciado por la estacionalidad y evidente heterogeneidad florística.

CAATINGA, HERPETOFAUNA, SEMIARIDO