O GUIA

Como e que horas tomar

Onde a vitamina entra no seu dia, quanto tomar e os cuidados de quem usa remédio.

O melhor horário

O lugar da vitamina é o **café da manhã**, junto com a comida. Não é pra tomar sozinha e sair correndo: com um ovinho ou um queijo do lado ela fica mais completa e você passa a manhã sem fome.

Quanto tomar

- **De manhã:** 1 copo (a receita inteira).
- **À tarde, se bater fome:** meia receita, no lugar da bolacha ou do salgadinho.
- **À noite:** não precisa.

Não precisa tomar todo dia pra sempre. Use a vitamina em vários dias da semana e alterne com os outros cafés da manhã do caderno de pão, arroz e macarrão. Variar é bom.

Um dia de exemplo

Horário	O que comer
7h · café da manhã	Vitamina da manhã + 1 ou 2 ovos
10h · lanche	1 fruta pequena (maçã, pera, goiaba) ou 1 punhadinho de castanhas
12h · almoço	Prato montado: metade salada e legumes, um quarto carne/frango/peixe/ovo, um quarto arroz e feijão
15h30 · lanche	Meia vitamina, ou 1 iogurte natural sem açúcar
19h · jantar	Igual ao almoço, ou sopa de legumes com frango

Os horários são só um exemplo. O mais importante é não pular refeição e manter os horários parecidos todo dia.

Vitamina da Manhã · material de receitas. Não substitui o acompanhamento do seu médico ou nutricionista. Não pare nem mude remédio por conta própria.

Se você usa insulina ou remédio que baixa muito a glicose

Remédios como insulina, glibenclamida e gliclazida podem baixar demais a glicose quando a gente muda o que come de manhã. **Antes de mudar sua rotina, fale com o seu médico.**

Fique de olho nos sinais de glicose baixa: tremedeira, suor frio, tontura, coração acelerado, fome forte de repente ou confusão.

Se sentir isso, meça a glicose se puder, tome meio copo de suco de laranja ou 1 colher (sopa) de açúcar na água e procure atendimento se não melhorar.

Lembrete

Nada aqui substitui seu tratamento. Continue com o remédio do jeitinho que o médico passou e leve este guia na próxima consulta, se quiser.

Vitamina da Manhã · material de receitas. Não substitui o acompanhamento do seu médico ou nutricionista. Não pare nem mude remédio por conta própria.