

Tabelle 2: Ergebnisse zur internen Konsistenz des BDI II aus internationalen Studien

Studie	Stichprobe	Cronbach's α
Psychiatrische Stichproben		
Beck et al. (1996)	500 ambulante Patienten	.92
Beck, Steer et al. (1996)	140 ambulante Patienten	.91
Steer et al. (1998)	840 ambulante Patienten	.92
Steer et al. (1999)	210 ambulante Patienten	.90
Steer et al. (2000)	130 stationäre Geriatriepatienten	.89
Arnau et al. (2001)	340 ambulante Patienten	.94
Krefetz et al. (2002)	100 stationäre jugendliche Patienten (12-17 Jahre)	.92
Kumar et al. (2002)	100 stationäre jugendliche Patienten (12-17 Jahre)	.94
Krefetz et al. (2003)	200 jugendliche Patienten (13-17 Jahre)	.89
Nichtpsychiatrische Stichproben		
Osman et al. (1997)	230 Studenten	.90
Steer & Clark (1997)	160 Studenten	.89
Dozios et al. (1999)	1022 Studenten	.91
Whisman et al. (2000)	576 Studenten	.89
Leigh&Anthony-Tolbert (2001)	36 taube Studenten	.88
Grothe et al. (2005)	220 medizinische Ambulanzpatienten	.90
Nichtenglischsprachige Stichproben		
Al-Musawi (2001)	200 arabische Studenten	.84
Coelho et al. (2002)	775 portugiesische Erwachsene	.89
Kojima et al. (2002)	766 japanische Erwachsene	.87
Bonilla et al. (2004)	351 spanische Studenten	.88
Ghassemzadeh et al. (2005)	125 iranische Studenten	.87