


Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(3) Zufallsvariablen

Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Konstruktion von Zufallsvariablen und Verteilungen

- Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ eine Abbildung.
- ξ ist das kleine griechische Xi.
- Es sei $\mathcal{S}$ eine σ-Algebra auf $\mathcal{X}$.
- Für jedes $S \in \mathcal{S}$ sei das *Urbild von* S definiert als


$$\xi^{-1}(S) := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in S\}. \tag{1}$$

- Wenn $\xi^{-1}(S) \in \mathcal{A}$ für alle $S \in \mathcal{S}$ gilt, dann heißt ξ *messbar*.
- $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ sei messbar. Allen $S \in \mathcal{S}$ kann die Wahrscheinlichkeit

$$\mathbb{P}_\xi : \mathcal{S} \to [0,1], S \mapsto \mathbb{P}_\xi(S) := \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(S)\right) = \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in S\}\right) \tag{2}$$

  zugeordnet werden.
- ξ heißt nun *Zufallsvariable* und $\mathbb{P}_\xi$ heißt *Bildmaß* oder *Verteilung von* ξ.
- $(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi)$ ist ein Wahrscheinlichkeitsraum.
- Mit $\mathcal{X} := \mathbb{R}$ und $\mathcal{S} := \mathcal{B}(\mathbb{R})$ rückt der Wahrscheinlichkeitsraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_\xi)$ ins Zentrum.

Konstruktion von Zufallsvariablen und Verteilungen



$$\mathbb{P}\left(\xi^{-1}(S)\right) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in S\}) =: \mathbb{P}_\xi(S)$$

Definition (Zufallsvariable und Verteilung)

Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(\mathcal{X}, \mathcal{S})$ ein Messraum . Dann heißt eine Abbildung $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ eine *Zufallsvariable (ZV)*, wenn sie die *Messbarkeitseigenschaft*

$$\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in S\} \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } S \in \mathcal{S} \tag{3}$$

besitzt. Weiterhin heißt die durch

$$\mathbb{P}_\xi : \mathcal{S} \to [0,1], S \mapsto \mathbb{P}_\xi(S) := \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(S)\right) = \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in S\}\right) \tag{4}$$

definierte Abbildung die *Verteilung der Zufallsvariable* ξ. Dabei nennt man $\mathcal{X}$ den *Ergebnisraum der Zufallsvariable* ξ und für ein $\omega \in \Omega$ den Wert $\xi(\omega)$ eine *Realisierung der Zufallsvariable* ξ.

Bemerkungen

- Zufallsvariablen sind weder “zufällig” noch “Variablen”.
- Intuitiv wird $\omega \in \Omega$ “zufällig” anhand von $\mathbb{P}$ gezogen und $\xi(\omega)$ realisiert.
- Verteilungen von Zufallsvariablen sind in der Statistik zentral.
- Das Wort “Verteilung” wird oft auch für die zugehörige WMF oder WDF verwendet.

Theorem (Verteilung einer Zufallsvariable)

Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum, $(\mathcal{X}, \mathcal{S})$ ein Messraum, $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ eine Zufallsvariable und $\mathbb{P}_\xi$ die Verteilung von ξ. Dann ist $\mathbb{P}_\xi$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\mathcal{X}, \mathcal{S})$ und $(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum.

Beweis

1. *Nichtnegativität* ($\mathbb{P}_\xi(S) \geq 0$ für alle $S \in \mathcal{S}$). Da ξ eine Zufallsvariable ist, gilt $\xi^{-1}(S) \in \mathcal{A}$ für alle $S \in \mathcal{S}$ und weil $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, gilt dann

$$\mathbb{P}_\xi(S) = \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(S)\right) \geq 0 \text{ für alle } S \in \mathcal{S}. \tag{5}$$

2. *Normiertheit* ($\mathbb{P}_\xi(\mathcal{X}) = 1$). Da $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ eine Funktion ist, ordnet ξ jedem $\omega \in \Omega$ genau ein $x \in \mathcal{X}$ zu. Damit gilt

$$\xi^{-1}(\mathcal{X}) = \Omega. \tag{6}$$

Da $\mathcal{X} \in \mathcal{S}$ und weil $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, gilt dann

$$\mathbb{P}_\xi(\mathcal{X}) = \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\mathcal{X})\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1. \tag{7}$$

3. *σ-Additivität* ($\mathbb{P}_\xi\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}_\xi(S_i)$ für paarweise disjunkte $S_1, S_2, \ldots \in \mathcal{S}$). Da ξ eine Zufallsvariable ist, liegen die Urbilder $\xi^{-1}(S_i)$ in $\mathcal{A}$. Aus $S_i \cap S_j = \emptyset$ für $i \neq j$ folgt mit Aussage 2. des Theorems Urbilder von Vereinigungen und Durchschnitten im Anhang und $\xi^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ außerdem

$$\xi^{-1}(S_i) \cap \xi^{-1}(S_j) = \xi^{-1}(S_i \cap S_j) = \emptyset. \tag{8}$$

Dann folgt mit Aussage 1. desselben Theorems und der σ-Additivität von $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{P}_\xi\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i\right) = \mathbb{P}\left(\xi^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \xi^{-1}(S_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(S_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}_\xi(S_i). \tag{9}$$

Beispiel (Summe eines roten und eines blauen Würfels)

- Für das Werfen eines roten und eines blauen Würfels ist ein sinnvolles W-Raummodell
  - $\Omega := \{(r,b) | r \in \mathbb{N}_6, b \in \mathbb{N}_6\}$
  - $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$.
  - $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ mit $\mathbb{P}(\{(r,b)\}) = \frac{1}{36}$ für alle $(r,b) \in \Omega$.
- Die Augenzahl-Summenbildung wird dann sinnvollerweise durch die Zufallsvariable

$$\xi : \Omega \to \mathcal{X}, (r,b) \mapsto \xi((r,b)) := r + b. \tag{10}$$

  beschrieben, wobei $\mathcal{X} := \{2, 3, ..., 12\}$.
- $\mathcal{S} := \mathcal{P}(\mathcal{X})$ ist eine sinnvolle σ-Algebra auf $\mathcal{X}$.
- Mithilfe der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ können wir die Verteilung $\mathbb{P}_\xi$ von ξ für alle Elementarereignisse $\{x\} \in \mathcal{S}$ berechnen, wie auf der nächsten Folie gezeigt.
- Wir haben damit ein weiteres Wahrscheinlichkeitsraum-Modell $(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi)$ konstruiert.

Beispiel (Summe eines roten und eines blauen Würfels)

Bestimmung der Verteilung $\mathbb{P}_\xi$ von ξ durch Bestimmung der Elementarereigniswahrscheinlichkeiten

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}_\xi(\{2\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{2\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(1,1)\}\right) &&= \tfrac{1}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{3\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{3\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(1,2),(2,1)\}\right) &&= \tfrac{2}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{4\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{4\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(1,3),(3,1),(2,2)\}\right) &&= \tfrac{3}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{5\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{5\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(1,4),(4,1),(2,3),(3,2)\}\right) &&= \tfrac{4}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{6\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{6\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(1,5),(5,1),(2,4),(4,2),(3,3)\}\right) &&= \tfrac{5}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{7\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{7\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(1,6),(6,1),(2,5),(5,2),(3,4),(4,3)\}\right) &&= \tfrac{6}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{8\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{8\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(2,6),(6,2),(3,5),(5,3),(4,4)\}\right) &&= \tfrac{5}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{9\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{9\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(3,6),(6,3),(4,5),(5,4)\}\right) &&= \tfrac{4}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{10\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{10\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(4,6),(6,4),(5,5)\}\right) &&= \tfrac{3}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{11\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{11\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(5,6),(6,5)\}\right) &&= \tfrac{2}{36}\\
\mathbb{P}_\xi(\{12\}) &= \mathbb{P}\left(\xi^{-1}(\{12\})\right) &&= \mathbb{P}\left(\{(6,6)\}\right) &&= \tfrac{1}{36}
\end{aligned}
$$

Beispiel (Summe eines roten und eines blauen Würfels)

Simulation

```
# Wahrscheinlichkeitsraummodell
Omega    = list()                                  # Ergebnisrauminitialisierung
idx      = 1                                       # Ergebnisindexinitialisierung
for(r in 1:6){                                     # Ergebnisse roter  Würfel
    for(b in 1:6){                                 # Ergebnisse blauer Würfel
        Omega[[idx]] = c(r,b)                      # \omega \in \Omega
        idx          = idx + 1 }}                  # Ergebnisindexupdate
K        = length(Omega)                           # Kardinalität von \Omega
pi       = rep(1/K,1,K)                            # Wahrscheinlichkeitsfunktion \pi

# Zufallsvorgang
omega    = Omega[[which(rmultinom(1,1,pi) == 1)]] # Auswahl von \omega anhand von \P({\omega})

# Auswertung der Zufallsvariable
xi_omega = sum(omega)                              # \xi(\omega)
```

```
omega     :  2 1
xi(omega) :  3
```

Definition (Notation für Zufallsvariablen)

Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ und $(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi)$ Wahrscheinlichkeitsräume und $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ sei eine Zufallsvariable. Dann gelten mit $S \in \mathcal{S}$ und $x \in \mathcal{X}$ folgende Notationskonventionen für Ereignisse in $\mathcal{A}$:


$$\{\xi \in S\} := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in S\}$$
$$\{\xi = x\} := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x\}$$
$$\{\xi \leq x\} := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \leq x\}$$
$$\{\xi < x\} := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) < x\}$$
$$\{\xi \geq x\} := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \geq x\}$$
$$\{\xi > x\} := \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) > x\}$$

Aus diesen Konventionen ergeben sich folgende Konventionen für Wahrscheinlichkeiten von Verteilungen

$$\mathbb{P}_\xi(\xi \in S) = \mathbb{P}(\{\xi \in S\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \in S\})$$
$$\mathbb{P}_\xi(\xi = x) = \mathbb{P}(\{\xi = x\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x\})$$
$$\mathbb{P}_\xi(\xi \leq x) = \mathbb{P}(\{\xi \leq x\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \leq x\})$$
$$\mathbb{P}_\xi(\xi < x) = \mathbb{P}(\{\xi < x\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) < x\})$$
$$\mathbb{P}_\xi(\xi \geq x) = \mathbb{P}(\{\xi \geq x\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \geq x\})$$
$$\mathbb{P}_\xi(\xi > x) = \mathbb{P}(\{\xi > x\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) > x\})$$

Oft wird zudem auf das Subskript bei Verteilungssymbolen verzichtet und zum Beispiel $\mathbb{P}_\xi(\xi \in S)$ nur als $\mathbb{P}(\xi \in S)$ geschrieben, solange sich aus dem Kontext keine Verwechselungsmöglichkeit ergeben kann.

Zufallsvariablen als Modelle von Messvorgängen



Theorem (Arithmetik reeller Zufallsvariablen)

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sei ein Wahrscheinlichkeitsraum, $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sei der reelle Messraum, $\xi_1 : \Omega \to \mathbb{R}$ und $\xi_2 : \Omega \to \mathbb{R}$ seien reellwertige Zufallsvariablen und $c \in \mathbb{R}$ sei eine Konstante. Weiterhin seien

$$\begin{aligned} \xi_1 + c : \Omega \to \mathbb{R}, \omega \mapsto (\xi_1 + c)(\omega) &:= \xi_1(\omega) + c \text{ für } c \in \mathbb{R} \\ c\xi_1 : \Omega \to \mathbb{R}, \omega \mapsto (c\xi_1)(\omega) &:= c\xi_1(\omega) \text{ für } c \in \mathbb{R} \\ \xi_1 + \xi_2 : \Omega \to \mathbb{R}, \omega \mapsto (\xi_1 + \xi_2)(\omega) &:= \xi_1(\omega) + \xi_2(\omega) \\ \xi_1\xi_2 : \Omega \to \mathbb{R}, \omega \mapsto (\xi_1\xi_2)(\omega) &:= \xi_1(\omega)\xi_2(\omega) \end{aligned} \tag{11}$$

die Addition einer Konstante zu einer reellwertigen Zufallsvariable, die Multiplikation einer reellwertigen Zufallsvariable mit einer Konstante, die Addition zweier reellwertiger Zufallsvariablen und die Multiplikation zweier reellwertiger Zufallsvariablen, respektive. Dann sind auch $\xi_1 + c$, $c\xi_1$, $\xi_1 + \xi_2$ und $\xi_1\xi_2$ reellwertige Zufallsvariablen.

Bemerkungen

- Intuitiv ergibt die Addition einer zufälligen Größe zu einer konstanten Größe eine zufällige Größe.
- Intuitiv ergibt die Multiplikation einer zufälligen Größe mit einer Konstante eine zufällige Größe.
- Intuitiv ergibt die Addition zweier zufälliger Größen wiederum eine zufällige Größe.
- Intuitiv ergibt die Multiplikation zweier zufälliger Größen wiederum eine zufällige Größe.
- Für einen Beweis siehe zum Beispiel Hesse (2009), Seite 33-34.

Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Definition (Diskrete Zufallsvariable und WMF)

Eine Zufallsvariable ξ heißt *diskret*, wenn ihr Ergebnisraum $\mathcal{X}$ endlich oder abzählbar ist und eine Funktion der Form

$$p : \mathcal{X} \to [0, 1],\ x \mapsto p(x) \tag{12}$$

existiert, für die gilt

1. $\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1$ und
2. $\mathbb{P}_\xi(\xi = x) = p(x)$ für alle $x \in \mathcal{X}$.

Eine entsprechende Funktion p heißt *Wahrscheinlichkeitsmassefunktion (WMF)* von ξ.

Bemerkungen

- Eine Menge heißt abzählbar, wenn sie bijektiv auf $\mathbb{N}$ abgebildet werden kann.
- WMFen heißen im Deutschen auch *W-Funktionen* oder *Zähldichten*.
- WMFen heißen auf Englisch *probability mass functions (PMFs)*.
- Die Eigenschaft $\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1$ nennt man auch *Normiertheit* von p.
- Zur Parallelität mit PMFs und WDFs bevorzugen wir den Begriff WMF.

Definition (Bernoulli-Zufallsvariable)

Es sei ξ eine Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \{0, 1\}$ und WMF

$$p : \mathcal{X} \to [0, 1], x \mapsto p(x) := \mu^x (1 - \mu)^{1-x} \text{ mit } \mu \in [0, 1]. \tag{13}$$

Dann sagen wir, dass ξ einer *Bernoulli-Verteilung mit Parameter* $\mu \in [0, 1]$ unterliegt und nennen ξ eine *Bernoulli-Zufallsvariable*. Wir kürzen dies mit $\xi \sim \text{Bern}(\mu)$ ab. Die WMF einer Bernoulli-Zufallsvariable bezeichnen wir mit

$$\text{Bern}(x; \mu) := \mu^x (1 - \mu)^{1-x}. \tag{14}$$


Bemerkungen

- Wir verwenden die Konvention $0^0 := 1$.
- Eine Bernoulli-Zufallsvariable kann als Modell eines Münzwurfs dienen.
- μ ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ξ den Wert 1 annimmt,

$$\mathbb{P}(\xi = 1) = \mu^1 (1 - \mu)^{1-1} = \mu. \tag{15}$$

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Bernoulli-Zufallsvariable



Definition (Binomial-Zufallsvariable)

Es sei ξ eine Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathbb{N}_n^0$ und WMF

$$p : \mathcal{X} \to [0, 1], x \mapsto p(x) := \binom{n}{x} \mu^x (1 - \mu)^{n-x} \text{ für } \mu \in [0, 1]. \tag{16}$$

Dann sagen wir, dass ξ einer *Binomialverteilung mit Parametern* $n \in \mathbb{N}$ *und* $\mu \in [0, 1]$ unterliegt und nennen ξ eine Binomial-Zufallsvariable. Wir kürzen dies mit $\xi \sim \text{Bin}(n, \mu)$ ab. Die WMF einer Binomial-Zufallsvariable bezeichnen wir mit


$$\text{Bin}(x; n, \mu) := \binom{n}{x} \mu^x (1 - \mu)^{n-x}. \tag{17}$$

Bemerkung

- Es gilt $\text{Bin}(x; 1, \mu) = \text{Bern}(x; \mu)$.

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Binomial-Zufallsvariable



Definition (Diskret-gleichverteilte Zufallsvariable)

Es sei ξ eine diskrete Zufallsvariable mit nichtleerem endlichem Ergebnisraum $\mathcal{X}$ und WMF

$$p : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad x \mapsto p(x) := \frac{1}{|\mathcal{X}|}. \tag{18}$$


Dann sagen wir, dass ξ einer *diskreten Gleichverteilung auf* $\mathcal{X}$ unterliegt und nennen ξ eine *diskret-gleichverteilte Zufallsvariable*. Wir kürzen dies mit $\xi \sim U(\mathcal{X})$ ab. Die WMF einer diskret-gleichverteilten Zufallsvariable bezeichnen wir mit


$$U(x; \mathcal{X}) := \frac{1}{|\mathcal{X}|} \quad \text{für } x \in \mathcal{X}. \tag{19}$$


Bemerkungen

- $\text{Bern}(x; 0.5) = U(x; \mathcal{X})$ für $\mathcal{X} = \{0, 1\}$.

Diskret-gleichverteilte Zufallsvariable







Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Definition (Kontinuierliche Zufallsvariable und WDF)

Eine reellwertige Zufallsvariable ξ heißt *kontinuierlich*, wenn eine Funktion

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto p(x) \tag{20}$$

existiert, für die gilt

1. $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,dx = 1$ und
2. $\mathbb{P}_{\xi}(\xi \in [a, b]) = \int_a^b p(x)\,dx$ für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \leq b$.

Eine entsprechende Funktion p heißt *Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF)* von ξ.

Bemerkungen

- WDFen können Werte größer als 1 annehmen.
- Es gilt $\mathbb{P}_{\xi}(\xi = a) = \int_a^a p(x)\,dx = 0$ für alle $a \in \mathbb{R}$.
- Wahrscheinlichkeiten werden aus WDFen durch Integration berechnet.
- Für ein Intervall $[a, b]$, auf dem sich die Dichte nur wenig verändert, gilt näherungsweise

$$\mathbb{P}(\xi \in [a, b]) = \int_a^b p(x)\,dx \approx p(x_0)(b - a), \quad x_0 \in [a, b]. \tag{21}$$

  also intuitiv:

$$\text{Wahrscheinlichkeitsmasse} \approx \text{Dichte(höhe)} \times \text{Volumen (Intervallbreite)}. \tag{22}$$

- Ist die Dichte auf dem Intervall konstant, gilt die Beziehung exakt.
- Ist die WDF nur auf $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ angegeben, setzen wir sie außerhalb von $\mathcal{X}$ durch 0 fort.

Definition (Normalverteilte und standardnormalverteilte Zufallsvariablen)

Es sei ξ eine Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathbb{R}$ und WDF

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto p(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right). \tag{23}$$

Dann sagen wir, dass ξ einer *Normalverteilung (oder Gauß-Verteilung) mit Parametern* $\mu \in \mathbb{R}$ *und* $\sigma^2 > 0$ unterliegt und nennen ξ eine *normalverteilte Zufallsvariable*. Wir kürzen dies mit $\xi \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$ ab. Die WDF einer normalverteilten Zufallsvariable bezeichnen wir mit


$$N\left(x; \mu, \sigma^2\right) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right). \tag{24}$$

Eine normalverteilte Zufallsvariable mit $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$ heißt *standardnormalverteilte Zufallsvariable* und wird häufig mit Z bezeichnet.

Bemerkungen

- Der Parameter μ entspricht dem Wert höchster Wahrscheinlichkeitsdichte.
- Der Parameter σ^2 spezifiziert die Breite der WDF.

Normalverteilte Zufallsvariablen



Definition (Gamma-Zufallsvariable)

Es sei ξ eine Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathcal{X} := \mathbb{R}_{>0}$ und WDF

$$p : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto p(x) := \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), \tag{25}$$


wobei Γ die Gammafunktion bezeichne. Dann sagen wir, dass ξ einer *Gammaverteilung mit Formparameter $\alpha > 0$ und Skalenparameter $\beta > 0$* unterliegt und nennen ξ eine *gammaverteilte Zufallsvariable*. Wir kürzen dies mit $\xi \sim G(\alpha, \beta)$ ab. Die WDF einer gammaverteilten Zufallsvariable bezeichnen wir mit

$$G(x; \alpha, \beta) := \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right). \tag{26}$$

Bemerkung

- $G\left(\frac{n}{2}, 2\right)$ heißt auch *Chi-Quadrat-Verteilung (χ^2-Verteilung) mit n Freiheitsgraden*.

Gamma-Zufallsvariablen



Definition (Beta-Zufallsvariable)


Es sei ξ eine Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathcal{X} :=]0, 1[$ und WDF

$$p : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto p(x) := \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} \text{ mit } \alpha, \beta \in \mathbb{R}_{>0}, \tag{27}$$

wobei Γ die Gammafunktion bezeichne. Dann sagen wir, dass ξ einer *Beta-Verteilung* mit Parametern $\alpha > 0$ und $\beta > 0$ unterliegt und nennen ξ eine *Beta-Zufallsvariable*. Wir kürzen dies mit $\xi \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ ab. Die WDF einer Beta-Zufallsvariable bezeichnen wir mit

$$\text{Beta}(x; \alpha, \beta) := \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} \quad \text{für } x \in]0, 1[. \tag{28}$$

Beta-Zufallsvariable



Definition (Gleichverteilte Zufallsvariable)


Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Weiterhin sei ξ eine kontinuierliche Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathbb{R}$ und WDF

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto p(x) := \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}. \tag{29}$$

Dann sagen wir, dass ξ einer *Gleichverteilung mit Parametern a und b* unterliegt und nennen ξ eine *gleichverteilte Zufallsvariable*. Wir kürzen dies mit $\xi \sim U(a, b)$ ab. Die WDF einer gleichverteilten Zufallsvariablen bezeichnen wir mit

$$U(x; a, b) := \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}. \tag{30}$$

Gleichverteilte Zufallsvariablen



Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Definition (Kumulative Verteilungsfunktion)

Die *kumulative Verteilungsfunktion (KVF)* einer Zufallsvariable ξ ist definiert als

$$P : \mathbb{R} \to [0, 1], x \mapsto P(x) := \mathbb{P}(\xi \leq x). \tag{31}$$

Bemerkungen

- KVFen sind sowohl für diskrete als auch kontinuierliche ZVen definiert.
- $P(x)$ ist für jedes $x \in \mathbb{R}$ definiert, auch wenn $x \notin \mathcal{X}$.
- Mithilfe von KVFen können Überschreitungs- und Intervallwahrscheinlichkeiten angegeben werden.

Theorem (Überschreitungswahrscheinlichkeit)

Es sei ξ eine reellwertige Zufallsvariable und P ihre kumulative Verteilungsfunktion. Dann gilt für die *Überschreitungswahrscheinlichkeit* $\mathbb{P}(\xi > x)$, dass

$$\mathbb{P}(\xi > x) = 1 - P(x) \text{ für alle } x \in \mathbb{R}. \tag{32}$$

Beweis

Die Ereignisse $\{\xi > x\}$ und $\{\xi \leq x\}$ sind disjunkt und

$$\Omega = \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) > x\} \cup \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) \leq x\} = \{\xi > x\} \cup \{\xi \leq x\}. \tag{33}$$

Mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ folgt dann

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(\Omega) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & \mathbb{P}(\{\xi > x\} \cup \{\xi \leq x\}) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & \mathbb{P}(\{\xi > x\}) + \mathbb{P}(\{\xi \leq x\}) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & \mathbb{P}(\{\xi > x\}) = 1 - \mathbb{P}(\{\xi \leq x\}) \\ \Leftrightarrow\ & \mathbb{P}(\{\xi > x\}) = 1 - P(x). \end{aligned} \tag{34}$$

□

Theorem (Intervallwahrscheinlichkeiten)

Es sei ξ eine reellwertige Zufallsvariable und P ihre kumulative Verteilungsfunktion. Dann gilt für die *Intervallwahrscheinlichkeit* $\mathbb{P}(\xi \in]x_1, x_2])$, dass

$$\mathbb{P}(\xi \in]x_1, x_2]) = P(x_2) - P(x_1) \text{ für alle } x_1, x_2 \in \mathbb{R} \text{ mit } x_1 < x_2. \tag{35}$$

Beweis

Wir betrachten die Ereignisse $\{\xi \leq x_1\}$, $\{x_1 < \xi \leq x_2\}$ und $\{\xi \leq x_2\}$, wobei

$$\{\xi \leq x_1\} \cap \{x_1 < \xi \leq x_2\} = \emptyset \text{ und } \{\xi \leq x_1\} \cup \{x_1 < \xi \leq x_2\} = \{\xi \leq x_2\}. \tag{36}$$

gelten. Mit der σ-Additivität von $\mathbb{P}$ gilt dann

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(\{\xi \leq x_1\} \cup \{x_1 < \xi \leq x_2\}) = \mathbb{P}(\{\xi \leq x_2\}) \\
\Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(\{\xi \leq x_1\}) + \mathbb{P}(\{x_1 < \xi \leq x_2\}) = \mathbb{P}(\{\xi \leq x_2\}) \\
\Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(\{x_1 < \xi \leq x_2\}) = \mathbb{P}(\{\xi \leq x_2\}) - \mathbb{P}(\{\xi \leq x_1\}) \\
\Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(\{x_1 < \xi \leq x_2\}) = P(x_2) - P(x_1) \\
\Leftrightarrow\ &\mathbb{P}(\xi \in]x_1, x_2]) = P(x_2) - P(x_1).
\end{aligned} \tag{37}$$

□

Theorem (Eigenschaften von kumulativen Verteilungsfunktionen)

Es sei ξ eine Zufallsvariable und P ihre kumulative Verteilungsfunktion. Dann hat P die folgenden Eigenschaften

1. P ist *monoton steigend*, das heißt, wenn $x_1 < x_2$, dann gilt $P(x_1) \leq P(x_2)$.
2. $\lim_{x \to -\infty} P(x) = 0$ und $\lim_{x \to \infty} P(x) = 1$.
3. P ist *rechtsseitig stetig*, das heißt, $P(x) = \lim_{y \to x, y > x} P(y)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Bemerkungen

- Wir verzichten auf einen Beweis.
- Die genannten Eigenschaften können auch zur Definition einer KVF genutzt werden.
- Aussage 3. besagt, dass eine KVF keine Sprünge hat, wenn man sich Grenzpunkten von rechts nähert.


Kumulative Verteilungsfunktionen von diskreten Zufallsvariablen


- Wenn $a < b$ und $\mathbb{P}(a < \xi < b) = 0$, dann ist P konstant horizontal auf $]a, b[$.
- An jedem Punkt x mit $\mathbb{P}(\xi = x) > 0$ springt die KVF um den Betrag $\mathbb{P}(\xi = x)$.
- $\Leftrightarrow$ An jedem Punkt x mit $p(x) > 0$ springt die KVF um den Betrag $p(x) > 0$.
- Generell ist die KVF einer diskreten Zufallsvariable mit Ergebnisraum $\mathbb{N}_0$ durch


$$P : \mathbb{R} \to [0, 1], x \mapsto P(x) := \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \mathbb{P}(\xi = k) \tag{38}$$


gegeben, wobei $\lfloor x \rfloor$ die Abrundungsfunktion bezeichnet.


Bernoulli-Zufallsvariablen



















Binomial-Zufallsvariablen














Theorem (KVFen von kontinuierlichen Zufallsvariablen)

ξ sei eine kontinuierliche Zufallsvariable mit WDF p und KVF P. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$P(x) = \int_{-\infty}^{x} p(s)\, ds. \tag{39}$$

An jeder Stelle x, an der p stetig ist, gilt außerdem

$$P'(x) = p(x). \tag{40}$$

Beweis

Nach Definition der KVF gilt $P(x) = \mathbb{P}(\xi \leq x)$. Da Wahrscheinlichkeiten unter einer Verteilung mit Dichte durch Integration berechnet werden, folgt

$$P(x) = \mathbb{P}(\xi \leq x) = \int_{-\infty}^{x} p(s)\, ds. \tag{41}$$

Ist p an der Stelle x stetig, so folgt aus dem ersten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

$$P'(x) = p(x). \tag{42}$$

Bemerkungen

- Ist die WDF stetig, so ist die KVF eine Stammfunktion der WDF.
- An jeder Stetigkeitsstelle der WDF ist diese die Ableitung der KVF.
- Das *Theorem von Radon-Nikodym* ist eine generalisierte Variante dieser Einsicht.
- KVFen von kontinuierlichen ZV heißen auch kumulative Dichtefunktionen (KDFen).

Beispiel (Normalverteilung)

Es sei $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Die WDF von ξ ist


$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto p(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right).$$

- Die KVF von ξ ist

$$P : \mathbb{R} \to]0,1[, x \mapsto P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(s-\mu)^2\right) ds.$$

- Die KVF der Normalverteilung lässt sich nicht durch elementare Funktionen ausdrücken.
- Die Werte der KVF der Normalverteilung werden in der Praxis numerisch berechnet.
- Für $\mu = 1, \sigma^2 = 1$ gilt zum Beispiel $p(2) \approx 0.24$ und $P(2) \approx 0.84$.
- Die WDF und KVF von $Z \sim N(0,1)$ werden oft mit ϕ und Φ, respektive, bezeichnet.

Normalverteilte Zufallsvariablen



Definition (Inverse kumulative Verteilungsfunktion)

ξ sei eine kontinuierliche Zufallsvariable mit KVF P. Für jedes $q \in]0,1[$ gebe es genau ein $x \in \mathbb{R}$ mit $P(x) = q$. Dann heißt die Funktion

$$P^{-1} :]0,1[\to \mathbb{R}, \quad q \mapsto P^{-1}(q), \tag{43}$$

die jedem q diesen eindeutig bestimmten Wert x zuordnet, die *inverse kumulative Verteilungsfunktion von* ξ. Es gilt also

$$P^{-1}(q) = x \iff P(x) = q. \tag{44}$$

Bemerkungen

- Für alle $q \in]0,1[$ gilt $P(P^{-1}(q)) = q$.
- Für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $0 < P(x) < 1$ gilt $P^{-1}(P(x)) = x$.
- Offenbar gilt $P(x) = q \Leftrightarrow \mathbb{P}(\xi \leq x) = q$.
- Für $q \in]0,1[$ ist also $P^{-1}(q)$ der Wert x von ξ, so dass $\mathbb{P}(\xi \leq x) = q$ gilt.
- Wenn $Z \sim N(0,1)$ mit KVF Φ ist, dann gilt zum Beispiel $\Phi^{-1}(0.975) \approx 1.960$.

Beispiel (Normalverteilung)

Es sei $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Die KVF von ξ ist

$$P : \mathbb{R} \to]0,1[, x \mapsto \mathbb{P}(\xi \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(s-\mu)^2\right) ds \tag{45}$$


- Die inverse KVF von ξ ist


$$P^{-1} :]0,1[\to \mathbb{R}, \quad q \mapsto P^{-1}(q), \quad P^{-1}(q) = x \iff P(x) = q. \tag{46}$$


- Für $\mu = 1, \sigma^2 = 1$ gilt z. B., dass $P(2) \approx 0.84$ und $P^{-1}(0.84) \approx 2$.
- Die inverse KVF von $\xi \sim N(0,1)$ wird oft mit Φ^{-1} bezeichnet.
- Typische Beispielwerte für die KVF und inverse KVF von $N(0,1)$ sind


$$\Phi(1.645) \approx 0.950 \qquad \Phi^{-1}(0.950) = \Phi^{-1}(1 - 0.050) \approx 1.645$$
$$\Phi(1.960) \approx 0.975 \qquad \Phi^{-1}(0.975) = \Phi^{-1}\left(1 - \tfrac{0.050}{2}\right) \approx 1.960$$


Normalverteilte Zufallsvariablen














Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Wir haben drei Möglichkeiten zur Festlegung von W-Raummodellen für Zufallsvorgänge kennengelernt

(1) Definition von $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ mit einer Wahrscheinlichkeitsfunktion π.
(2) Definition von $(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi)$ für eine Zufallsvariable ξ durch eine WMF/WDF p oder eine KVF P.
(3) Definition von $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, Definition einer Zufallsvariable $\xi : \Omega \to \mathcal{X}$ und Herleitung von $\mathbb{P}_\xi$ in $\left(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi\right)$.

Abschließend wollen wir die Äquivalenz dieser Herangehensweisen zur Modellierung von Zufallsvorgängen betrachten.

Zunächst halten wir fest

(1) herrscht in Einführungen zur W-Theorie und mathematisch-orientierter W-Theorie vor (vgl. Fristedt (1998))
(2) herrscht in statistischen und datenwissenschaftlichen Anwendungen (ML, KI) vor (vgl. Demidenko (2020))

Es gilt, dass (1) und (2) äquivalent sind und (3) essentiell für die Theorie datenwissenschaftlicher Anwendungen ist.

Die Äquivalenz von (1) und (2) ergibt sich dabei durch Definition einer Zufallsvariable als Identitätsabbildung.

Wir wollen die Äquivalenz von (1) und (2) an zwei Beispielen verdeutlichen.

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

"Wir modellieren den Zufallsvorgang *Werfen eines Würfels* mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$"

- Wie gesehen würden wir hier $\Omega := \mathbb{N}_6$ und $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\mathbb{N}_6)$ wählen und $\mathbb{P}$ durch eine W-Funktion π festlegen.
- In jedem Durchgang des Zufallsvorgangs wird ein Ergebnis zufällig anhand von $\mathbb{P}(\{\omega\})$ realisiert.
- Man mag die so realisierten Ergebnisse $\omega_1, \omega_2, \ldots$ als Realisationen einer *Zufallsgröße* betrachten.
- Die realisierten Ergebnisse könnten z. B. wiederholten Würfelwürfen entsprechen.

"Wir modellieren den Zufallsvorgang *Werfen eines Würfels* mit einer Zufallsvariable ξ"

- Man würde hier $\mathcal{X} := \mathbb{N}_6$ und $\mathcal{S} := \mathcal{P}(\mathbb{N}_6)$ wählen und $\mathbb{P}_\xi$ durch eine WMF p_ξ festlegen.
- Die Realisierung $\xi = x$ hat dann die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}_\xi(\xi = x) = p_\xi(x)$.
- Implizit hat man hier die Zufallsvariable ξ als die Identitätsfunktion

$$\xi : \mathcal{X} \to \mathcal{X}, x \mapsto \xi(x) := x \tag{47}$$

  auf einem zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ mit $\Omega = \mathcal{X}$ und $\mathcal{A} = \mathcal{S}$ festgelegt.
- Insbesondere gilt die Äquivalenz der WMF p_ξ auf $\mathcal{X}$ und der W-Funktion π auf $\Omega = \mathcal{X}$, denn

$$p_\xi(x) = \mathbb{P}_\xi(\xi = x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x\}) = \mathbb{P}(\{x\}) = \pi(x) \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{48}$$

- Damit gilt dann letztlich

$$(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi) = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \tag{49}$$

- Betrachten des zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ergibt also keinen Mehrwert.

$\Rightarrow$ Generell wird hier die erste Sprechweise bevorzugt

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

"Wir modellieren einen *BDI-II-Itemwert einer Patient:in* mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$"

- Wie gesehen würden wir hier $\Omega := \mathbb{N}_3^0$ und $\mathcal{A} := \mathcal{P}(\Omega)$ wählen und $\mathbb{P}$ durch eine W-Funktion π festlegen.
- In jedem Durchgang des Zufallsvorgangs wird ein Ergebnis zufällig anhand von $\mathbb{P}(\{\omega\})$ realisiert.
- Man mag die so realisierten Ergebnisse $\omega_1, \omega_2, \ldots$ als Realisationen einer *Zufallsgröße* betrachten.
- Die realisierten Ergebnisse könnten z. B. wiederholten Messungen an einer Patient:in entsprechen.

"Wir modellieren einen *BDI-II-Itemwert einer Patient:in* als Realisation einer Zufallsvariable ξ"

- Man würde hier $\mathcal{X} := \mathbb{N}_3^0$ und $\mathcal{S} := \mathcal{P}(\mathcal{X})$ wählen und $\mathbb{P}_\xi$ durch eine WMF p_ξ festlegen.
- Die Realisierung $\xi = x$ hat dann die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}_\xi(\xi = x) = p_\xi(x)$.
- Implizit hat man hier die Zufallsvariable ξ als die Identitätsfunktion

$$\xi : \mathcal{X} \to \mathcal{X}, x \mapsto \xi(x) := x \tag{50}$$

  auf einem zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ mit $\Omega = \mathcal{X}$ und $\mathcal{A} = \mathcal{S}$ festgelegt.
- Insbesondere gilt die Äquivalenz der WMF p_ξ auf $\mathcal{X}$ und der W-Funktion π auf $\Omega = \mathcal{X}$, denn

$$p_\xi(x) = \mathbb{P}_\xi(\xi = x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x\}) = \mathbb{P}(\{x\}) = \pi(x) \text{ für alle } x \in \mathcal{X}. \tag{51}$$

- Damit gilt dann letztlich

$$(\mathcal{X}, \mathcal{S}, \mathbb{P}_\xi) = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \tag{52}$$

- Betrachten des zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraums $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ergibt also keinen Mehrwert.

$\Rightarrow$ Generell wird hier die zweite Sprechweise bevorzugt

Konstruktion, Definition, Notation, Intuition

Wahrscheinlichkeitsmassefunktionen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen

Kumulative Verteilungsfunktionen

Zufallsergebnisse und Zufallsvariablen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Begriffs der Zufallsvariable wieder.
2. Erläutern Sie die Gleichung $\mathbb{P}_\xi(\xi = x) = \mathbb{P}(\{\xi = x\})$.
3. Erläutern Sie die intuitive Bedeutung von $\mathbb{P}(\xi = x)$.
4. Geben Sie die Definition des Begriffs der Wahrscheinlichkeitsmassefunktion wieder.
5. Geben Sie die Definition des Begriffs der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wieder.
6. Geben Sie die Definition der WDF einer normalverteilten Zufallsvariable wieder.
7. Geben Sie die Definition des Begriffs der kumulativen Verteilungsfunktion wieder.
8. Schreiben Sie die Intervallwahrscheinlichkeit einer Zufallsvariable mithilfe ihrer KVF.
9. Schreiben Sie den Wert $P(x)$ der KVF einer kontinuierlichen Zufallsvariable mithilfe ihrer WDF p.
10. Schreiben Sie den Wert $p(x)$ der WDF einer kontinuierlichen Zufallsvariable mithilfe ihrer KVF P.
11. Geben Sie die Definition der KVF einer normalverteilten Zufallsvariable wieder.
12. Geben Sie die Definition des Begriffs der inversen Verteilungsfunktion wieder.

Selbstkontrollfragen - Lösungen

1. Siehe Definition (Zufallsvariable).
2. Die Gleichung besagt, dass der von der Verteilung $\mathbb{P}_\xi$ der Zufallsvariable ξ zugeordnete Wahrscheinlichkeitswert für das Ereignis $\xi = x$ in $\mathcal{X}$ definitionsgemäß gleich dem Wert ist, den das Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ dem Urbild des Ereignisses $\xi = x$, also der Menge $\{\xi = x\} = \{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x\}$ in $\mathcal{A}$, zuordnet. Siehe Definition (Notation von Zufallsvariablen).
3. Intuitiv ist $\mathbb{P}(\xi = x)$ die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable ξ den Wert x annimmt.
4. Siehe Definition (Diskrete Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeitsmassefunktion).
5. Siehe Definition (Kontinuierliche Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion).
6. Siehe Definition (Normalverteilte und standardnormalverteilte Zufallsvariable).
7. Siehe Definition (Kumulative Verteilungsfunktion).
8. Siehe Theorem (Intervallwahrscheinlichkeiten).
9. Siehe Theorem (Kumulative Verteilungsfunktionen von kontinuierlichen Zufallsvariablen).
10. Siehe Theorem (Kumulative Verteilungsfunktionen von kontinuierlichen Zufallsvariablen).
11. Siehe Kumulative Verteilungsfunktionen, Beispiel (Normalverteilung).
12. Siehe Definition (Inverse kumulative Verteilungsfunktion).

Mengentheoretische Ergänzungen

Theorem (Urbilder von Vereinigungen und Durchschnitten)

Es sei $f : D \to Z$ eine Funktion und es seien $A_i \subseteq Z$ für alle i einer nichtleeren Indexmenge I. Dann gelten

1. *Urbilder von Vereinigungen.*
$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i). \tag{53}$$
2. *Urbilder von Durchschnitten.*
$$f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(A_i). \tag{54}$$

Beweis

1. Für jedes $x \in D$ gilt
$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i\in I} A_i \\ &\iff \text{Es gibt ein } i \in I \text{ mit } f(x) \in A_i \\ &\iff \text{Es gibt ein } i \in I \text{ mit } x \in f^{-1}(A_i) \\ &\iff x \in \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i). \end{aligned} \tag{55}$$

2. Für jedes $x \in D$ gilt
$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i\in I} A_i \\ &\iff f(x) \in A_i \text{ für alle } i \in I \\ &\iff x \in f^{-1}(A_i) \text{ für alle } i \in I \\ &\iff x \in \bigcap_{i\in I} f^{-1}(A_i). \end{aligned} \tag{56}$$

In beiden Fällen besitzen die Mengen dieselben Elemente und sind damit gleich.

Referenzen

Demidenko, Eugene. 2020. *Advanced Statistics with Applications in R*. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley.

Fristedt, Bert. 1998. *A Modern Approach to Probability Theory*. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2837-5.

Hesse, Christian. 2009. *Wahrscheinlichkeitstheorie*. 2nd ed. Vieweg + Teubner.