

Info.: Os programas das questões abaixo devem ser codificados na linguagem Javascript

Git HUB - [Click aqui](#) para acessar o código no GitHub

1. Faça um programa que leia um número inteiro e informe se ele é perfeito ou não. Um número perfeito é aquele que é igual à soma de seus divisores. Ex.: $6 = 1 + 2 + 3 = \text{número perfeito}$

Imagine que temos o seguinte problema: Dado um número inteiro N , queremos encontrar todos os divisores positivos de N . Uma possível solução seria, novamente, iterar por todos os números de 1 a N e checar quais deles dividem N , salvando-os em um vetor de respostas. Dessa forma, obtemos uma complexidade de $O(N)$.

Para otimizar este algoritmo, perceba que se p é um divisor de N maior que \sqrt{N} , então o número $q = \frac{N}{p}$ também é um divisor de N e $q < \sqrt{N}$. Isso sugere que é suficiente iterarmos apenas pelos números de 1 a \sqrt{N} , e, assim que encontrarmos um divisor q tal que $q \leq \sqrt{N}$, inserimos tanto q quanto $\frac{N}{q}$ em nosso vetor de respostas. Dessa forma, encontraremos tanto os divisores "pequenos" (menores ou iguais a \sqrt{N}) de N quanto os divisores "grandes" (maiores que \sqrt{N}).

Essa versão otimizada do algoritmo reduz a complexidade de $O(N)$ para $O(\sqrt{N})$, tornando-o muito mais eficiente para números grandes.

```
//src/unidade_III/lista02/questao01.js
```

```
function listaDivisores(numero) {
  let divisores = []
  for (let i = 1; i <= numero; i++) {
    if (numero % i === 0) {
      divisores.push(i)
    }
  }
  return divisores
}

function listaDivisores2(numero) {
  let divisores = []
  let raiz = Math.sqrt(numero)
  for (let i = 1; i <= raiz; i++) {
    if (numero % i === 0) {
      divisores.push(i)
      if (i !== raiz) {
        divisores.push(numero / i)
      }
    }
  }
  return divisores.sort((a, b) => a - b)
}

function numeroPerfeito(numero) {
  let soma = listaDivisores2(numero).filter((a) => a < numero).reduce((a, b) => a + b, 0)
  return soma === numero
}

for (let i = 1; i <= 1000000; i++) {
  if (numeroPerfeito(i)) {
    console.log(`${i} é um número perfeito`)
  }
}
```

2. Faça um programa que solicite um número inteiro de até 4 dígitos ao usuário e inverta a ordem de seus algarismos. Ex.: Entrada = 5382 - Saída = 2835

```
//src/unidade_III/lista02/questao02.js
```

```
function invert4(num) {
  if (num <= 9999) {
    let numInvertido = 0
    let numString = num.toString()
    for (let i = numString.length - 1; i >= 0; i--) {
      numInvertido += numString[i]
    }
    return numInvertido * 1
  } else return null
}

function testa(num) {
  let inverso = invert4(num)
  if (inverso !== null) {
    console.log(`O inverso de ${num} é ${inverso}`)
  }
}

for (let i = 1; i <= 10000; i = i + 235) {
  testa(i)
}
```

3. Escreva um programa para verificar se um número é palíndromo (Número que é igual ao seu reverso Ex.: 14541)

```
//src/unidade_III/lista02/questao03.js
```

```
function invert4(num) {
  if (num <= 9999) {
    let numInvertido = 0
    let numString = num.toString()
    for (let i = numString.length - 1; i >= 0; i--) {
      numInvertido += numString[i]
    }
    return numInvertido * 1
  } else return null
}

function testa(num) {
  let inverso = invert4(num)
  if (inverso !== null) {
    if (inverso === num) {
      console.log(`${num} é um número palíndromo`)
    }
  }
}

for (let i = 1; i <= 10000; i = i + 41) {
  testa(i)
}
```

4. Dona Lesma é esportista e aventureira e definiu como objetivo deste verão alcançar o topo do muro do jardim em que vive. A cada dia, valente e metodicamente ela sobe exatamente uma certa distância (sempre a mesma a cada dia). Mas a cada noite enquanto dorme Dona Lesma escorrega para baixo uma outra distância (sempre a mesma a cada noite) ... Dadas a altura do muro, a distância que ela sobe a cada dia e a distância que ela desce a cada noite, ajude Dona Lesma a calcular quantos dias ela levará para chegar ao topo do muro. altura = 10000 subida = 100 descida = 50

dias	inicio do dia	fim do dia
1º	0	100
2º	50	150
3º	100	200
...
n	$(n - 1) \times (\text{subida} - \text{descida})$	$(n - 1) \times (\text{subida} - \text{descida}) + \text{subida}$

$$\text{distancia} = (n - 1) \times (\text{subida} - \text{descida}) + \text{subida}$$

$$(n - 1) \times (\text{subida} - \text{descida}) = \text{distancia} - \text{subida}$$

$$n - 1 = \frac{\text{distancia} - \text{subida}}{\text{subida} - \text{descida}}$$

$$n = \frac{\text{distancia} - \text{subida}}{\text{subida} - \text{descida}} + 1$$

```
//src/unidade_III/lista02/questao04.js
```

```
function quantidadesDias(distancia, subida, descida) {
  dias = ((distancia - subida) / (subida - descida)) + 1
  return dias
}
```

```
distancia = 10000
subida = 100
descida = 50
```

```
dias = quantidadesDias(distancia, subida, descida)
```

```
console.log(`A quantidade de dias necessários para a dona lesma subir ${distancia} metros é ${dias}`)
```

5. Pedrinho está implementando o sistema de controle de pagamentos parcelados de uma grande empresa de cartão de crédito digital. Os clientes podem parcelar as compras sem juros no cartão, em até 18 vezes. Quando o valor V da compra é divisível pelo número P de parcelas que o cliente escolhe, todas as parcelas terão o mesmo valor. Por exemplo, se o cliente comprar um livro de $V=30$ reais em $P=6$ vezes, então as parcelas terão valores: 5, 5, 5, 5, 5 e 5. Mas se o valor da compra não for divisível pelo número de parcelas será preciso fazer um ajuste, pois a empresa quer que todas as parcelas tenham sempre um valor inteiro e somem no total, claro, o valor exato da compra. O que Pedrinho decidiu foi distribuir o resto da divisão de V por P igualmente entre as parcelas iniciais. Por exemplo, se a compra for de $V=45$ e o número de parcelas for $P=7$, então as parcelas terão valores: 7, 7, 7, 6, 6, 6 e 6. Quer dizer, como o resto da divisão de 45 por 7 é 3, então as 3 parcelas iniciais devem ter valor um real maior do que as 4 parcelas finais. Você precisa ajudar Pedrinho e escrever um programa que, dado o valor da compra e o número de parcelas, imprima os valores de cada parcela. O programa deve receber como entrada o valor de V , representando o valor da compra e o valor de P , indicando o número de parcelas. A saída deve ser as parcelas

```
//src/unidade_III/lista02/questao05.js
```

```
function divideParcelas(valor, numeroParcela) {
  if (valor < 0 || numeroParcela < 0)
    throw new Error('Valor e número de parcelas devem ser maiores que zero')

  if(numeroParcela > 18)
    throw new Error('Número de parcelas deve ser menor ou igual a 18')

  let parcelas = []

  let resto = valor % numeroParcela

  let valorParcela = (valor - resto) / numeroParcela

  for (let i = 0; i < numeroParcela; i++) {
    if(i < resto)
```

```
        parcelas.push(valorParcela + 1.00)
    else
        parcelas.push(valorParcela)
    }

    return parcelas
}

try{
    parcelas = divideParcelas(100, 19)
    console.log(parcelas)
}catch(e){
    console.log(e.message)
}
```