



# 心率過慢 | 安心觀察指南

病竇症候群 / 房室傳導阻滯，未裝節律器的自我照顧



掃描看電子版

心跳可能過慢、停頓，或忽快忽慢；有症狀最重要！



## 立即求救：打 119

坐下或平躺，旁人陪伴；不要自行開車就醫



昏倒、快昏倒

突然倒下或意識不清



胸痛、呼吸困難

冒冷汗、臉色發白也要警覺

## ⚠ 儘快聯絡心臟科 / 就醫評估



反覆頭暈、虛弱、疲倦

活動變喘、注意力變差、跌倒



心悸或脈搏異常

很慢、忽快忽慢，且伴隨不適

## 為什麼會發生？



① 竇房結：發動心跳  
出問題 → 病竇症候群

② 房室結：傳遞心跳  
出問題 → 房室傳導阻滯



老化退化  
最常見



心肌缺氧  
或心肌梗塞



藥物影響  
常見可逆



甲狀腺低下  
電解質異常



心臟手術  
或電燒之後



睡眠呼吸  
中止症

● 為可逆因素，找出並處理後心跳可能恢復  
其他：感染發炎、浸潤性心臟病等；確切原因需醫師檢查判斷

## 平常這樣做



記錄症狀、脈搏與時間  
回診帶紀錄；依醫囑量血壓



按時回診、完成監測  
如心電圖、24 小時心電圖



藥物主動核對  
勿自行停藥、加藥或吃偏方



避免跌倒與意外  
慢慢起身；頭暈時勿開車、登高

## 外出小準備

攜帶藥單與緊急聯絡人；告知家人警訊與求救方式  
水分依醫師指示補充（心衰竭 / 腎病者勿自行增加）