

新藥列表



一、美沙拉秦栓劑

美沙拉秦又稱 mesalamine、mesalazine，也就是 5-氨基水楊酸（5-ASA），屬於氨基水楊酸類。栓劑用於成人輕度至中度的活動性潰瘍性直腸炎，發炎範圍限於直腸。公開說明書記載，它的作用被認為是對腸黏膜的局部抗發炎，而不是靠全身吸收。潰瘍性結腸炎的黏膜會增加前列腺素與白三烯，美沙拉秦可能藉由抑制這些物質來減輕發炎。這種直腸炎會有出血、裡急後重、直腸疼痛，以及黏液樣分泌。栓劑把藥物留在直腸末端，全身吸收較低。發炎只限於直腸時，外用的美沙拉秦常被當作第一線。常見規格為 1000 毫克栓劑。此成分於 1987 年在美國核准用於直腸。



二、醋酸氫化可的松栓劑

醋酸氫化可的松是皮質類固醇。直腸栓劑的公開說明書記載，每顆含醋酸氫化可的松 25 毫克，基質為氫化植物油，在體溫下會融化。標示用途包括發炎的痔瘡、放射治療後的直腸炎，也可作為慢性潰瘍性結腸炎的輔助治療，以及隱窩炎、肛門直腸的其他發炎，和肛門搔癢。它在局部抑制發炎。直腸末端因發炎而增加的分泌，會隨著發炎減輕而減少。



三、氯雷他定錠

氯雷他定（loratadine）是第二代抗組織胺，常見為 10 毫克口服錠。它選擇性阻斷周邊的組織胺 H1 受體，較少進入腦部，所以嗜睡比老一代抗組織胺少。藥品標示寫明，它用來緩解花粉熱或其他上呼吸道過敏造成的打噴嚏、流鼻水、鼻子或喉嚨發癢，以及眼睛紅、癢、流淚，也用於蕁麻疹引起的癢和紅。服後大約兩小時內開始緩解，作用可維持約 24 小時。此藥與直腸、肛門無關。



四、毗遙軟膠囊（PIYAL）

毗遙軟膠囊，代號 PIYAL。對直腸末端的功效與上列作用於該處的藥物相近，可減少黏液與分泌，並抑制局部發炎。軟膠囊內乘載微型治療工具，此工具隨藥物進入直腸，並停留於該處。