

Проверка гипотез

План

- Что такое гипотезы
- p_value
- Ошибки 1 и 2 рода
- Какими бывают критерии
- Параметрические критерии для долей, средних и дисперсий

Обозначения

- Внимание: в этой презентации будут тонко использоваться греческие буквы с крышечкой и без крышечки. Это традиция в статистике
- Когда они **без** крышечки, речь идет о **параметрах** некоторого распределения (можно воспринимать их как неизвестные константы)

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

- Когда они **с** крышечкой, речь идет о некоторых **статистиках**, посчитанных по выборке из случайных величин, а значит тоже о случайных величинах с каким-то распределением. Этими статистиками мы будем оценивать **параметры**, которые обозначаются той же греческой буквой, но **без** крышечки.

$$\hat{\mu} = \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}\right) \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(n-1) \cdot \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

Что такое гипотезы и как их проверять

Что такое гипотеза

Гипотеза – любое утверждение, которое возникло в нашей голове и которое мы собираемся проверить по данным.

- В Австралии женщин дискриминируют на рынке труда
- В Питере кофе любят больше, чем в Москве
- Осьминог Пауль может предсказывать будущее
- Доходности по акциям Яндекса нормально распределены
- Подгузники и пиво часто покупают вместе

Что значит проверить гипотезу

- Собрать данные и посмотреть, не противоречит ли им наше утверждение
- Любая выборка – случайная, просто посчитать описательные статистики недостаточно
- Описательные статистики – случайные величины
- При любом объёме выборки можно допустить ошибку

Что значит проверить гипотезу

- Собрали данные о предсказаниях осьминога



memepedia.com

- Данные не противоречат тому, что он провидец
- Это не означает, что осьминог правда пророк. Если мы соберём ещё данных, они могут начать этому противоречить.

Что значит проверить гипотезу

- Собрали данные о предсказаниях осьминога

❗ Если данные не противоречат утверждению, это не является доказательством его верности

- Данные не противоречат тому, что он провидец
- Это не означает, что осьминог правда пророк. Если мы соберём ещё данных, они могут начать этому противоречить

Взболтать, но не смешивать



James Bond Casino Royale (2006)

*«Взболтать,
но не смешивать»*

© Бонд, Джеймс
Бонд

- Правда ли агент 007 отличает взболтанный мартини от смешанного?

Взболтать, но не смешивать



James Bond Casino Royale (2006)

*«Взболтать,
но не смешивать»*

© Бонд, Джеймс
Бонд

- Завязываем агенту 007 глаза и даём два мартини: смешанный и взболтанный n раз
- Случайная величина $X_i = 1$, если Бонд отличил взболтанный мартини от смешанного

Взболтать, но не смешивать



James Bond Casino Royale (2006)

*«Взболтать,
но не смешивать»*

© Бонд, Джеймс
Бонд

H_0 : агент 007 не различает два вида мартини

H_a : агент 007 различает два вида мартини

Нужно формализовать гипотезу **на языке статистики**

Формализация задачи

Выборка состоит из единиц и нулей:

- $X_i = 1$, если правильно назвал вид мартини
- $X_i = 0$, если не правильно назвал

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

Если Бонд не различает напитки и выбирает наугад, вероятность успеха p должна быть равна 0.5

$H_0: p = 0.5 \Leftrightarrow$ Бонд не различает напитки

$H_a: p \neq 0.5 \Leftrightarrow$ Бонд различает напитки

Поиск критерия

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

Представим, что мы дали Бонду мартини 10 раз и получили, что $\hat{p} = 0.6$

Выходит, что Бонд
отвечает за свои
слова

Поиск критерия

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

Представим, что мы дали Бонду мартини 10 раз и получили, что $\hat{p} = 0.6$

~~Выходит, что Бонд
отвечает за свои
слова~~

\hat{p} – случайная
величина, которая
зависит от выборки

Поиск критерия

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

Представим, что мы дали Бонду картины 10 раз и получили, что $\hat{p} = 0.6$

Задача: узнать при текущем объёме выборки насколько \hat{p} близка к 0.5

Поиск критерия

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

\hat{p} – случайная величина

$\hat{p} - 0.5$ – случайная величина

- ✔ Если расстояние от \hat{p} до 0.5 достаточно маленькое, данные не противоречат нулевой гипотезе

Поиск критерия

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

По ЦПТ:

$$\hat{p} \overset{asy}{\sim} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

\Leftrightarrow

$$\hat{p} \overset{asy}{\underset{H_0}{\sim}} N\left(0.5, \frac{0.5(1-0.5)}{n}\right)$$

при верности
нулевой
гипотезы

$$\frac{\hat{p} - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{n}}} \overset{asy}{\underset{H_0}{\sim}} N(0, 1)$$

Поиск критерия

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$


$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

$$z = \frac{\hat{p} - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1 - 0.5)}{n}}} \underset{H_0}{\overset{asy}{\sim}} N(0, 1)$$

- Мы выяснили, как распределено расстояние до 0.5 при верности нулевой гипотезы
- Осталось выбрать порог, при котором мы будем считать, что нулевая гипотеза H_0 не отвергается
- Против нашей гипотезы говорят очень большие либо очень маленькие значения статистики


Проверка гипотезы

Если наблюдаемое значение статистики попало в хвост (левый или правый), гипотеза отвергается, расстояние между \hat{p} и 0.5 оказывается слишком большим



Проверка гипотезы


Мы рассуждаем о распределении в терминах нулевой гипотезы. Близкие к центру значения z -статистики показывают, что H_0 не противоречат данным



- ! Мы не решаем, верна ли гипотеза, а проверяем, противоречат ли ей данные

Проверка гипотезы

Если наблюдаемое значение попало между критическими, данные не противоречат гипотезе



Уровень значимости

- Если мы отвергаем нулевую гипотезу, когда она верна – мы ошибаемся
- Выбирая порог для отсечения, мы фиксируем вероятность такой ошибки
- Вероятность такой ошибки α – **уровень значимости**, также эту ошибку называют **ошибкой первого рода**
- Если мы **100** раз попытаемся сесть на поезд на уровне значимости **0.05**, в среднем мы будем опаздывать **5** раз
- Обычно α выбирают равным **0.05, 0.01** или **0.001**

Процедура проверки гипотез

Процедура проверки гипотез

1. Определяем природу выборки: вид распределения и его параметры
2. Формулируем нулевую и альтернативную гипотезы о параметрах распределения

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_a: p \neq 0.5$$

3. Выбираем статистику, на основе которой мы будем тестировать гипотезу, и конструируем статистический тест для проверки гипотезы

$$\text{ЦПТ: } z \stackrel{asy}{\underset{H_0}{\sim}} N(0, 1)$$


4. Находим **наблюдаемое** и **критическое** значение статистики на некотором фиксированном уровне α

$$z_{obs} = \frac{0.6 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{10}}} = 0.654$$

$$z_{crit}(\alpha) = 1.96$$


Процедура проверки гипотез

5. Сравниваем наблюдаемое значение с критическим и делаем выводы




Процедура проверки гипотез

- Наблюдаемое значение попало в область между критическими \Rightarrow гипотеза не отвергается
- Голубая площадь под хвостами – уровень значимости



Процедура проверки гипотез

- ❗ Гипотеза, что Джеймс Бонд не различает напитки, не отвергается на уровне значимости 5%





Нельзя принять нулевую гипотезу

- Если при проверке нулевая гипотеза не отвергается, нельзя считать её доказанной
- Говорят, что данные не противоречат нулевой гипотезе
- Новые данные могут показать, что гипотеза неверна

Альтернативы


- Иногда рассматривают односторонние альтернативы
- Обычно это делается в ситуациях, когда мы уверены в направлении ожидаемых различий
- При таких альтернативах ошибку первого рода полностью переносят на один из двух хвостов



P-значение


P-значение

- Наблюдаемое значение попало в область между критическими \Rightarrow гипотеза не отвергается
- Голубая площадь под хвостами – уровень значимости



Р-значение

- Красная площадь под хвостами – **р-значение** (достигаемый уровень значимости)




P-значение упрощает проверку гипотез

Если **красная площадь** оказалась больше **синей**

$$p_value > \alpha,$$

⇒ наблюдаемое значение попало в область между критическими, гипотеза не отвергается.




$p_value > \alpha \Rightarrow$
не отвергается

P-значение упрощает проверку гипотез

Если **красная площадь** оказалась меньше **синей**

$$p_value < \alpha,$$

⇒ наблюдаемое значение попало в критическую область,
гипотеза отвергается.



$p_value < \alpha \Rightarrow$
отвергается

P-значение


Вопрос: какой уровень значимости надо выбрать, чтобы гипотеза впервые отверглась?

Р-значение

Вопрос: какой уровень значимости надо выбрать, чтобы гипотеза впервые отверглась?

Ответ: равный Р-значению


Из-за этого Р-значение также называют **достижимым уровнем значимости**



Р-значение

Достижимый уровень значимости (**Р-значение**) – это вероятность при справедливости нулевой гипотезы получить такое же наблюдаемое значение статистики, как в эксперименте либо ещё более экстремальное

$$p_value = \mathbb{P}(|z| > z_{\text{набл.}} \mid H_0)$$



Р-значение

Достигаемый уровень значимости (**Р-значение**) – это вероятность при справедливости нулевой гипотезы получить такое же наблюдаемое значение статистики, как в эксперименте либо ещё более экстремальное

$$p_value = \mathbb{P}(|z| > z_{\text{набл.}} \mid H_0)$$


- ❗ В нашей ситуации $p_value = 0.518$, то есть вероятность получить наше или ещё более экстремальное значение статистики, при верности H_0 высока, что говорит в пользу гипотезы

Резюме

- С помощью **P-значения** удобно проверять гипотезы
- Оно помогает не акцентировать внимание на том, как именно вычисляется критическое значение, и упрощает понимание статистических протоколов

Типичный протокол из статистического пакета:

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Intercept	-2.5988	1.918	-1.355	0.175	-6.358	1.161
y	0.4170	0.297	1.404	0.160	-0.165	0.999


p_value

Ошибки 1 и 2 рода

Ошибки, что мы совершаем

	H_0 верна	H_0 неверна	
H_0 не отвергается	<i>ok</i>	β	ошибка 2 рода
H_0 отвергается	α	<i>ok</i>	

ошибка 1
рода

$$\alpha = \mathbb{P}(H_0 \text{ отвергнута} \mid H_0 \text{ верна})$$

$$\beta = \mathbb{P}(H_0 \text{ не отвергнута} \mid H_0 \text{ не верна})$$


Величину $1 - \beta$ называют **мощностью** критерия

Ошибки, что мы совершаем

$$H_0: p = p_0$$

$$H_a: p = p_a$$

Ошибки первого и второго рода неравнозначны:
мы перед экспериментом фиксируем α ,
а β минимизируется по остаточному принципу




Ошибки, что мы совершаем

$$H_0: p = p_0$$

$$H_a: p = p_a$$

❗ При уменьшении ошибки первого рода всегда возрастает ошибка второго рода



Ошибки, что мы совершаем

H_0 : нет беременности

H_a : есть беременность

H_0 верна

H_0 неверна

H_0 не
отвергается



Вы не беременны



Вы не беременны

H_0
отвергается



Вы беременны



Вы беременны

Аналогия с классификацией

	$y = 1$	$y = 0$
$\hat{y} = 1$	TP	FP
$\hat{y} = 0$	FN	TN

ошибка 2
рода

ошибка 1
рода

Пример: хотим, чтобы классификатор удалял спам и задел минимум хороших документов

Подбор порога: зафиксировать $FPR = \frac{FP}{FP+TN} \leq 0.05$

(доля зря удалённых), а дальше максимизировать полноту

$$Recall = TPR = \frac{TP}{TP+FN} = 1 - \frac{FN}{TP+FN}$$

Наиболее мощный критерий


- **Статистический критерий** – способ посчитать расстояние между наблюдаемым значением и предполагаемым
- Подобные расстояния можно считать разными способами
- Хочется выбрать такой способ, который при фиксированном размере выборки и фиксированной ошибке первого рода будет давать наименьшую ошибку второго рода
- Такой критерий называется **наиболее мощным**

Резюме

- Ошибки первого и второго рода неравнозначны
- Имеется презумпция нулевой гипотезы
- Обычно нулевую гипотезу формулируют так, что нет значимого эффекта

Параметрические критерии

Какими бывают критерии



Есть и другие группы критериев. Любое математически формализованное правило, по которому проверяется гипотеза, можно назвать критерием.

Схема математической статистики

Выборка: x_1, \dots, x_n Параметр: θ



Как оценить

- Метод моментов
- Метод максимального правдоподобия

Хорошие свойства

- Несмещенная
- Состоятельная
- Эффективная

Союзники

Асимптотические
(при большом n)

- ЦПТ
- Дельта-метод

Точные

- Теорема Фишера
- $\chi^2_n, t_n, F_{n,k}$
- Ещё союзники!



Точность
оценки,
прогнозов



доверительные
интервалы

Ответы на
вопросы

проверка
гипотез

Схема математической статистики

Выборка: x_1, \dots, x_n Параметр: θ

$\hat{\theta}$

$f_{\hat{\theta}}(t)$

Точность
оценки,
прогнозов

Асимптотические
критерии

Союзники

Асимптотические
(при большом n)

- ЦПТ
- Дельта-метод

Точные

- Теорема Фишера
- $\chi^2_n, t_n, F_{n,k}$
- Ещё союзники!

доверительные
интервалы

Ответы на
вопросы
проверка
гипотез

Точные
критерии



Гипотезы о долях

Z-критерий для доли

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$$

$$H_0: p = p_0$$

$$H_a: p \neq p_0$$



ЦПТ:

$$\hat{p} \stackrel{asy}{\sim}_{H_0} N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$$

Критерий для проверки:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \stackrel{asy}{\sim}_{H_0} N(0, 1)$$



Критерий
асимптотический,
т.к. использует ЦПТ

Пример (дискриминация):

- В 70-х за участие в антивоенной демонстрации арестован педиатр, автор книг о воспитании детей, Бенджамин Спок
- Суд присяжных назначается сложной многоступенчатой процедурой отбора
- Отобрано 300 человек, из них 90 женщин
- Адвокаты протестуют на предвзятость выбора
- Проверяем гипотезу о предвзятости на уровне значимости 5%

Пример (дискриминация):

H_0 : отбор беспристрастный

H_a : женщин дискриминируют



$H_0: p = 0.5$

$H_a: p < 0.5$



Левосторонняя альтернатива, так
как нас интересует именно
дискриминация женщин

Пример (дискриминация):

H_0 : отбор беспристрастный

$H_0: p = 0.5$



H_a : женщин дискриминируют

$H_a: p < 0.5$


$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p)$

$X_i = 1$, если присяжный – женщина

$$\hat{p} = \frac{90}{300}$$

$$Z_{obs} = \frac{0.3 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1 - 0.5)}{300}}}$$

$$Z_{0.05} = -1.64$$



Гипотеза о беспристрастном отборе **отвергается**

Z-критерий для разности независимых долей

$$X_1, \dots, X_{n_x} \sim iid Bern(p_x)$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_y} \sim iid Bern(p_y)$$

Выборки независимые

$$H_0: p_x = p_y = P \quad H_a: p_x \neq p_y$$

! Критерий
асимптотический,
т.к. использует ЦПТ

Критерий для проверки:



$$Z = \frac{\hat{p}_x - \hat{p}_y}{\sqrt{P(1-P) \cdot \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}\right)}}$$

$\overset{asy}{\sim}_{H_0}$

$N(0, 1)$

$$P = \frac{m_x + m_y}{n_x + n_y}$$

m_i – число 1 в выборке



Пример (кофе):

H_0 : кофе любят одинаково

H_a : в Москве любят сильнее

$X_1, \dots, X_{100} \sim iid Bern(p_M)$

$Y_1, \dots, Y_{100} \sim iid Bern(p_\Pi)$

$\hat{p}_M = 0.6, \quad \hat{p}_\Pi = 0.5$

$$P = \frac{50 + 60}{200} = 0.55$$


$$z_{obs} = \frac{0.5 - 0.6}{\sqrt{0.55 \cdot 0.45 \cdot \frac{2}{100}}}$$

$$z_{0.05} = -1.64$$



$H_0: p_\Pi = p_M$

$H_a: p_\Pi < p_M$



Гипотеза об одинаковой любви **не отвергается**

Z-критерий для разности зависимых долей

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p_x)$$

$$Y_1, \dots, Y_n \sim iid Bern(p_y)$$

Выборки зависимые

$$H_0: p_x = p_y$$

$$H_a: p_x \neq p_y$$

Критерий для проверки:

$$z = \frac{c - b}{\sqrt{c + b - \frac{(c - b)^2}{n}}} \stackrel{asy}{\underset{H_0}{\sim}} N(0, 1)$$

		X	
		0	1
Y	0	a	<i>b</i>
	1	<i>c</i>	d

Люди одни и те же, нас
интересуют те, кто
поменял мнение

! Критерий асимптотический

Пример (кофе):

- В 2020 году в Москве сотню человек спросили, любят ли они кофе
- Через год у этих же ста человек снова спросили, любят ли они кофе по-прежнему
- Правда ли, что число любителей кофе изменилось?

		2020	
		0	1
2021	0	20	10
	1	20	50

Пример (кофе):

$$X_1, \dots, X_n \sim iid Bern(p_x)$$

$$Y_1, \dots, Y_n \sim iid Bern(p_y)$$

Выборки зависимые


$$H_0: p_x = p_y$$

$$H_a: p_x \neq p_y$$

$$Z_{obs} = \frac{20 - 10}{\sqrt{20 + 10 - \frac{(20 - 10)^2}{100}}}$$

$$Z_{0.975} = 1.96$$

		2020	
		0	1
2021	0	20	10
	1	20	50



Гипотеза о том, что люди не
поменяли вкусовых
предпочтений **не отвергается**

Резюме

- Для проверки гипотезы о долях используется z-тест, основанный на ЦПТ
 - В случае независимых и зависимых выборок статистика считается немного по-разному, для зависимых мы акцентируем внимание только на изменениях
 - Обе имеют асимптотически нормальное распределение
- ❗ С помощью ровно этих же статистик мы до этого строили для долей асимптотические доверительные интервалы

Гипотезы о средних

Z-критерий для среднего

$$X_1, \dots, X_n \sim iid(\mu, \sigma^2)$$

$$H_0: \mu = \mu_0$$


$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

ЦПТ:

$$\bar{X} \underset{H_0}{\overset{asy}{\sim}} N\left(\mu_0, \frac{\hat{\sigma}^2}{\sqrt{n}}\right)$$

Критерий для проверки:

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \underset{H_0}{\overset{asy}{\sim}} N(0, 1)$$



! Критерий асимптотический, т.к. использует ЦПТ, применим для любых средних

t-критерий для среднего

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

$$H_0: \mu = \mu_0$$


$$H_a: \mu \neq \mu_0 \quad \sigma^2 - \text{известна}$$

ЦПТ:

$$\bar{X} \overset{\text{а.у.}}{\underset{H_0}{\sim}} N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}\right)$$

Критерий для проверки:

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \overset{\text{а.у.}}{\underset{H_0}{\sim}} N(0, 1)$$



❗ Критерий точный,
используется
предположение
о нормальности выборки
и известности σ^2

t-критерий для среднего

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

$$H_0: \mu = \mu_0$$



$$H_a: \mu \neq \mu_0 \quad \sigma^2 - \text{НЕизвестна}$$

ЦПТ:

$$\bar{X} \underset{H_0}{\sim} N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}\right)$$

Критерий для проверки:

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} \underset{H_0}{\sim} t(n-1)$$



! Критерий точный,
используется
предположение
о нормальности выборки

Пример (курсы подготовки):

- Каждый год люди сдают ЕГЭ по математике. В обычной ситуации средний результат составляет 65 баллов.
- Игорь открыл свои курсы подготовки к ЕГЭ, его группа из 100 человек получила в среднем 70 баллов, стандартное отклонение составило 20 баллов.
- Правда ли, что курсы Игоря помогают получить более высокий балл?
- Проверяем гипотезу на уровне значимости 5%

Пример (курсы подготовки):

H_0 : курсы Игоря неэффективны

$$H_0: \mu = 60$$



H_a : курсы помогают


$$H_a: \mu > 60$$

Предположение:

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

$$t_{obs} = \frac{70 - 60}{\frac{20}{\sqrt{100}}}$$

$$t_{0.95} = 1.66$$



Гипотеза о неэффективности курсов Игоря **отвергается**,
они помогают получить более
высокий балл

Z-критерий для разности средних

$$X_1, \dots, X_{n_x} \sim iid(\mu_x, \sigma_x^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_y} \sim iid(\mu_y, \sigma_y^2)$$

Выборки независимые

$$H_0: \mu_x = \mu_y$$

$$H_a: \mu_x \neq \mu_y$$


ЦПТ:

$$\bar{X} - \bar{Y} \underset{H_0}{\overset{asy}{\sim}} N\left(0, \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}\right)$$

Критерий для проверки:

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \underset{H_0}{\overset{asy}{\sim}} N(0, 1)$$

❗ Критерий асимптотический, т.к. использует ЦПТ



Точные критерии для разности средних

$$X_1, \dots, X_{n_x} \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

$$H_0: \mu_x = \mu_y$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_y} \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

$$H_a: \mu_x \neq \mu_y$$

Выборки независимые

Критерий для проверки:

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}}$$

дисперсии
известны

дисперсии
неизвестны,
но равны

дисперсии
неизвестны,
различаются

Точные критерии для разности средних

Критерий для проверки:

дисперсии
известны

$$z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \underset{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Нормальное
распределение

дисперсии
неизвестны,
но равны

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_o^2}{n_x} + \frac{\hat{\sigma}_o^2}{n_y}}} \underset{H_0}{\sim} t(n + m - 2)$$

Распределение
Стьюдента

дисперсии
неизвестны


$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n_x} + \frac{\hat{\sigma}_y^2}{n_y}}} \underset{H_0}{\sim} t(\nu)$$

Распределение
Уэлча

Пример (стоимость недвижимости):

- До коронакризиса один квадратный метр в Москве стоил 105 тыс. рублей при стандартном отклонении в 40 тыс.
- После коронакризиса один квадратный метр стоит 90 тыс. рублей при стандартном отклонении в 50 тыс.
- Упала ли стоимость, если $n_x = 20$, $n_y = 30$?

Пример (стоимость недвижимости):



Пример (стоимость недвижимости):

H_0 : стоимость не поменялась

$$H_0: \mu_{2021} = \mu_{2020}$$



H_a : стоимость упала

$$H_a: \mu_{2021} < \mu_{2020}$$


Предположение:

Выборки независимы,
нормальны

$$t_{obs} = \frac{90 - 105}{\sqrt{\frac{40}{20} + \frac{50}{30}}}$$

$$\nu = 43.89$$

$$t_{0.95} = -1.67$$



Гипотеза о неизменности
цен **отвергается**

Разность средних (зависимые выборки)

Выборки зависят друг от друга:

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y_1, \dots, Y_n \sim iid N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

- Измерения делаются на одних и тех же объектах
- Можем посмотреть прирост на отдельных объектах

$$d_i = X_i - Y_i$$

- Используем распределение Стьюдента, дисперсию считаем по формуле:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2$$

Пример (польза лекарства):

- На 5 испытуемых сравнивают два лекарства против респираторных заболеваний
- Каждый вдыхает лекарство из ингалятора, а после принимает участие в упражнении на беговой дорожке
- Измеряется время достижения максимальной нагрузки
- Затем то же самое проделывается со вторым лекарством, правда ли что лекарства не отличаются?

Пример (польза лекарства):

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$$

Предположение:


Выборки независимы,
нормальны

$$\bar{d} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 d_i = -6$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^5 (d_i - \bar{d})^2 = 92.5$$

$$t_{obs} = \frac{-6 - 0}{92.5/\sqrt{5}} \quad t_{0.95} = 2.78$$

Лекарство 1	50	40	45	45	35
Лекарство 2	60	30	30	35	30
d_i	10	-10	-15	-10	-5



Гипотеза, что время
достижения максимальной
нагрузки не отличается
не отвергается

Резюме

- Благодаря удобству ЦПТ, критерии основанные на ней широко распространены
- Для маленьких выборок бывает лучше использовать точные критерии
- Если эти критерии основаны на нормальном распределении, надо проверить выборку на нормальность
- Если предполагается равенство дисперсий, это тоже не мешает проверить



С помощью ровно этих же статистик мы до этого строили для средних доверительные интервалы.

Гипотезы о дисперсиях

χ^2 – критерий для дисперсии

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

Критерий для проверки:

μ — ИЗВЕСТНО

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_a: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\frac{n \cdot \hat{s}^2}{\sigma_0^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi_n^2$$

- Высокая дисперсия связана с риском и нестабильностью
- Мы хотим знать, принимает ли дисперсия своё значение ниже σ_0^2
- Из-за этого в качестве альтернативы обычно используют правостороннюю

χ^2 – критерий для дисперсии

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$



μ – известно

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_a: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

Критерий для проверки:

$$\frac{n \cdot \hat{s}^2}{\sigma_0^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi_n^2$$



❗ Критерий точный, используется предположение о нормальности выборки и известности μ

χ^2 – критерий для дисперсии

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$



Критерий для проверки:

μ – НЕизвестно

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_a: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1) \cdot \hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi_{n-1}^2$$



! Критерий точный, используется предположение о нормальности выборки

Пример (ценная бумага):

- Мистер Белфорд считает, что вкладываться в активы с дисперсией доходности выше 0.04 очень рискованно.
- За последний год дисперсия Chesapeake Energy составила 0.09. Следует ли вкладываться в эту бумагу? Решение принимается на уровне значимости 5%.

Пример (ценная бумага):

H_0 : стоит вкладываться

$$H_0: \sigma^2 \leq 0.04$$

H_a : лучше не надо




$$H_a: \sigma^2 > 0.04$$

Предположение:

$$X_1, \dots, X_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

$$\chi_{obs}^2 = \frac{(10 - 1) \cdot 0.09}{0.04}$$

$$\chi_9^2(0.95) = 16.92$$



Гипотеза о том, что риск бумаги устроит мистера Белфорда **отвергается**

Тест Фишера для отношения дисперсий

$$X_1, \dots, X_{n_x} \sim iid N(\mu_x, \sigma_y^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_y} \sim iid N(\mu_y, \sigma_y^2)$$



Выборки независимые

$$H_0: \sigma_x = \sigma_y$$

$$H_a: \sigma_x \neq \sigma_y$$

Критерий для проверки:

$$\frac{\hat{\sigma}_x^2 / \sigma_x^2}{\hat{\sigma}_y^2 / \sigma_y^2} \underset{H_0}{=} \frac{\hat{\sigma}_x^2}{\hat{\sigma}_y^2} \underset{H_0}{\sim} F_{n_x-1, n_y-1}$$



! Критерий точный, используется
предположение о нормальности выборки

Пример (ценная бумага):

- Мистер Белфорд наблюдает за двумя бумагами. За последние десять лет выборочная дисперсия доходности для первой бумаги составила 0.05. Для второй бумаги 0.08.
- Есть ли основания полагать, что на уровне значимости 5% вложение во вторую бумагу более рискованно.

Пример (ценная бумага):

H_0 : риск одинаковый

$$H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$$



H_a : вторая бумага рискованнее

$$H_a: \sigma_x^2 < \sigma_y^2$$

Предположение:


$$X_1, \dots, X_{n_x} \sim iid N(\mu_x, \sigma_y^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_y} \sim iid N(\mu_y, \sigma_y^2)$$

Выборки независимые

$$F_{obs} = \frac{0.08}{0.05}$$

$$F_{9,9}(0.95) = 3.18$$



Гипотеза о том, что бумаги
обладают одинаковой
рискованностью
не отвергается

Резюме

- Для нормальных выборок для проверки гипотез о дисперсиях можно использовать критерий Хи-квадрат
- Для случая двух нормальных выборок подойдёт тест Фишера
- Есть и другие способы проверять гипотезы о дисперсиях



С помощью ровно этих же статистик мы до этого строили для дисперсий доверительные интервалы