

# Коллоквиум №1 (20.11.2019)

GROUPS №19137, №19144

2019

1. Множество: способы задания, операции над множествами

Не существует явного определения множества.

Пусть  $A$  некоторое мн-во, тогда существует 2 способа задания мн-ва

(a)  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  - явное задание эл-тов мн-ва

(b) Пусть  $\Phi(x)$  - некоторое условие, тогда

$A = \{x \mid \Phi(x)\}$  - Задание множества с помощью некоторого условия  $\Phi(x)$

Пусть  $A, B$  - некоторые множества

**Обозначение** (Подмножество).  $A$  - подмножество  $B$ , если  $A \subseteq B = \{x \mid x \in A \Rightarrow x \in B\}$

**Обозначение** (Собственное подмножество).  $A$  - собственное подмножество  $B$ , если  $A \subset B$ , если  $A \subseteq B$  и  $A \neq B$

**Обозначение** (Пустое множество).  $\emptyset$  - множество, не содержащее элементов ("Пустое множество")

**Обозначение** (Множество всех подмножеств множества  $A$ ).  $P(A) = \{C \mid C \subseteq A\}$

**Обозначение** (Универсум). Универсум (условное множество всех множеств)  $U$

Операции над множествами:

- Объединение множеств:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- Пересечение множеств:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

- Разность множеств:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

- Дополнение множества:

$$\neg A = \{x \mid x \in U \wedge x \notin A\}$$

- Симметрическая разность множеств:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Пусть  $S$  - семейство множеств:

- Объединение семейства множеств  
 $\bigcup S = \{ x \mid \exists A_i \in S : x \in A_i \}$
- Пересечение семейства множеств  
 $\bigcap S = \{ x \mid \forall A_i \in S : x \in A_i \}$

2. Упорядоченный набор (кортеж), предложение о равенстве  $n$ -ок, декартово произведение, декартова степень.

**Определение** (Упорядоченный набор (кортеж)). Упорядоченный набор (кортеж) длины  $n$  определяется по индукции

$$\langle \rangle = \emptyset$$

$$\langle a \rangle = a$$

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

...

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \rangle = \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle$$

**Определение** (пара). Набор  $\langle a, b \rangle$  длины 2 называют *парой*

**Теорема** (Предложение о равенстве  $n$ -ок). Если  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle b_1, \dots, b_n \rangle$ , то  $a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$

*Доказательство.* ...

□

**Определение** (Декартово произведение). Пусть даны множества  $A_1, \dots, A_n$ , тогда их декартовым произведением называют

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle a_1, \dots, a_n \rangle \mid \forall i \in \{1, \dots, n\} a_i \in A_i \}$$

**Определение** (Декартова степень). В случае, если  $A_1 = A_2 = \dots = A_n$ , тогда  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  называют декартовой степенью и обозначают, как  $A^n = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$

3. Бинарные отношения, обратное отношение, произведение отношений, лемма о бинарных отношениях.

**Определение.** Бинарным отношением между элементами множеств  $A$  и  $B$  называется произвольное подмножество

$$C \subseteq A \times B$$

**Определение.** Обратным бинарным отношением называется

$$R^{-1} = \{ \langle y; x \rangle \mid \langle x; y \rangle \in R \}$$

**Определение.** Произведением бинарных отношений называется

$$R_1 \times R_2 = \{ \langle x; z \rangle \mid \exists y \langle x; y \rangle \in R_1 \wedge \langle y; z \rangle \in R_2 \}$$

**Лемма** (Лемма о бинарных отношениях). Для любых бинарных отношений  $R_1, R_2, R_3$ :

$$(a) R_1 \cdot (R_2 \cdot R_3) = (R_1 \cdot R_2) \cdot R_3$$

$$(b) (R_1 \cdot R_2)^{-1} = R_2^{-1} \cdot R_1^{-1}$$

*Доказательство.* (а) Покажем, что  $R_1 \cdot (R_2 \cdot R_3) \subseteq (R_1 \cdot R_2) \cdot R_3$ .

Пусть  $\langle x; t \rangle \in R_1 \cdot (R_2 \cdot R_3)$ , тогда существует  $y$  такое, что  $\langle x; y \rangle \in R_1$  и  $\langle y; t \rangle \in R_2 \cdot R_3$ . Далее существует  $z$  такое, что  $\langle y; z \rangle \in R_2$  и  $\langle z; t \rangle \in R_3$ . Получаем, что  $\langle x; z \rangle \in R_1 \cdot R_2$  и  $\langle x; t \rangle \in (R_1 \cdot R_2) \cdot R_3$ . Обратное включение доказывается аналогично.

(b) Покажем, что  $(R_1 \cdot R_2)^{-1} \subseteq R_2^{-1} \cdot R_1^{-1}$ .

Пусть  $\langle z; x \rangle \in (R_1 \cdot R_2)^{-1}$ , тогда существует  $y$  такое, что  $\langle x; y \rangle \in R_1$  и  $\langle y; z \rangle \in R_2$ . Тогда  $\langle y; x \rangle \in R_1^{-1}$  и  $\langle z; y \rangle \in R_2^{-1}$ . Получаем, что  $\langle z; x \rangle \in R_2^{-1} \cdot R_1^{-1}$ . Обратное включение доказывается аналогично.

□