
ESTATÍSTICA

Uma introdução à teoria e à prática

J. P. S. DE SOUSA

Visão Geral da Estatística e Análise de Dados

O que é Estatística

A estatística é a ciência matemática – e parte da metodologia científica – que busca extrair, reduzir, analisar e modelar um conjunto de dados. Seu principal objetivo é encontrar padrões em dados e possibilitar a tomada de conclusões e decisões bem informadas sob incerteza. A Teoria das Probabilidades, que estuda os eventos e as variáveis aleatórias, é a principal base matemática dos conhecimentos estatísticos, conferindo-lhes rigor e confiabilidade.

Para encontrar tais padrões num conjunto de dados, a estatística faz o uso de modelos estatísticos. Esses modelos tentam descrever o dado em duas partes: a parte suave, onde se encontram os padrões, e a parte ruidosa, que corresponde ao fator aleatório inerente a fonte de extração do conjunto. A formulação dos modelos estatísticos ainda pode ser realizada visando-se dois fins, sendo o primeiro o de prever o comportamento de dados não observados, enquanto que o segundo consiste na inferência, isto é, tomar conclusões sobre os parâmetros encontrados.

A inferência estatística possui um lugar de centralidade no ramo estatístico, pois é sua abordagem que permite generalizar as conclusões sobre os parâmetros dos modelos ajustados sobre uma amostra para uma população, ao mesmo tempo que quantifica a incerteza dessas conclusões. Há duas grandes escolas de inferência estatística, que se diferenciam quanto a interpretação do que é uma probabilidade e, consequentemente, como tratar a incerteza. A primeira é a clássica ou frequentista, que entende probabilidades como frequências relativas obtidas na observação a longo prazo, enquanto os parâmetros são considerados fixos e desconhecidos, com a incerteza vindo da distribuição dos valores dados pelos estimadores. A segunda é a bayesiana, que interpreta probabilidade como o grau de crença num evento ocorrer e vê os parâmetros como variáveis aleatórias, possuindo essa distribuição própria atualizada pelas observações via o famoso Teorema de Bayes.

Uma Breve História da Estatística

A palavra estatística deriva dos termos neolatim *statisticum collegium* e italiano *statista*, que significam Colégio de Estado e Estadista respectivamente. A palavra alemã *Statistik* foi usada modernamente por Gottfried Achenwall em meados do século XVIII para designar a coleta de dados políticos, econômicos e sociais de um país, cujo equivalente em inglês era *political arithmetic*. Posteriormente, através de Sir John Sinclair e seus trabalhos no *Statistical Accounts of Scotland*, a palavra ganhou uma conotação mais ampla sobre coleta e classificação de dados.

Como vistos pelas suas raízes etimológicas, a estatística surgiu enquanto a disciplina que se preocupava com a coleta, tratamento, classificação e análise de dados sobre características político-sócio-econômicas de um país a fim de apoiar a formulação de políticas pelos seus governos. Dado isso, a prática estatística apareceu, provavelmente, há milhares de anos atrás, quando foram realizados os primeiros censos e contagens de recursos pelos povos. No entanto, enquanto disciplina científica, a estatística desenvolve-

se a partir do século XIX, apoiada pelas ferramentas matemáticas estudadas em séculos anteriores, especialmente por aquelas da Teoria das Probabilidades.

O estudo moderno e documentado de probabilidades inicia-se no século XVI com Girolamo Cardano, um polímata italiano que, motivado pelo seu hábito de apostar, escreveu o livro “*Liber de ludo aleae*” (O livro dos jogos de azar) entre 1550 e 1564. Nesse trabalho, ele documenta a técnica de computar probabilidades como razões de resultados favoráveis sobre o número total de resultados possíveis, desde que todas as conclusões possíveis sejam equiprováveis. Entretanto, o livro não foi devidamente publicado até 1663, quando cálculos sobre jogos de azar simples já estavam amplamente disseminados pela Europa.

O estudo de jogos de azar e, conseqüentemente, de probabilidades foi também realizado ao longo das correspondências entre os franceses Pierre de Fermat e Blaise Pascal em meados do século XVII, principalmente em apoio aos jogos do nobre Chevalier de Méré. Suas contribuições consistiram no uso de técnicas combinatórias para resolver diversos tipos de jogos, essas que se tornaram amplamente difundidas e compuseram as bases da moderna Teoria de Probabilidades.

A influência dos estudiosos franceses estendeu-se ao holandês Christiaan Huygens, que sistematizou os conhecimentos desenvolvidos naquele considerado o primeiro tratado sistemático sobre Probabilidades: “*Van Rekenningh in Spelen van Geluck*” (Sobre o Cálculo em Jogos de Azar), introduzindo conceitos como a esperança matemática e registrando a resolução do “Problema dos Pontos”. Os trabalhos de Huygens também encontraram aplicações no cálculo de taxas de anuidades financeiras na Holanda, sobre as quais também publicou um tratado em 1671. O uso vasto e sofisticado de probabilidades para cálculos de riscos, taxas de empréstimos e de seguros se deu mais futuramente em meados do século XVIII.

Em 1713, é publicada postumamente a célebre obra *Ars conjectandi*, de Jakob Bernoulli, reunindo e aprofundando ideias dos autores anteriormente citados e dando a primeira formulação da Lei dos Grandes Números. No ano de 1718, Abraham de Moivre publica *The Doctrine of Chances*, outro marco para a Teoria de Probabilidades, trazando uma definição formal de independência estatística e apresentando a primeira formulação do Teorema Central do Limite, a qual consistia no caso limite da distribuição binomial. Já em 1763, é enviado, postumamente, um ensaio de Thomas Bayes à *Royal Society* britânica que discutia o hoje conhecido Teorema de Bayes. Na França, a probabilidade ainda encontrou aplicações nas chamadas ciências morais, no sistema judiciário e em eleições de cargos. Pierre de Laplace e o Marquês de Condorcet, usaram as probabilidades para calcular as chances de um veredito de um júri ou um grupo de eleitores tomarem a decisão “correta”.

Com o intenso desenvolvimento dos estudos de probabilidades, a estatística moderna começou a ganhar forma ao longo dos séculos XVII e XVIII através do nome de **aritmética política**. Dado o contexto do Iluminismo e o interesse em generalizar o comportamento social por meio de leis universais, assim como a física fizera com a natureza, houve um crescimento nos estudos sobre população, doenças e riquezas. Exemplos desses estudos incluem os de John Graunt e William Petty, que publicaram, respectivamente, registros sobre a população londrina e a renda irlandesa. O

pastor prussiano Johann Peter Süssmilch também publicou dados sobre proporções de nascimentos e mortes, atrelados a ideia da manifestação da Divina Providência na regularidade demográfica mostrada pelos dados. Todavia, a aritmética política ainda carecia de métodos de coleta mais gerais sobre as populações.

A constituição dos Estados Unidos trazia no seu texto a obrigatoriedade da promoção de censos demográficos a cada 10 anos a partir de 1790, cuja motivação era de atualizar o número de deputados para o Congresso e a distribuição dos impostos federais. O mando constitucional promoveu a sistematização e regularização dos sistemas de coleta, além de incentivar o desenvolvimento de novos processos. Muitas nações europeias também adotaram a prática em meados do século XIX. Com as novas demandas criadas pelos censos e a maior oferta de dados para análise, a estatística cresceu e floresceu ao longo do século XIX tendo em vista análises nos mais diversos campos: dados territoriais, produção agrícola, renda, nascimentos, mortes, criminalidade, suicídios, entre outros.

Concitantemente ao desenvolvimento da aritmética política, outras ciências matemáticas contribuíram para a formação da disciplina estatística. A Roger Cotes publicou *Opera Miscellanea* em 1722, inaugurando a Teoria de Erros através da análise astronômicas e o uso da média para combinar observações. Thomas Simpson aplica a análise probabilística aos erros de observação em 1755, argumentando formalmente o porquê a média é mais confiável que um dado isolado.

Andrien-Marie Legendre publica o Método dos Mínimos Quadrados em 1805, utilizando-o na geodésica para estimar o comprimento do meridiano da Terra e determinar a unidade do metro. Carl Friedrich Gauss desenvolve e aplica a técnica de forma independente para traçar a órbita de Ceres, constatando também que ela encontrava o parâmetro ótimo sob a hipótese dos erros seguirem a hoje denominada distribuição Normal ou Gaussiana. Adiante, o Método dos Mínimos Quadrados tornou-se amplamente difundido para obter estimativas de parâmetros de populações a partir de amostras em várias disciplinas quantitativas.

Na Teoria Cinética dos Gases, a regularidade nas estatísticas sociais inspirou modelos termodinâmicos desenvolvidos nos trabalhos de Anders Celsius, James Clerk Maxwell e Ludwig Boltzmann. Nesses trabalhos, é inaugurada a moderna Mecânica Estatística, que usa modelos probabilísticos para explicar propriedades macroscópicas de um sistema a partir da observação do comportamento geral de suas partes microscópicas.

A biologia também trouxe grandes contribuições à estatística na forma da biometria. Sir Francis Galton utilizou os conhecimentos estatísticos desenvolvidos até meados do século XIX para analisar a diversidade biológica implicada pela Teoria da Evolução de Charles Darwin. Ele também foi um dos primeiros a desenvolver os métodos de regressões e correlação, os quais aplicou à análise de hereditariedade. Os trabalhos de Galton também influenciaram Karl Pearson, cujo nome batiza um dos principais testes e medidas de associação em análise de dados, além de introduzir o método dos momentos para estimação de parâmetros. Pearson também funda o primeiro departamento universitário de estatística do mundo no University College London em 1911, além da influente revista *Biometrika*, que durante muito tempo foi a principal

difusora de novos métodos estatísticos e de suas aplicações.

No início do século XX, observou-se a necessidade de métodos sistemáticos de planejamento de experimentos e coleta de amostras que garantissem a eliminação de vieses e a representatividade da população amostrada em várias variáveis. Com esse fim, o estatístico polonês Jerzy Neyman introduz o método de amostragem estratificada em 1934. O método ganha fama com George Gallup em 1936, o qual previu a reeleição de Franklin D. Roosevelt à presidência dos Estados Unidos, em oposição à previsão feita pela grande revista da época *Literacy Magazine*, que apesar de coletar um número maior de observações, o fez de forma a coletar apenas a opinião de americanos de classe média alta, os quais tendiam a votar no candidato republicano Alfred Landon. A anedota mudou para sempre as noções do que seria uma amostragem aleatória e o desing de experimentos que necessitam de amostras representativas de populações.

Ainda na primeira metade e meados do século XX, o nome do biólogo e estatístico Ronald Fisher ganha destaque. Fisher expande o projeto e desing de experimentos, sistematiza os testes de hipótese e de significância estatística, cria o método ANOVA para estudos multipopulacionais e introduz o método da Máxima Verossimilhança para estimação de parâmetros. Fisher é um dos grandes nomes na sistematização de estudos quantitativos, contribuindo para que a estatística não se prendesse somente à mera identificação de correlações, mas indo também em direção às causas dos fenômenos, tendo contribuições na ecologia, psicologia e pesquisas clínicas.

Com o desenvolvimento e sofisticação das técnicas estatísticas, como a amostragem, modelagem e inferência, a estatística na virada do século XIX para o XX, expandiu-se da esfera do Estado para se tornar uma disciplina aplicada em ciências naturais, sociais, administração pública e privada. Neste contexto, figuram nomes George Box, Pafnuty Chebyshev, Gertrude Cox, George Dantzig, Edward Deming, Bruno de Finetti, Sir Ronald Fisher, Sir Francis Galton, Aleksandr Lyapunov, Karl Pearson, Charles Spearman e John Tukey.

Atualmente a estatística é a disciplina central em qualquer outra área para lidar com dados e incertezas. O avanço das técnicas computacionais viabilizaram o desenvolvimento de técnicas e aplicações estatísticas cada vez mais robustas e complexas para lidar com quantidades massivas de dados e geração de conhecimento e compreensão para diversas áreas, como economia, ciências sociais, computação, inteligência de negócios, saúde, etc.

Análise de Dados

A Análise de Dados consiste na inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo claro de obter informações úteis, informar conclusões ou apoiar a tomada de decisão. Em resumo, ela é o processo de extração de dados brutos para geração de conhecimento acionável, geralmente feito num ciclo iterativo. As fases desse processo podem ser divididas em:

1. Requisitos de Dados: a escolha de dados a serem extraídos depende das análises que se deseja realizar. Aqui define-se a **unidade experimental**, que pode consistir de um indivíduo ou uma população deles, e as **variáveis** específicas dessa unidade,

como idade e renda para uma população de pessoas.

2. **Coleta de Dados:** consiste na tarefa de obter os dados de diferentes fontes, como bancos de dados estruturados ou não-estruturados, sensores físicos, formulários, uma interface de programação de aplicação (API), arquivos binários ou de textos, entre muitas outras fontes.
3. **Processamento e Limpeza:** inclui tarefas de organizar os dados em formatos estruturados, identificar tipos, deduplicar, tratar valores faltantes, incorretos e desviantes e transformar o formato de dados para outros mais convenientes.
4. **Análise Exploratória:** compreende uma gama de técnicas para descrever e resumir os dados obtidos à procura de informações que ajudem entender relações entre as variáveis e guie às técnicas a serem aplicadas nas fases posteriores. Aqui é comumente aplicadas técnicas da Estatística Descritiva e métodos gráficos.
5. **Modelagem:** são usados algoritmos e modelos estatísticos para extrair padrões latentes nos dados, muitas vezes não triviais de serem identificados. As técnicas de aprendizado estatístico são especialmente úteis nessa etapa.
6. **Comunicação e Produto de Dados:** a depender do contexto e das finalidades definidas a priori, busca-se maneiras de comunicar esses dados aos atores interessados na forma de visualizações e relatórios. Nos últimos anos, a disciplina de **Narrativa de Dados** tem se destacado para realizar essa comunicação.

A Análise de Dados, do ponto de vista da Estatística, poderia ser dividida em

1. **Estatística Descritiva:** utilizar medidas de resumo numéricas para os dados a fim de descrever padrões visíveis, geralmente respondendo perguntas do tipo “o que aconteceu?”.
2. **Análise Exploratória:** semelhante a anterior, porém empregando métodos mais flexíveis e visuais que permitam identificar padrões mais ocultos, correlações e anomalias. Ocorre num processo iterativo de formulação de perguntas, exploração e descobertas.
3. **Análise Confirmatória:** aplica as técnicas da inferência estatística para confirmar ou rejeitar hipóteses existentes das etapas anteriores

Sumário

I	Distribuições	1
1	Probabilidades	2
1.1	Noções de Medida	3
1.1.1	Análise	3
1.1.2	Introdução à Medida	4
1.1.3	Integral de Lebesgue	7
1.1.4	Espaços L^p	9
1.2	Cálculo das Probabilidades	11
1.3	Probabilidade Condicional e Independência	14
1.4	Teorema de Bayes	16
2	Variáveis Aleatórias	18
2.1	Variáveis Aleatórias	18
2.2	Função de Distribuição Acumulada	20
2.3	Variáveis Aleatórias Discretas	22
2.4	Variáveis Aleatórias Contínuas	25
2.5	Transformações	28
2.5.1	Transformação de Variáveis Discretas	29
2.5.2	Transformação de Variáveis Contínuas	30
2.6	Esperança e Momentos	32
2.7	Simetria	38
3	Modelos de Distribuição de Probabilidade	43
3.1	Modelos Discretos	43
3.1.1	Distribuição Uniforme Discreta	43
3.1.2	Distribuição Bernoulli	44
3.1.3	Distribuição Binomial	45
3.1.4	Distribuição Hipergeométrica	46

3.1.5	Distribuição Geométrica	48
3.1.6	Distribuição Binomial Negativa	49
3.1.7	Distribuição Poisson	50
3.1.8	Distribuição Zeta	53
3.2	Distribuição Normal	53
3.3	Outros Modelos Contínuos	58
3.3.1	Uniforme Contínua	58
3.3.2	Exponencial	59
3.3.3	Distribuição Gama	60
3.3.4	Distribuição χ^2	61
3.3.5	Ditribuição de Cauchy	61
3.3.6	Distribuição de Weibull	62
3.3.7	Distribuição Beta	62
3.3.8	Distribuição log-normal	63
3.3.9	Distribuição de Laplace	63
3.4	Desigualdades	64
4	Variáveis Aleatórias Multidimensionais	66
5	Simulação	67
II	Análise Exploratória	68
6	Tipos de Dados e Gráficos	69
6.1	Tipos e Escala de Dados	69
6.2	Tabelas de Frequência	71
6.3	Gráficos	71
7	Medidas de Resumo	74
7.1	Medidas de Posição	74
7.2	Medidas de Dispersão	75
7.3	Quantis	76
7.4	Simetria e Assimetria	78
7.5	Medidas Robustas	79
8	Análise de Dados de Duas Variáveis	81
III	Inferência Clássica	82
9	Amostragem	83
10	Estimação de Parâmetros	84
11	Testes de Hipóteses	85

12	Inferência Multipopulacional	86
13	Análise de Aderência e Adesão	87
14	Teste de Hipótese Não Paramétricos	88
IV	Regressão	89
15	Covariância e Correlação	90
16	Regressão Linear	91
17	Regressão Linear Generalizada	92
V	Inferência Bayesiana	93
18	Paradigma Bayesiano	94
19	Inferência e Decisão	95
20	Computação Bayesiana	96
VI	Processos Estocásticos	97
21	Introdução aos Processos Estocásticos	98
22	Cadeias de Markov	99
23	Ergodicidade	100
24	Processos de Contagem	101
25	Simulação por Processos Estocásticos	102
VII	Séries Temporais	103
26	Fundamentos de Séries Temporais	104
27	Modelos Lineares de Séries Temporais	105
28	Modelos Intergrados e Sazonais	106
29	Previsão	107
30	Métodos de Suavização	108
31	Tópicos Avançados	109

PARTE I

DISTRIBUIÇÕES

Probabilidades

Ao observar, registrar ou extrair uma amostra de dados a partir de um fenômeno aleatório, isto é, cujo resultado não pode ser deterministicamente previsto, a Estatística, dentre outras coisas, procura entender o comportamento das frequências de ocorrência dos valores amostrados. Essas frequências são estimativas das **probabilidades** dos eventos observados. A partir de hipóteses adequadas, podemos modelar as frequências por modelos probabilísticos que, por sua vez, são objetos de estudo da Teoria das Probabilidades.

Probabilidades são frequentemente representadas como porcentagens e são muitas vezes entendidas como a frequência de um evento quando se repete o experimento um número suficiente de vezes. Por exemplo, dizer que 16% da população possui diploma de graduação significaria que se escolhermos aleatoriamente 100 pessoas dessa população, cerca de 16 delas teriam diploma de graduação. Essa abordagem é chamada de **frequentista**, sendo a mais amplamente adotada em aplicações estatísticas clássicas.

Outra abordagem para compreender probabilidades é enquanto o grau de crença numa hipótese, como ao dizer que se tem 80% de certeza em dizer que irá chover, visto as evidências do céu nublado e ventos frios. Essa é uma visão mais intuitiva e moderna de probabilidades, sendo chamada de **Bayesiana**, sendo a base da Inferência Bayesiana.

A moderna Teoria das Probabilidades é fundamenta utilizando-se conceitos da Teoria da Medida, um ramo da Análise que generaliza as noções de comprimento, área e volume para espaços abstratos associando-os a uma “medida”, a partir da qual também estende-se uma Teoria de Integração para esses espaços. Probabilidades são vistas, portanto, como medidas das chances de ocorrência de um subconjunto de eventos dentro de um universo de resultados possíveis.

1.1 Noções de Medida

Nesta seção, será realizada uma breve exposição dos principais enunciados sobre a Teoria da Medida a fim de fundamentar o desenvolvimento posterior dos conceitos associados à Teoria de Probabilidades, que, por sua vez, garante a fundamentação da teoria estatística.

1.1.1 Análise

O conceito de continuidade, estudado dentro da Análise, está atrelado à ideia de poder aproximar uma função real a um determinado valor variando suavemente seu argumento.

Definição 1.1. *Um função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uniformemente contínua em $a \in \mathbb{R}$ se*

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

Outra forma equivalente de definição de continuidade é

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

Funções que não são contínuas em determinado ponto significa que, a depender de onde nos aproximamos, o valor para o qual a função converge se diferencia.

Exemplo 1.1. *A função $f(x) = x^2$ é contínua em todo ponto de seu domínio, já que*

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$$

Exemplo 1.2. *Funções escadas são exemplo de funções não contínuas.*

A próxima definição é uma versão mais forte da anterior. A continuidade uniforme significa que, independente da escolha de limite de erro ϵ para o valor da função, há um único δ tal que em qualquer lugar observa-se que, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Definição 1.2. *Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uniformemente contínua se*

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R} \forall x, a \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

Uma função que não é uniformemente contínua pode ter variações muita abruptas em alguns intervalos, e mais suaves em outros.

Exemplo 1.3. *As funções $\sin x$, $\cos x$ e funções lineares são exemplos de absolutamente contínuas, pois suas taxas de variação não se tornam infinitamente grandes conforme a função se aproxima de qualquer ponto.*

Exemplo 1.4. *A função $f(x) = 1/x$ não é uniformemente contínua, pois conforme se aproxima de 0, a sua variação se torna infinitamente grande.*

Conjuntos que podem ser inteiramente contidos em um aberto e que possuem todos os seus pontos de acumulação são ditos compactos. Quando uma função é contínua em cada ponto de um compacto, então é seguro dizer que ela será uniformemente contínuo ao longo de todo o conjunto.

Teorema 1.1. *Seja f uma função pontualmente contínua em X . Se X é compacto (fechado e limitado), então f é uniformemente contínua em X .*

A continuidade uniforme é uma restrição avaliada a cada par de pontos dentro de um intervalo. Já a continuidade absoluta significa que podemos tomar tantos intervalos quanto pudermos enumerar e somar seus comprimentos de forma que, a soma dos comprimentos dos intervalos no domínio levam a pequenas somas de intervalos na imagem, não estando mais estrita a pontos somente.

Definição 1.3. *Uma função f é absolutamente contínua em $[a, b]$ se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta \in \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer intervalos disjuntos*

$$(a_k, b_k) \subset [a, b]$$

tem-se

$$\sum_k (b_k - a_k) < \delta \implies \sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \epsilon$$

1.1.2 Introdução à Medida

Antes de podermos medir determinados conjuntos, precisamos entender que tipos de conjuntos podem ser medidos. Com esse propósito, introduz-se o conceito de σ -álgebras, que define uma álgebra sobre uma coleção de partes de um conjunto cujas operações definem conjuntos **mensuráveis**, i.e., que podem ser medidos em certo sentido.

Definição 1.4. *Seja Ω um conjunto e $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. O conjunto $\mathcal{B}$ é uma σ -álgebra de Ω se, e somente se,*

$$i \quad \emptyset \in \mathcal{B}.$$

$$ii \quad \forall A \in \mathcal{B}, A^c \in \mathcal{B}.$$

$$iii \quad \forall A \in \mathcal{B}, \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}.$$

Se Ω é um espaço amostral, então $A \in \mathcal{B}$ é denominado evento de Ω .

O caso dos números reais será especial a nós. Comumente, nos referimos à **topologia usual** dos reais como a coleção de todos os intervalos – abertos e fechados – e conjuntos enumeráveis de números reais. A σ -álgebra de Borel para $\mathbb{R}$ é aquela que, a partir de um conjunto de geradores na forma $(-\infty, x]$, com $x \in \mathbb{R}$, consegue criar a topologia usual dos reais.

Definição 1.5. *Seja $\mathcal{G} = \{(-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R}\}$. A σ -álgebra gerada por $\mathcal{G}$ é chamada σ -álgebra de Borel em $\mathbb{R}$ e é denotada por $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.*

Definição 1.6. *Um conjunto é dito de medida nula se para todo $\epsilon > 0$ existe uma cobertura enumerável $\{I_k\}_1^n$ tal que a soma dos comprimentos de cada intervalo I_k é menor que ϵ .*

Ao especificar um universo de elementos e as suas partes que podem ser “medidas”, então chegamos a um espaço mensurável. Se encontrarmos uma função, chamada de **medida**, que satisfaça hipóteses de o vazio tem medida 0 e que a medida da soma de partes disjuntas é a soma das medidas, então essa medida, junto com o universo e a sua σ -álgebra, formam um espaço de medida.

Definição 1.7. O par $(\Omega, \mathcal{B})$ é dito mensurável se $\mathcal{B}$ for uma σ -álgebra de Ω . A função $\mu : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_+$ é uma medida para $(\Omega, \mathcal{B})$ se satisfaz

$$i. \mu(\emptyset) = 0$$

$$ii. \sigma\text{-aditividade: } \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

A tripla $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ é chamado de espaço de medida.

Sem a restrição sobre a pré-imagem de f , haveriam conjuntos na imagem que podem ser medidos cujas contrapartes não o poderiam.

Dentre todas as medidas, a de maior destaque é a de Lebesgue, que define uma forma “canônica” de medir intervalos reais, podendo ser generalizada para medir retângulos em qualquer dimensão. Essa medida se comporta analogamente a uma régua, pois ela satisfaz que a medida do intervalo é o comprimento dele.

Definição 1.8. A medida λ de Lebesgue para $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ satisfaz

$$\lambda((a, b]) = b - a$$

Outra medida importante é a de contagem, que associa cada conjunto à quantidade de elementos presentes nele, sendo um número natural quando o conjunto é finito, ou infinito quando ele não o é.

Definição 1.9. Se a medida μ satisfaz

$$\mu(A) = \begin{cases} |A|, & \text{se } A \text{ for finito} \\ \infty, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

então μ é medida de contagem.

Teorema 1.2. Se $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ é uma espaço de medida e $\{A_n\}$ é uma família enumerável de elementos de $\mathcal{B}$, então

i. continuidade por baixo: Se $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, então

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

ii. continuidade por cima: Se $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, então

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

iii. Sub-aditividade

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Desejamos que, quando um conjunto está contido em outro, então sua medida deve ser menor ou igual ao do conjunto que contém. Isso expressa-se no próximo Teorema.

Teorema 1.3. *Seja $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ espaço de medida, e A e B elemetos de $\mathcal{B}$.*

$$A \subset B \rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$$

Há dois tipos de medida que valem serem citadas. As medidas completas são aquelas que qualquer subconjunto de um outro que tenha medida nula também terá medida nula. Por sua vez, as σ -finitas são aquelas que permite particionar o universo em enumeráveis partes de medida finita.

Definição 1.10. *Uma medida μ para $(\Omega, \mathcal{B})$ é dita completa se*

$$\forall S \in \mathcal{B} \forall A, \mu(S) = 0 \wedge (A \subset S \rightarrow A \in \mathcal{B})$$

A medida μ é dita σ -finita se

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

com $\mu(A_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.4. *A medida de Lebesgue e de contagem são σ -finitas.*

Definição 1.11. *Seja $(\Omega, \mathcal{B})$ um espaço mensurável por medidas ν e μ . Dizemos que ν é absolutamente contínua em relação a μ , denotado por $\nu \ll \mu$, se*

$$\forall A \in \mathcal{B}, \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0.$$

Funções, sob certas circunstâncias apropriadas, podem ser compreendidas como transformações de um espaço. Quando aplicamos uma função f com domínio no universo Ω de um espaço mensurável e obtemos um novo universo que pode ser medido, então essa função será mensurável caso, para todo conjunto “medível” na imagem, sua contraparte no domínio também é um conjunto que pode ser medido.

Definição 1.12. *Sejam $(\Omega, \mathcal{B})$ e $(\Omega', \mathcal{B}')$ espaços de medida. Uma função $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ é mensurável – ou $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ -mensurável – se*

$$\forall B \in \mathcal{B}', f^{-1}(B) \in \mathcal{B}$$

onde f^{-1} denota a pré-imagem de f .

Teorema 1.5. *São verdadeiras as seguintes afirmações:*

- i. Toda função contínua é mensurável.*
- ii. Se f e g são funções mensuráveis, então são mensuráveis*

$$f \circ g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g}, g \neq 0$$

iii. Se $\{f_n\}$ é uma sequência de funções mensuráveis, então são mensuráveis

$$\limsup f_n, \quad \liminf f_n, \quad \sup f_n, \quad \inf f_n$$

iv. O limite pontual de uma função mensurável é mensurável.

Quando temos uma função f mensurável, pode ser desejável trabalhar como uma versão dela que se comporte tal como uma medida, mas especialmente como a medida de Lebesgue. Com esse fim, defini-se a medida de Stieltjes, que mede intervalos como, por exemplo, a distância vertical entre dois pontos no gráfico de uma função real.

Definição 1.13. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função mensurável monótona crescente e contínua à direita, então a medida induzida de Stieltjes por f , denotada por μ_f , satisfaz

$$\mu_f((a, b]) = f(b) - f(a)$$

O próximo resultado mostra uma propriedade fundamental das medidas de Stieltjes.

Teorema 1.6. Seja μ_f a medida de Stieltjes induzida por f . A função f é absolutamente contínua se, e somente se, $\mu_f \ll \lambda$, onde λ é a medida de Lebesgue.

1.1.3 Integral de Lebesgue

A integral de Riemann falha ao tentarmos integrar a maioria das funções. A fim de estender a integração para uma classe maior de funções, a Teoria da Medida expandiu o conceito de integral enquanto uma generalização da medida de comprimentos de comprimentos, áreas, volumes, etc. Esse desenvolvimento culminou na própria moderna Teoria de Medida, tendo como uma de suas bases a integração de Lebesgue.

Definição 1.14. A aplicação $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função simples se pode ser expressa com

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot I_{A_i}(x)$$

onde $a_i \in \mathbb{R}$ e $\{A_i\}_{i=1}^n \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ são dois a dois disjuntos.

As funções simples designam uma classe de funções que assumem um conjunto finito de valores. Sua importância encontra-se no Teorema a seguir, o qual enuncia que qualquer função não negativa pode ser aproximado por uma seqência de funções simples.

Teorema 1.7. Para toda função $f \geq 0$ há uma sequência $\{\phi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ não negativa e crescente de funções simples tal que $\phi \rightarrow f$ pontualmente, e uniformemente se f for limitada.

Com isso, estamos prontos para definir a importante Integral de Lebesgue,

Definição 1.15. Dada a medida λ de Lebesgue, a integral de Lebesgue, denotada por

$$\int f d\lambda$$

satisfaz

i. Se f é simples, então

$$\int f d\lambda = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \lambda(A_i)$$

ii. sendo f é mensurável e $\{\phi\}_{\mathbb{N}}$ tal que $\phi_n \rightarrow f$, então

$$\int f d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \phi_n d\lambda$$

e o limite existe e não depende da sequência $\{\phi\}_{\mathbb{N}}$.

iii. Se $f = f^+ - f^-$, onde $f^+ = \max(0, f)$ e $f^- = \max(0, -f)$, então

$$\int f d\lambda = \int f^+ d\lambda + \int f^- d\lambda$$

desde que $\int |f| d\lambda < \infty$.

Teorema 1.8. A integral de Lebesgue satisfaz

i. **Linearidade:**

$$\int (af + bg) d\lambda = a \int f d\lambda + b \int g d\lambda$$

ii. **Monotonicidade:**

$$f \leq g \text{ q.s.} \rightarrow \int f d\lambda \leq \int g d\lambda$$

iii. **Aditividade:** Se $A \cap B = \emptyset$, então

$$\int_{A \cup B} f d\lambda = \int_A f d\lambda + \int_B f d\lambda$$

iv. **Nulidade:** Se $f \geq 0$ mensurável,

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \int_A f d\lambda = 0 \leftrightarrow f = 0 \text{ q.s. em } A$$

v. **Desigualdade de Módulo:**

$$\left| \int f d\lambda \right| \leq \int |f| d\lambda$$

vi. **Riemann:**

$$\int_{[a,b]} f d\lambda = \int_a^b f(x) dx$$

Teorema 1.9 (Convergência Monótona). Se $\{f_n\}_{\mathbb{N}}$ é uma sequência não negativa e crescente de funções mensuráveis e $f_n \rightarrow f$ q.s., então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = \int f d\lambda$$

Lema 1.1 (de Fatou). Se $f_n \geq 0$ são mensuráveis, então

$$\int \liminf f_n d\lambda \leq \liminf \int f_n d\lambda$$

Teorema 1.10. *Se $f_n \rightarrow f$ q.s. e existe $g \in L^1(\lambda)$ tal que $|f_n| \leq g$ q.s. para todo n , então*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = \int f d\lambda$$

O Teorema de Toneli é um importante resultado do cálculo integral. Ele enuncia que dada uma função não negativa e desejamos integrá-la num espaço de medida dado como produto de outros dois, podemos integrar individualmente em relação a cada espaço individualmente de forma iterada.

Teorema 1.11. *Para $f \geq 0$ mensurável em*

$$(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$$

vale que

$$\int \int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int (f d\mu_1) d\mu_2 = \int (f d\mu_2) d\mu_1$$

No cálculo integral multivariável tradicional, esse resulta se torna especialmente útil, pois justifica a integração iterada em cada variável de forma independente. Desse modo, enuncia-se o Teorema de Fubini:

Teorema 1.12. *Se*

$$\int |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) < \infty$$

então as integrais iteradas existem q.s. e são iguais às integrais duplas.

Logo, toda função integrável permite a integração (quase sempre) iterada de cada variável.

Teorema 1.13. *Seja $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ espaço mensurável onde μ é de contagem, e f uma função não negativa mensurável. Para todo mensurável $A \in \mathcal{A}$,*

$$\int_A f d\mu = \sup \left\{ \sum_{x \in F} f(x) \mid F \subseteq A, F \text{ finito} \right\}$$

Em especial, se

$$\int_A |f| d\mu < \infty$$

então

$$\int_A f d\mu = \sum_{x \in A} f(x)$$

tal que a série à direita é absolutamente convergente.

1.1.4 Espaços L^p

Os espaços L^p são espaços funcionais de aplicações mensuráveis e integráveis. Através deles, podemos definir noção de “norma” para funções, a qual utiliza a integração em relação a uma medida.

Definição 1.16. Para $1 \leq p \leq \infty$,

$$L^p(\mu) = \left\{ f \text{ mensurável} \mid \int |f|^p d\mu < \infty \right\}$$

e

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

Se $p = \infty$,

$$\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f|$$

O Teorema de Hölder é uma generalização da famosa Desigualdade Cauchy-Schwartz para funções em espaços L^p distos conjugados.

Teorema 1.14 (de Hölder).

$$\int (fg) d\mu = \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

onde

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Se $p = q = 2$, então o Teorema de Hölder equivale à Desigualdade de Cauchy-Schwartz. O próximo teorema generaliza a desigualdade triangular para espaços L^p .

Teorema 1.15.

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Logo, todos os espaços L^p são normados e completos (de Banach). Em especial, L^2 é um espaço de Hilbert.

Teorema 1.16. Se $\mu(\Omega) < \infty$ e $p \leq q$, então $L^p(\Omega) \subset L^q(\Omega)$

Teorema 1.17 (de Radon-Nikodym). Seja $(S, \mathcal{B})$ um espaço mensurável por medidas μ e ν . Se μ é σ -finita e $\nu \ll \mu$, então existe uma função mensurável não negativa $f \in L^1(\mu)$ tal que

$$f = \frac{d\nu}{d\mu} \iff \forall A \in \mathcal{B}, \nu(A) = \int_A f d\mu$$

Ademais, se a função g satisfaz a expressão anterior, então

$$g = \frac{d\nu}{d\mu} \iff f = g \text{ q.s.}$$

Teorema 1.18. Se F é uma função absolutamente contínua, então existe $f \in L^1(\lambda)$ tal que

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f d\lambda$$

onde dizemos que $f = F'$ q.s.

Teorema 1.19. Se $f = F'$ q.s. e f é contínua em x , então $f(x) = F'(x)$.

Definição 1.17. *Sejam $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ um espaço de medida, $(\Omega', \mathcal{B}')$ um espaço mensurável e $T : \Omega \rightarrow \Omega'$ uma função mensurável. Dizemos que ν é a medida imagem obtida ao impulsionar μ por T , denotado por*

$$\nu = T \cdot \mu,$$

se

$$\forall B \in \mathcal{B}', \nu(B) = \mu(T^{-1}(B))$$

onde T^{-1} denota a pré-imagem de T .

Teorema 1.20. *Sejam $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ e $(\Omega', \mathcal{B}', \nu)$ espaços de medida, onde ν é a medida imagem de μ impulsionada por $T : \Omega \rightarrow \Omega'$ mensurável. Se $f : \Omega' \rightarrow \mathbb{R}$ é mensurável e não negativa, então*

$$\int_{\Omega'} f d\nu = \int_{\Omega} (f \circ T) d\mu$$

1.2 Cálculo das Probabilidades

A Teoria de Probabilidades fundamenta-se em três princípios primitivos conhecidos como Axiomas de Kolmogorov. Dado um universo de possibilidades Ω , chamado de espaço amostral, e cujas as partes são chamadas de eventos, enuncia-se que

- **Axioma 1.** A probabilidade é uma função não negativa
- **Axioma 2.** A probabilidade do espaço amostral é 1.
- **Axioma 3.** A probabilidade de eventos disjuntos é a soma de suas respectivas probabilidades.

Podemos traduzir esses axiomas na nomenclatura de medida. O espaço amostral trata-se do universo de um espaço de medida, de sorte que os eventos são os elementos de uma σ -álgebra desse universo. A função de probabilidade é, portanto, uma medida para os eventos que pode ser interpretada como o quão provável é obter os elementos do evento num experimento aleatório. Uma vez que medidas satisfazem não negatividade e σ -aditividade por definição, para resumir os axiomas basta então impor que a medida aplicada a totalidade do universo é igual a 1.

Definição 1.18. *Um espaço de medida $\Omega, \mathcal{F}, P$ é um espaço de probabilidade se é satisfeito que*

$$P(\Omega) = 1.$$

Os elementos $A \in \mathcal{F}$ são chamados de eventos. O conjunto Ω é denominado espaço amostral.

Os Teoremas 1.1 e 1.2 nos ajudarão a facilitar a avaliação e, futuramente, a computação de probabilidades

Proposição 1.1. *Se $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ é espaço de probabilidade, então*

$$i. P(A^c) = 1 - P(A)$$

ii. $P(A) \leq 1$

Demonstração. Para (i), temos que $A \cup A^c = \Omega$, então por σ -aditividade,

$$\begin{aligned} P(A) + P(A^c) &= P(\Omega) \\ P(A^c) &= P(\Omega) - P(A) = 1 - P(A) \end{aligned}$$

A afirmação (ii) segue de (i) e da propriedade de imagem não negativade de medida:

$$P(A^c) \geq 0 \implies 1 - P(A) \geq 0 \implies P(A) \leq 1.$$

■

Proposição 1.2. Se $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ é espaço de probabilidade, e A e B são eventos, então

i $P(B \cap A^c) = P(B) - P(B \cap A).$

ii $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$

Demonstração. Para (i), considere primeiramente que

$$(B \cap A) \cup (B \cap A^c) = B$$

e como $(B \cap A) \cap (B \cap A^c) = \emptyset$, então podemos usar aditividade de medidas:

$$\begin{aligned} P(B \cap A) + P(B \cap A^c) &= P(B) \\ P(B \cap A^c) &= P(B) - P(B \cap A). \end{aligned}$$

Para provar (ii), usaremos a probabilidade do complementar e a afirmação (i):

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= 1 - P(A^c \cap B^c) \\ &= 1 - [P(A^c) - P(A^c \cap B)] \\ &= P(A) + P(A^c \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B). \end{aligned}$$

■

Para espaços amostrais enumeráveis, ao associar a cada resultado individual um número em $[0, 1]$, de modo que a soma dos pesos resulte em 1, a soma dos pesos dos resultados presentes num evento será a probabilidade desse evento.

Teorema 1.21. Seja $\Omega = \{\omega_i\}_{\mathbb{N}}$ um conjunto enumerável, e $\mathcal{F}$ uma σ -Álgebra de Ω . Seja $\delta : \Omega \rightarrow [0, 1]$ função tal que

$$\sum_{\omega \in \Omega} \delta(\omega) = 1.$$

Presuma também que, se $A \in \mathcal{F}$, então

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} \delta(\omega)$$

A tripla $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ é um espaço de probabilidade.

Demonstração. Precisamos provar que P é uma medida de probabilidade que satisfaz os Axiomas de Medida.

Não negatividade Como $\delta \geq 0$, então para todo A em $\mathcal{F}$ vale que $P(A) \geq 0$.

Probabilidade do espaço amostral satisfeito por hipótese.

Soma de eventos disjuntos seja $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ uma família disjunta de eventos de $\mathcal{F}$ tal que

$$A_j = \{\omega_i \mid i \in I_j\}$$

em que I_j é um conjunto de índices. Desenvolvendo,

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i \in I_j} \delta(\omega_i) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j)$$

■

Esse resultado é útil para computar a probabilidade de uma vasta gama de experimentos aleatórios na prática. Um exemplo é o lançamento de um dado de 6 faces; se acreditamos que o dado é honesto, isto é, que o dado não é viciado em nenhuma de suas faces, então podemos associar $1/6$ a cada face do dado. Se por exemplo, deseja-se saber a probabilidade de obtermos um número menor ou igual a 3, basta somar as faces que satisfazem essa condição, obtendo uma probabilidade de 0.5. Experimentos os quais acreditamos não conterem vícios são chamados de equiprováveis.

As σ -Álgebras que equivalem ao conjunto das partes do espaço amostral são chamadas de σ -Álgebra potência. Quando o espaço amostral do experimento é enumerável e a sua σ -álgebra é a potência, ocorre que cada subconjunto unitário do espaço amostral – um resultado individual – é um evento do experimento. Se o experimento é equiprovável, então todos os resultados são eventos de mesma probabilidade.

Definição 1.19. *Seja o espaço $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ com Ω finito, $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$ e P definido como no Teorema 1.21. Chama-se esse espaço de equiprovável se, e somente se,*

$$\forall \omega \in \Omega, P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}.$$

A probabilidade de eventos em experimentos com resultados equiprováveis destaca-se por ser intuitiva de calcular. A probabilidade de evento será, simplesmente, a fração dos resultados presentes nele. Esse resultado será enunciado como Corolário do Teorema 1.21.

Corolário 1.1. *A probabilidade de um evento $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ num espaço $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ equiprovável é igual a*

$$\frac{|A|}{|\Omega|}$$

Demonstração.

$$P(A) = |A| \cdot \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

■

1.3 Probabilidade Condicional e Independência

Em experimentos aleatórios, um determinado evento pode ser mais ou menos frequente a depender do conhecimento da ocorrência de outro evento. Nesse caso, dizemos que um evento está condicionado a outro.

Definição 1.20. *Seja $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ um espaço de probabilidade. Sejam E e F eventos de $\mathcal{B}$ com $P(F) \neq 0$. A probabilidade condicional do evento E dado F , denotada por $P(E|F)$, é dada por*

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

Quando a interseção entre dois eventos é vazia, então teremos que a probabilidade condicional será 0. A probabilidade condicional induz uma forma de determinar a probabilidade do evento dado como interseção de vários outros.

Proposição 1.3 (Regra do Produto). *Seja $\mathcal{F} = \{E_i\}_n$ uma família de eventos disjuntos de um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{B}, P)$.*

$$P\left(\bigcap_{E \in \mathcal{F}} E\right) = \prod_{i=1}^n P\left(E_i \mid \bigcap_{j < i} E_j\right)$$

Demonstração. A prova será por indução em n

Base: $n = 1$ é trivial.

Hipótese de Indução: admita que o resultado vale para uma família de n eventos. Se $|\mathcal{F}| = n + 1$, então façamos

$$\bigcap_{j < n+1} E_j = E'$$

e obtemos que

$$P\left(\bigcap_{E \in \mathcal{F}} E\right) = P(E' \cap E_n) = P(E_n|E')P(E').$$

Como a hipótese de indução vale para E' , então

$$P\left(\bigcap_{E \in \mathcal{F}} E\right) = P\left(E_n \mid \bigcap_{j < n+1} E_j\right) \cdot \prod_{i=1}^n P\left(E_i \mid \bigcap_{j < i} E_j\right) = \prod_{i=1}^{n+1} P\left(E_i \mid \bigcap_{j < i} E_j\right)$$

Uma vez que a proposição vale para $n + 1$, então vale para todo $n \in \mathbb{N}$ pelo princípio de indução. ■

Eventos independentes são aqueles cuja probabilidade de ocorrência não depende da ocorrência de outro. Isso equivale a dizer que, o conhecimento do acontecimento de um evento não muda a crença na ocorrência de outro.

Definição 1.21. *Dois eventos E e F de um espaço $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ são independentes se, e somente se*

$$P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$$

Proposição 1.4. *Se E e F são eventos independentes de $(\Omega, \mathcal{B}, P)$, então*

$$P(E|F) = P(E) \quad e \quad P(F|E) = P(F)$$

Demonstração. Por definição de probabilidade condicional,

$$P(E \cap F) = P(E|F) \cdot P(F)$$

mas como E e F são independentes por hipótese,

$$\begin{aligned} P(E) \cdot P(F) &= P(E|F) \cdot P(F) \\ P(E) &= P(E|F) \end{aligned}$$

e o mesmo pode ser mostrado analogamente para $P(F)$. ■

Proposição 1.5. *Sejam E e F eventos em $(\Omega, \mathcal{B}, P)$. Se eles são independentes, então os seguintes eventos também o são:*

1. E e F^c
2. E^c e F
3. E^c e F^c

Demonstração. Para (1), é verdade que

$$\begin{aligned} P(E \cap F^c) &= P(E) - P(E \cap F) \\ &= P(E)[1 - P(F)] \\ &= P(E)P(F^c) \end{aligned}$$

A expressão (2) é análoga a (1). Por fim, para expressão (3), conclua que

$$\begin{aligned} P(E^c \cap F^c) &= P((E \cup F)^c) = 1 - P(E \cup F) \\ &= 1 - P(E) - P(F) + P(E \cap F) \\ &= P(E^c) - P(F) + P(E) \cdot P(F) \\ &= P(E^c) - P(F)[1 - P(E)] \\ &= P(E^c) - P(F) \cdot P(E^c) \\ &= P(E^c)[1 - P(F)] \\ &= P(E^c) \cdot P(F^c) \end{aligned}$$

■

Teorema 1.22 (Teorema de Probabilidade Total). *Seja o espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{B}, P)$. Seja $\mathcal{F} = \{F_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, com $\mathcal{F} \subset \mathcal{B}$, uma partição de Ω . Se $E \in \mathcal{B}$, então*

$$P(E) = \sum_{F \in \mathcal{F}} P(E|F) \cdot P(F)$$

Demonstração. Para quaisquer $i, j \in \mathbb{N}$ temos que

$$(E \cap F_i) \cap (E \cap F_j) = \emptyset.$$

Com isso, podemos usar aditividade enumerável disjunta,

$$P\left(\bigcup_{F \in \mathcal{F}} (E \cap F)\right) = \sum_{F \in \mathcal{F}} P(E \cap F).$$

Em vista de que

$$\bigcup_{F \in \mathcal{F}} (E \cap F) = E \cap \Omega = E,$$

então

$$P(E) = \sum_{F \in \mathcal{F}} P(E \cap F),$$

e pela definição de probabilidade condicional,

$$P(E) = \sum_{F \in \mathcal{F}} P(E|F) \cdot P(F).$$

■

1.4 Teorema de Bayes

Teorema 1.23 (Teorema de Bayes). *Seja $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ um espaço de probabilidade. Se E e F são eventos, então*

$$P(E|F) = P(F|E) \frac{P(E)}{P(F)}$$

Demonstração.

$$P(E|F) \cdot P(F) = P(E \cap F) = P(F|E)P(E)$$

$$P(E|F) = P(F|E) \frac{P(E)}{P(F)}$$

■

Uma interpretação para o teorema é a atualização na crença $P(E)$, chamada de **prior**, numa hipótese E dada uma nova evidência F para ela, obtendo um novo grau de crença $P(E|F)$ chamado de **posterior**. A probabilidade $P(F|E)$ é chamada de **verossimilhança**, denotando o quão verossímil é observar a evidência F considerando a hipótese E verdadeira. Por sua vez, $P(F)$ é a crença na ocorrência de F tendo em vista todas as hipóteses, que, junto com a verossimilhança, ajusta o novo grau de crença em E .

Se num dado experimento aleatório consideramos hipóteses $E_1, \dots, E_n$ e obtemos uma evidência F , é plausível questionar em qual hipótese deveríamos depositar maior crença visto a evidência. Consideremos então o corolário:

Corolário 1.2 (Fórmula de Bayes). *Seja $\mathcal{E} = \{E_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ uma partição de eventos de um espaço amostral Ω . Se F é um evento de Ω , então*

$$P(E_i|F) = \frac{P(F|E_i)P(E_i)}{\sum_{E \in \mathcal{E}} P(E)P(F|E)}$$

Demonstração. Segue do Teorema de Bayes e do Teorema da Probabilidade Total. ■

Logo, para cada hipótese, poderíamos utilizar a Fórmula de Bayes para computar a crença *a posteriori* nela após a evidência F , e selecionar aquela que tivesse maior probabilidade.

Variáveis Aleatórias

Variáveis aleatórias (v.a.) são representações de características numéricas de experimentos aleatórios. Exemplos são a quantidade de caras obtidas no lançamento de uma moeda, a soma dos lados de um dado, número de erros num livro, tempo até a um equipamento apresentar falha, entre muitos outros.

2.1 Variáveis Aleatórias

Apesar do nome, a definição formal desse conceito não os trata como variáveis, mas sim como funções mensuráveis (ver Definição 1.12). Logo, a variável consiste numa associação de eventos às realizações de grandezas numéricas, de modo que todo conjunto de valores pode ter a sua probabilidade medida.

Definição 2.1. *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ um espaço de probabilidade. A aplicação $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma variável aleatória se for $(\mathcal{F}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ -mensurável, i.e.,*

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), (X^{-1}(A) \in \mathcal{F})$$

A fim de facilitar o tratamento de variáveis aleatórias, iremos introduzir uma notação para denotar eventos de um espaço amostral a partir da variável

Definição 2.2. *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ um espaço de probabilidade e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma variável aleatória. Se $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, então o evento denotado por $\{X \in A\}$ é equivalente a $X^{-1}(A) \in \mathcal{B}$.*

Perceba que se $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, então temos três formas de denotar o mesmo evento de $\mathcal{F}$.

$$X^{-1}(A) = \{X \in A\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$$

Mais do que associações a características numéricas, as variáveis aleatórias transportam um espaço de probabilidade para o espaço de medida dos reais e sua topologia usual. Logo, para medir a probabilidade de obter um conjunto de valores num experimento aleatório, não necessariamente precisamos explicitar a função de probabilidade

do espaço de origem, pois podemos induzir uma nova medida de probabilidade para $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, obtendo, então, um novo espaço de probabilidade que consiste no espaço de resultados do experimento.

Definição 2.3. *Seja $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ um espaço de probabilidade e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma variável aleatória. A tripla $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$ é o espaço de probabilidade induzido por X se para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ é satisfeito*

$$P_X(A) = P(X \in A) \iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X(A) = P(X^{-1}(A))$$

Em outras palavras, P_X é a medida imagem de P impulsionada por X no espaço $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (ver Definição 1.17).

A especificação de variáveis aleatórias costuma vir acompanhada de um conjunto de valores chamado **suporte**, que modela a noção de valores possíveis que a variável pode assumir no experimento. Um determinado valor x está no suporte de X se qualquer conjunto de valores suficientemente próximos de x – com esse incluso – tem probabilidade não nula.

Definição 2.4. *O suporte de uma variável aleatória X é o conjunto*

$$\Omega_X = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall \epsilon > 0, P(|X - x| < \epsilon) > 0\}$$

Se o suporte modela os valores possíveis, é razoável considerar que a probabilidade do próprio deve ser igual a 1.

Teorema 2.1. *Se X é uma variável aleatória com suporte Ω_X , então $P_X(\Omega_X) = 1$.*

Demonstração. Se $S = \mathbb{R} \setminus \Omega_X$, então

$$x \in S \iff \exists a, b \in \mathbb{R}, x \in (a, b) \wedge P_X((a, b)) = 0.$$

Pelo fato de $\mathbb{Q}$ ser denso em $\mathbb{R}$, existem $p, q \in \mathbb{Q}$ tais que

- i. $x \in (p, q)$
- ii. $(p, q) \subset (a, b)$
- iii. $P_X((p, q)) = 0$

De (i) segue que

$$S \subset \bigcup_{(p,q) \in I} (p, q),$$

onde $I \subset \mathbb{Q}^2$ é uma família enumerável de intervalos. Por (ii) e (iii) tem-se

$$P_X(S) \leq P_X\left(\bigcup_{(p,q) \in I} (p, q)\right) \leq \sum_{(p,q) \in I} P_X((p, q)) = 0.$$

Se $0 \leq P_X(S) \leq 0$, então $P_X(S) = 0$. Conclui-se que $P_X(\Omega_X) = 1$. ■

Com isso, quando for conveniente, podemos, em vez de trabalhar com $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, usar o espaço $(\Omega_X, \mathcal{A})$, onde

$$\mathcal{A} = \{\Omega_X \cap B \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

que é chamada de σ -álgebra traço de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Outro resultado interessante é que todo evento no espaço de resultados com probabilidade não nula contém pelo menos um elemento do suporte.

Proposição 2.1. *Seja X uma variável aleatória e $S \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ com $P_X(S) = 1$. Se $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ e $P(X \in A) \neq 0$, então $A \cap S \neq \emptyset$.*

Demonstração. Suponha que $A \cap S = \emptyset$, e por σ -aditividade,

$$P(A \cup S) = P(A) + P(S) = P(A) + 1$$

Mas pela Proposição 1.1,

$$P(A) + 1 \leq 1$$

$$P(A) \leq 0$$

Por não negatividade,

$$0 \leq P(A) \leq 0$$

$$P(A) = 0$$

■

Em especial, se $A = \{x\}$ for unitário e $x \notin \Omega_X$, então $P(X = x) = 0$.

2.2 Função de Distribuição Acumulada

Se para cada ponto da reta real conseguimos informar qual a probabilidade de uma variável ter realização menor ou igual a esse ponto, então temos informações de como está distribuída a probabilidade da variável. Essa função especial ajuda a caracterizar a variável e é chamada de Função de Distribuição Acumulada, ou distribuição apenas.

Definição 2.5. *Sejam Ω um espaço amostral, P uma medida de probabilidade e X uma variável aleatória. A função $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função de distribuição acumulada para X se, e somente se,*

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Uma consequência imediata da definição é que se P_X é a medida do espaço induzido por X , então

$$F(x) = P_X((-\infty, x]).$$

Outros fatos devem ser satisfeitos para determinada função ser uma distribuição. Primeiro, ela deve ser limitada superiormente por 1 e inferiormente por 0, já que são os valores máximo e mínimo de probabilidade que um ponto pode assumir. Pelo princípio

de que $A \subset B$ implica $P(A) \leq P(B)$, então se $x < y$, teríamos $P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$, e a distribuição é monótona. Por fim, se a partir de um ponto x nos aproximamos de um ponto a pela direita, então estamos aproximando o evento $(-\infty, x]$ do evento $(-\infty, a]$, o que significa que essa a distribuição acumulada deve ser contínua à direita, visto que o primeiro evento inclui o segundo.

Teorema 2.2. *Se $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função de distribuição acumulada de uma variável aleatória X , então*

$$1. \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, (x_1 \leq x_2 \rightarrow F(x_1) \leq F(x_2))$$

$$2. \forall x, a \in \mathbb{R}, (\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a))$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

Demonstração. A afirmação (1) segue do fato de que, se $x_1 \leq x_2$, então

$$(X \leq x_1) \subset (X \leq x_2),$$

e pelo Teorema 1.3,

$$P(X \leq x_1) \leq P(X \leq x_2) \implies F(x_1) \leq F(x_2).$$

Seguindo para a afirmação (2),

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} P(X \leq x)$$

Se x decresce até a , então os eventos $\{X \leq x\}$, para $x > a$, formam uma sequência decrescente de eventos cuja interseção é $\{X \leq a\}$. Pela continuidade de probabilidades, temos que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} P(X \leq x) = P\left(\lim_{x \rightarrow a^+} X \leq x\right) = P(X \leq a) = F(a)$$

Para as afirmações (3) e (4), considere a sequência de intervalos encaixados

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots$$

com extremos inferiores e superiores a_i e b_i respectivamente com $i \in \mathbb{N}$. Os eventos $\{X \leq b_i\}$ formam uma sequência crescente de eventos encaixados tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{X \leq b_n\} = \{X \leq \infty\}$$

Novamente, pela continuidade da probabilidade,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} P(X \leq x) = P(X \leq \infty) = P(\mathbb{R}) = 1$$

O mesmo argumento é replicável para (4): a sequência de eventos $\{X \leq a_i\}$ converge para $\{X \leq -\infty\}$, de sorte que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} P(X \leq x) = P(X \leq -\infty) = P(\emptyset) = 0$$

■

Portanto, o Teorema 2.2 garante que há uma medida induzida de Steljes para a distribuição F (ver Definição 1.13). Sendo μ_F a medida de Steljes induzida por F , então essa equivale a medida imagem P_X .

Proposição 2.2. *Se X é variável aleatória e μ_F é a medida de Steljes induzida por F , então $P_X = \mu_F$.*

Demonstração. Para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$, temos

$$(-\infty, a] \cup (a, b] = (-\infty, b] \quad (-\infty, a] \cap (a, b] = \emptyset$$

e por σ -aditividade

$$\begin{aligned} P_X((-\infty, a]) + P_X((a, b]) &= P_X((-\infty, b]) \\ P_X((a, b]) &= P_X((-\infty, b]) - P_X((-\infty, a]) \\ P_X((a, b]) &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Logo,

$$P_X((a, b]) = \mu_F((a, b])$$

■

2.3 Variáveis Aleatórias Discretas

Definição 2.6. *Se X é uma variável aleatória, então X é discreta se, e somente se, existe um conjunto $S \subset \mathbb{R}$ enumerável tal que*

$$P(X \in S) = 1$$

Sob essa definição, existe um conjunto enumerável de valores cujas probabilidades pontuais são suficiente para obter a probabilidade total do espaço de probabilidade. Como vimos no Teorema 2.1, com o suporte reunindo os valores possíveis da variável, então os valores pontuais que acumulam massas de probabilidade devem estar todos reunidos nele. Isso sugere que o suporte é possivelmente um conjunto enumerável, o que é provado no Teorema a seguir.

Proposição 2.3. *O suporte Ω_X de uma variável aleatória X é enumerável se, e somente se, X é discreta.*

Demonstração. Sendo Ω_X enumerável, então pelo Teorema 2.1 segue que X é discreta. Por outro lado, supondo X discreta, então seja S tal que $P_X(S) = 1$. Sendo $x \in \Omega_X$, então

$$\forall \epsilon > 0, P(|X - x| < \epsilon) > 0$$

mas se $x \notin S$, segue da Proposição 2.1 que

$$\forall \epsilon > 0, S \cap (x - \epsilon, x + \epsilon) \neq \emptyset,$$

concluindo-se que todo ponto em $\Omega_X \setminus S$ é de acumulação em S . Definamos

$$A = S \cup \{x \in \mathbb{R} \setminus S \mid x \text{ é ponto de acumulação de } S\}$$

donde teremos $\Omega_X \subset A$. Como S é enumerável, então o conjunto de seus pontos de acumulação também será, assim como A . Uma vez que Ω_X é subconjunto de um enumerável, então ele próprio é enumerável. ■

Proposição 2.4. *Toda variável discreta X com medida induzida P_X admite uma função $p_X \in L^1(\mu)$ com contradomínio em $[0, 1]$ satisfazendo*

$$p_X = \frac{d}{d\mu}P_X \iff P_X(A) = \sum_{x \in A} p_X(x)$$

onde μ é a medida de contagem.

Demonstração. A medida de contagem, pelo Teorema 1.4, é σ -finita. Ademais,

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu(B) = 0 \iff B = \emptyset,$$

implicando que P_X é absolutamente contínua em relação a μ pela Definição 1.11. Pelo Teorema de Radon-Nikodym, segue que existe $p_X \in L^1(\mu)$ tal que

$$p_X = \frac{d}{d\mu}P_X \iff P_X = \int p_X d\mu$$

o que equivale a, pelo Teorema 1.13,

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X(A) = \sum_{x \in A} p_X(x).$$

Uma vez que para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se $0 < P(X = x) < 1$, e

$$P(X = x) = P_X(\{x\}) = \sum_{a \in \{x\}} p_X(a) = p_X(x)$$

então $p_X \in [0, 1]$. ■

Temos então que toda a massa de probabilidade de realizações de uma variável discreta está concentrada num conjunto enumerável de pontos. Para essas variáveis será garantida a existência de uma função que associa a cada um desses a probabilidade concentrada nele. A essa função damos o nome de **função de massa de probabilidade**.

Definição 2.7. *Seja $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma v.a. discreta. A função $p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ é a função de massa de probabilidade de X se, e somente se,*

$$P(X = x) = p_X(x)$$

Enunciemos agora como obter a distribuição F de uma variável aleatória discreta.

Proposição 2.5. *Se $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma v.a. discreta com função de massa igual a p_X e suporte Ω_X , então a distribuição de X é*

$$F_X(x) = \sum_{\substack{a \in \Omega_X \\ a \leq x}} p_X(a)$$

Demonstração. Suponha $A = \{a \in \Omega_X \mid a \leq x\}$ e $I = (-\infty, x]$. Observe que,

$$P(X \leq x) = P(X \in I)$$

e como $A \subset I$, então por σ -aditividade,

$$P(X \leq x) = P(X \in A) + P(X \in I \setminus A)$$

Suponha por contradição que $P(X \in I \setminus A) \neq 0$, e pela proposição 2.1, $(I \setminus A) \cap \Omega_X \neq \emptyset$, o que equivale a

$$I \cap (\Omega_X \setminus A) \neq \emptyset$$

mas $\Omega_X \setminus A = \{a \in \Omega_X \mid a > x\}$, o que contradiz a hipótese anterior. Portanto,

$$P(X \leq x) = P(X \in A),$$

e pela Proposição 2.4,

$$F_X(x) = \sum_{x \in A} p_X(x),$$

que equivale a

$$F_X(x) = \sum_{\substack{a \in \Omega_X \\ a \leq x}} p_X(a).$$

■

Com isso, se $S = \{x \in \mathbb{R} \mid p_X(x) > 0\} \subseteq \Omega_X$, então seja $\{x_i\}_{\mathbb{N}}$ uma ordenação de S de tal modo

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < x_1 \\ F(x_1), & \text{se } x_1 \leq x < x_2 \\ \vdots & \\ F(x_i), & \text{se } x_i \leq x < x_{i+1} \\ \vdots & \end{cases}.$$

A função F é, pois, uma função constante por partes que sempre incluem a extremidade esquerda de seu domínio devido à propriedade necessária de uma distribuição sempre ser contínua à direita. Uma vez que

$$\begin{aligned} P(X = x_i) &= P(X \leq x_i) - P(X < x_i) \\ P(X = x_i) &= F(x_i) - \lim_{x \rightarrow x_i^-} F(x) \\ P(X = x_i) &= F(x_i) - F(x_{i-1}), \end{aligned}$$

então $p_X(x_i)$ é o salto entre duas partes consecutivas da distribuição de X .

2.4 Variáveis Aleatórias Contínuas

Variáveis aleatórias discretas caracterizam-se por uma lista enumerável de pontos concentrarem massas de probabilidades. Outrossim, variáveis aleatórias contínuas são aquelas em que nenhum ponto real acumula qualquer massa de probabilidade, estando essa distribuída ao longo de suas vizinhanças. Formalmente, teremos que qualquer conjunto de pontos de medida nula (como pontos contáveis) terá probabilidade desprezível, caracterizando a medida de probabilidade da variável como absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue (ver Definição 1.11).

Definição 2.8. *A variável aleatória X será contínua se $P_X \ll \lambda$.*

O Teorema de Radon-Nikodym garante a existência de uma função especial – mensurável, não negativa e Lebesgue-integrável – associada a medida de probabilidade induzida P_X de X .

Proposição 2.6. *Toda variável aleatória contínua X admite uma função real mensurável não negativa $f \in L^1(\lambda)$ tal que*

$$f = \frac{d}{d\lambda} P_X$$

Demonstração. Se X é contínua, então $P_X \ll \lambda$. Como λ é σ -finita, então pelo Teorema de Radon-Nikodym existe $f \in L^1(\lambda)$ não negativa tal que

$$f = \frac{d}{d\lambda} P_X$$

■

Se interpretarmos a probabilidade como uma massa distribuída em espaço (neste caso, em $\mathbb{R}$) e que quanto maior a extensão do intervalo avaliado, maior a probabilidade da variável assumir realizações nele, então podemos interpretar a função f como uma **densidade** de probabilidade.

Definição 2.9. *Seja X uma variável aleatória contínua com medida induzida P_X . A função f que satisfaz*

$$f = \frac{d}{d\lambda} P_X \iff P_X = \int f d\lambda$$

é chamada de densidade de probabilidade de X .

A função de densidade pode ser então usada para medir a probabilidade de uma variável contínua assumir realizações num intervalo de valores reais. Isso é feito avaliando a integral da função sobre o intervalo desejado. A relação mais direta entre as funções de distribuição e de densidade é dada pela Proposição a seguir.

Proposição 2.7. *Se X é uma variável contínua com densidade f e distribuição F , então*

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Demonstração.

$$F(x) = P_X((-\infty, x]) = \int_{(-\infty, x]} f d\lambda = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

■

A distribuições de variáveis discretas tem a forma de uma função constante por partes, pois entre um ponto e outro temos um “salto” que representa a probabilidade acumulada por um dos pontos. Em contraste, como para variáveis contínuas nenhum ponto acumula massa de probabilidade, a sua distribuição deve variar suavemente ao longo de qualquer intervalo, ou de maneira mais forte, em qualquer conjunto disjunto de intervalo Isso caracteriza a distribuição como absolutamente contínua (ver Definição 1.3).

Proposição 2.8. *A variável X é contínua se, e somente se, sua distribuição F é absolutamente contínua.*

Demonstração. Supondo que X é contínua, então $P_X \ll \lambda$. Pela Proposição 2.2 e pelo Teorema 1.6, concluiremos que F é absolutamente contínua. Por outro lado, se F é absolutamente contínua, então $\mu_F = P_X \ll \lambda$ e, por definição, a variável X será contínua. ■

Como qualquer conjunto de pontos isolados terá probabilidade nula, então é intuitivo pensar que o intervalo $(a, b]$ terá a mesma probabilidade do que (a, b) . A formalização dessas ideias é dada pelo Teorema a seguir.

Teorema 2.3. *Se X é uma variável aleatória contínua com densidade f , então para todo $x, a, b \in \mathbb{R}$*

$$i. P(a < X \leq b) = \int_a^b f(t) dt$$

$$ii. P(X = x) = 0$$

$$iii. P(X \leq x) = P(X < x)$$

$$iv. P(X \geq x) = P(X > x)$$

Demonstração.

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

e pela Proposição 2.7

$$P(a < X \leq b) = \int_{-\infty}^b f(t) dt - \int_{-\infty}^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

provando (i).

Observemos agora que

$$\lambda(\{x\}) = 0 \implies \int_{\{x\}} f d\lambda = 0 \implies P(X = x) = 0$$

provando (ii).

Uma vez que

$$P(X \leq x) = P(X = x) + P(X < x) \quad \text{e} \quad P(X \geq x) = P(X = x) + P(X > x)$$

então (iii) e (iv) são consequências de (ii). ■

Proposição 2.9. *Se X é uma variável aleatória contínua com densidade f e suporte Ω_X , então*

$$\int_{\Omega_X} f \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} f \, d\lambda = 1$$

Demonstração. Com efeito,

$$P_X(\Omega_X) = 1 \implies \int_{\Omega_X} f \, d\lambda = 1.$$

Ademais, se $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$ é o espaço de probabilidade induzido por X , então

$$P_X(\mathbb{R}) = P(\Omega) = 1 \implies \int_{\mathbb{R}} f \, d\lambda = 1$$

■

Proposição 2.10. *Se X é uma variável contínua com densidade f e suporte Ω_X , então*

$$f = 0 \quad \text{q.s. em } \mathbb{R} \setminus \Omega_X$$

Demonstração. Seja $A = \mathbb{R} \setminus \Omega_X$. Observe que

$$\int_A f \, d\lambda + \int_{\Omega_X} f \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} f \, d\lambda$$

e pela Proposição 2.9, conclui-se

$$\int_A f \, d\lambda = 0.$$

Como uma função de densidade é mensurável e não negativa, então por nulidade da integral de Lebesgue, obtém-se que $f = 0$ q.s. em A . ■

Lema 2.1. *Seja X variável contínua com densidade f e suporte Ω_X . Se f é contínua em $x \in \mathbb{R}$, então $x \in \Omega_X$.*

Demonstração. Suponha que $0 < \epsilon < f(x)$. Por continuidade em x , existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall a \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

Suponha por contradição que $x \notin \Omega_X$. Com efeito, exista uma vizinhança $V = (x - \nu, x + \nu)$, com $\nu > 0$ tal que $P(X \in V) = 0$, que equivale a $f = 0$ q.s. em V . Existe, pois, $y \in V$ tal que

$$|x - y| < \delta \quad \text{e} \quad f(y) = 0$$

de modo que

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon \implies |f(x)| < \epsilon,$$

e sendo f densidade, $f > 0$ e $|f(x)| = f(x)$. Por conseguinte,

$$f(x) < \epsilon$$

contradizendo a afirmação que $\epsilon < f(x)$. Conclui-se que $x \in \Omega_X$. ■

Teorema 2.4. *Se X é variável aleatória com densidade f contínua em*

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}$$

então

$$\Omega_X = \overline{\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}}$$

Demonstração. Seja

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}.$$

Mostremos que $\Omega_X \subset \overline{E}$. Para tanto, suponha que $x \notin \overline{E}$. Existe, então, vizinhança $V = (x - \delta, x + \delta)$, com $\delta > 0$, tal que

$$V \cap E = \emptyset$$

Então para todo $a \in V$, $f(a) = 0$, o que equivale a dizer que $f = 0$ q.s. em V . Por consequência, $P(X \in V) = 0$, e $x \notin \Omega_X$.

Demonstremos agora que $\overline{E} \subset \Omega_X$. Do Lema 2.1, temos que $E \subset \Omega_X$. Resta mostrar que todo ponto de acumulação $x \notin E$ é membro de Ω_X . Se $x \in \overline{E}$, então

$$\forall \nu > 0, (x - \nu, x + \nu) \cap E \neq \emptyset.$$

Isso equivale a dizer que para toda vizinhança V de x contém pelo menos um ponto com densidade positiva e, por consequência do Lema 2.1, que é membro do suporte. Se tivéssemos $x \notin \Omega_X$, então haveria uma vizinhança U centrada em x tal que $P(X \in U) = 0$, e teríamos

$$\forall a \in U, a \notin \Omega_X$$

contradizendo a afirmação que toda vizinhança de x tem um membro do suporte. Portanto, $\overline{E} \subset \Omega_X$. ■

2.5 Transformações

Definição 2.10. *Uma transformação de uma variável aleatória X é toda função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.*

Em experimentos aleatórios, comumente defini-se variáveis aleatórias a partir de outras variáveis. Dizemos então que a variável derivada é obtida por uma transformação da variável original, consistindo da composição de uma função real mensurável, essa que, pelo Teorema 1.5, também será mensurável, sendo, então, uma variável aleatória.

Definição 2.11. *Seja X uma variável aleatória. Se g for uma transformação mensurável, então $g(X)$ é a variável aleatória definida por $g \circ X$.*

Da nossa definição, a probabilidade de uma variável $g(X)$ assumir valores num conjunto A deve ser o mesmo da imagem de valores de g aplicada sobre realizações de X pertencerem a A . De outro modo, podemos dizer que $P(g(X) \in A)$ é igual a probabilidade da pré-imagem de g em relação a A .

Proposição 2.11. *Se X é uma variável aleatória e g uma transformação mensurável, então*

$$P_X(g(X) \in A) = P(X \in g^{-1}(A))$$

Demonstração.

$$\begin{aligned} P_X(g(X) \in A) &= P_X(\{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \in A\}) \\ &= P(X \in g^{-1}(A)) \end{aligned}$$

■

Com essa proposição, uma transformação induz um novo espaço de probabilidade $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_g)$ onde

$$P_g(A) = P_X(g^{-1}(A)) = P(X \in g^{-1}(A))$$

2.5.1 Transformação de Variáveis Discretas

Teorema 2.5. *Seja X uma variável discreta com suporte Ω_X , função de massa igual a p_X e g uma transformação mensurável de X tal que $Y = g(X)$. A variável Y é discreta e sua função de massa é dada por*

$$p_Y(y) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} p_X(x)$$

Demonstração. Para Y ser discreto, seu suporte Ω_Y deve ser enumerável. Da Proposição 2.11 sabemos que

$$P_Y(A) > 0 \Leftrightarrow P(X \in g^{-1}(A)) > 0,$$

e pela Proposição 2.1,

$$g^{-1}(A) \cap \Omega_X \neq \emptyset.$$

donde segue

$$\forall y \in \Omega_Y \exists x \in \Omega_X, (g(x) = y \wedge y \in A)$$

Logo, Ω_Y é a imagem de Ω_X sobre g , sendo, pois, enumerável.

Para a afirmação sobre a função de massa de Y , a Proposição 2.11 mostra que

$$p_Y(y) = P_X(Y = y) = P(X \in g^{-1}(y)),$$

e, pelo Lema

$$p_Y(y) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} p_X(x).$$

■

2.5.2 Transformação de Variáveis Contínuas

Para transformações de variáveis contínuas, concentramos-nos, primeiramente, nas transformações monótonas, pois essas compõem uma classe mais fácil de se analisar.

Teorema 2.6. *Seja X uma variável aleatória contínua com distribuição F_X e suporte Ω_X . Seja também $Y = g(X)$ com suporte Ω_Y , em que g é uma transformação monótona. Se g for crescente, então*

$$F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)).$$

Caso contrário,

$$F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y)).$$

Demonstração. Com efeito, da Proposição 2.11 segue que,

$$F_Y(y) = P_X(Y \leq y) = P(X \leq g^{-1}((-\infty, y])).$$

A função g^{-1} tem a mesma monotonicidade de g . Se g for crescente, então

$$\{X \in g^{-1}((-\infty, y])\} = \{X \leq g^{-1}(y)\}$$

implicando em

$$F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)).$$

Se g for decrescente, obtém-se

$$\{X \in g^{-1}((-\infty, y])\} = \{X \geq g^{-1}(y)\}$$

e

$$F_Y(y) = P(X \geq g^{-1}(y))$$

mas pelo Teorema 2.3,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X > g^{-1}(y)) \\ &= 1 - P(X \leq g^{-1}(y)) \\ &= 1 - F_X(g^{-1}(y)) \end{aligned}$$

■

Por sua vez, a densidade de transformações $Y = g(X)$ em casos em que a densidade de X é contínua, pode ser obtidas via a Regra da Cadeia do Cálculo Diferencial, com a condição de que a inversa de g seja também contínua em Ω_Y . Caso a densidade de X nem a inversa da transformação sejam contínuas em Ω_X e Ω_Y respectivamente, a regra da cadeia não poderia ser aplicada, complexificando a determinação da densidade de Y .

Teorema 2.7. *Seja X uma variável aleatória com f.d.p. igual a f_X . Seja $Y = g(X)$ uma variável obtida pela transformação g e com suporte Ω_Y . Se g é monótona, f_X é contínua em Ω_X e g^{-1} tem derivada contínua em Ω_Y , então a densidade f_Y de Y é dada por*

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|, & \text{se } y \in \Omega_Y \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Demonstração. Do Teorema 1.18,

$$f_Y(y) = F'_Y(y) \text{ q.s.}$$

Se g é crescente, então

$$F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$$

e, por consequência,

$$f_Y(y) = [F_X(g^{-1}(y))]' \text{ q.s.}$$

Por hipótese, g^{-1} ter derivada contínua em Ω_Y implica que g^{-1} é contínua em Ω_Y . Ademais, toda distribuição é absolutamente contínua. Pela Regra da Cadeia, obtemos então

$$f_Y(y) = F'_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \text{ q.s. se } y \in \Omega_Y$$

Por outro lado, se g é decrescente, então por um desenvolvimento análogo chega-se a

$$f_Y(y) = -F'_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \text{ q.s. se } y \in \Omega_Y$$

Como $\frac{d}{dy}g^{-1} \leq 0$ nesse caso, então podemos sintetizar esse e o caso anterior em

$$f_Y(y) = F'_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \right| \text{ q.s. se } y \in \Omega_Y$$

Se $y \in \Omega_Y \implies g^{-1}(y) \in \Omega_X$ e f_X é contínua em Ω_X por hipótese, então f_X é contínua em $g^{-1}(y)$. Além disso, pela hipótese de g^{-1} ter derivada contínua em Ω_Y , então f_Y será contínua em Ω_Y , e pelo Teorema 1.19,

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy}g^{-1}(y) \right| \text{ se } y \in \Omega_Y$$

Se $y \notin \Omega_Y$, então, pelo Teorema 2.4, $f_Y(y) = 0$. ■

O teorema 2.7 permite-nos a generalizar a obtenção da densidade de probabilidade de transformações não monótonas que podem ser decompostas em partes monótonas. Um exemplo clássico é a função $g(x) = x^2$ definida em $\mathbb{R}$. Essa função não é monótona, porém suas partes definidas separadamente em $(-\infty, 0)$ e $[0, \infty)$ serão. A densidade da variável definida pela transformação poderá, portanto, ser obtida pelo resultado a seguir

Teorema 2.8. *Seja X uma variável aleatória com densidade igual a f_X contínua em Ω_X . Seja $Y = g(X)$ a variável obtida pela transformação g e com suporte Ω_Y . Se Ω_X admite uma partição em intervalos $\{A_i\}_{i=1}^n$ que torne possível definir a família de funções $\{g_i : A_i \rightarrow \mathbb{R}\}_{i=1}^n$ tal que*

$$i \quad g_i(x) = g(x)$$

$$ii \quad g_i(x) \text{ é monótona em } A_i$$

$$iii \quad g_i(A_i) = \Omega_Y \text{ para todo } i \in [n].$$

iv g_i^{-1} tem derivada contínua em Ω_Y para todo $i \in [n]$.

então a densidade f_Y de Y é dada por

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n f_X(g_i^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g_i^{-1}(y) \right|, & \text{se } y \in \Omega_Y \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Demonstração. Com efeito, $f_Y = F'_Y$ e também

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq g^{-1}((-\infty, y]))$$

Mas pelo Teorema de Probabilidade Total,

$$F_Y(y) = \sum_{i=1}^n P(X \leq g^{-1}((-\infty, y]) \mid X \in A_i) \cdot P(X \in A_i)$$

e tomando $f(y) = F'_Y(y)$ q.s. ,

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dy} F_X(g_i^{-1}(y)) + \sum_{i=1}^n \frac{d}{dy} P(X \in A_i) \text{ q.s.}$$

como $P(X \in A_i)$ não depende de y , $\frac{d}{dy} P(X \in A_i) = 0$ para todo $i \in [n]$. Além disso, pela hipótese (iv.) e o fato de que F_X é absolutamente contínua, se $y \in \Omega_Y$, então a equação $F_X(g_i^{-1}(y))$ será contínua em y . Da Regra da Cadeia obtemos,

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^n f_X(g_i^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g_i^{-1}(y) \right| \text{ q.s. se } y \in \Omega_Y$$

Pelos Teoremas 1.19 e 2.7, seguirá então,

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^n f_X(g_i^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g_i^{-1}(y) \right| \text{ se } y \in \Omega_Y$$

Noutro caso de $y \notin \Omega_Y$, o Teorema 2.4 implicará que $f_Y(y) = 0$. ■

2.6 Esperança e Momentos

A esperança de uma variável aleatória representa uma medida de centralidade dos valores dessa variável. Intuitivamente, ela é obtida ponderando-se os valores possíveis da variável por suas respectivas probabilidades, sumarizando a sua imagem a um único valor central. Na linguagem de medida, a definição formal da esperança é dada a seguir.

Definição 2.12. *Seja X uma variável aleatória e $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ espaço de probabilidade. Defini-se esperança de X , ou valor esperado, denotada por $E[X]$, como*

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP$$

Podemos obter o valor esperado de uma transformação de uma variável aleatória ponderando os valores da transformação pelas próprias probabilidades de suas respectivas pré-imagens, em vez da probabilidade dos valores em si, o que é útil quando não conhecemos em detalhes a distribuição de probabilidade da variável obtida pela transformação.

Teorema 2.9. *Seja X variável aleatória e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma transformação mensurável. A esperança da variável $g(X)$ é dada por*

$$E[g(X)] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx, & \text{se } X \text{ é contínua} \\ \sum_{x \in \Omega_X} g(x)P(X = x), & \text{se } X \text{ é discreta} \end{cases}$$

Demonstração. Considere o espaço de medida $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, tal que $g(X) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e

$$E[g(X)] = \int_{\Omega} g(X) dP$$

mas pelo Teorema 1.20, uma vez que $g(X) = g \circ X$, então

$$E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_x$$

Se X for contínua, então $f(x) = \frac{d}{d\lambda} P_X$ é densidade de X e fazendo a substituição $dP_X = f(x)d\lambda$, obtemos

$$E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)f(x) d\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$$

Por outro lado, se X for discreta, então, pela Proposição 2.4, $p_X(x) = \frac{d}{d\mu} P_X$ é a função de massa de X , onde μ é medida de contagem, e fazendo a substituição $dP_X = p_X d\mu$, obtemos

$$E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)p_X(x) d\mu = \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega_X} g(x)p_X(x) d\mu + \int_{\Omega_X} g(x)p_X(x) d\mu$$

onde Ω_X é o suporte de X . Uma vez que,

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x \notin \Omega_X \rightarrow p_X(x) = 0)$$

então

$$E[g(X)] = \int_{\Omega_X} g(x)p_X(x) d\mu$$

e, pelo Teorema 1.13,

$$E[g(X)] = \sum_{x \in \Omega_X} g(x)p_X(x)$$

■

O Teorema a seguir enuncia quatro propriedades da esperança enquanto um operador: linearidade, positividade, monotonicidade e preservação de limites. Esse resultado serve como base de cálculos utilizando-se o operador de valor esperado.

Teorema 2.10. *Seja X variável aleatória, e g_1 e g_2 transformações mensuráveis. O operador de esperança satisfaz:*

1. $E[ag_1(X) + bg_2(X)] = aE[g_1(X)] + bE[g_2(X)]$
2. $\forall x \in \Omega_X, (g_1(x) \geq 0) \rightarrow E[g_1(X)] \geq 0$
3. $\forall x \in \Omega_X, (g_1(x) \geq g_2(x)) \rightarrow E[g_1(X)] \geq E[g_2(X)]$

$$4. \forall x \in \Omega_X, (a \leq g_1(x) \leq b) \rightarrow a \leq E[g_1(X)] \leq b$$

Demonstração. A propriedade 1 segue da linearidade dos operadores de integral, no caso contínuo, e de somatório no caso discreto. A propriedade 2 advém da nulidade para o contínuo e do fechamento dos reais não negativos sob adição nos discretos. As propriedades 3 e 4 vêm da monotonicidade das integrais e da propriedade aditiva das desigualdades. ■

Os momentos de uma variável aleatória medem diferentes aspectos da distribuição dela. A intuição advém da mecânica, em que os momentos de massa descrevem como a massa de um sistema está distribuída entorno de um ponto. Analogamente, os momentos descrevem como a probabilidade dos valores da variável estão distribuídos.

Definição 2.13. *Seja $n \in \mathbb{N}$ e X variável aleatória com esperança μ . O n -ésimo momento de X , denotado $m_n(\mu)$, é definido como*

$$m_n(\mu)' = E[X^n]$$

O n -ésimo momento central, denotado $m_n(\mu)$, é dado por

$$m_n(\mu) = E[(X - \mu)^n]$$

onde $\mu = E[X]$.

Cada valor de n determina um momento de uma variável, de forma que os dois primeiros possuem interpretações intuitivas:

- O primeiro momento é o “centro de massa” da distribuição, consistindo no próprio valor esperado da variável.
- O segundo é a “inércia” da variável, medindo o quão dispersos estão os seus valores. Valores altos recebem pesos maiores do que os mais próximos da origem, tal modo que um pequeno segundo momento diz que as realizações estão concentradas na origem, enquanto um alto segundo momento diz que eles estão dispersos entorno dela.

Os momentos centrais descrevem a distribuição da variável entorno de seu centro de massa, ou seja, do seu valor esperado:

- O segundo momento central mede o quão dispersos os valores estão em relação ao valor esperado.
- O terceiro momento, por preservar o sinal, descreve a direção em que os valores se concentram em relação ao valores esperado: caso seja à esquerda, então ele será negativo; se à direita, então positivo; e caso a distribuição seja aproximadamente simétrica, então ele estará próximo de zero.
- O quarto momento central explica a distribuição de valores extremos, pois esses recebem pesos muito maiores do que valores mais próximos da esperança.

Na análise estatística, os principais momentos centrais usados para explicar uma variável aleatória são o segundo, terceiro e quarto, os quais podem ser normalizados – com exceção do segundo – para criarem medidas descritivas.

Definição 2.14. *Se X uma variável aleatória com esperança μ , então estão definidos:*

1. *Variância:* $\text{Var}(X) = m_2(\mu)$
2. *Desvio-padrão:* $\text{dp}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$
3. *Assimetria:* $\frac{m_3(\mu)}{\text{dp}(X)^3}$
4. *Curtose:* $\frac{m_4(\mu)}{\text{dp}(X)^4} - 3$

A variância – e, por consequência, o desvio-padrão – é rotineiramente usado com mais frequência junto da esperança para descrever distribuições. Assim como o caso da esperança, nos é útil conhecer algumas propriedades da variância enquanto um operador para fins de cálculos.

Teorema 2.11. *Seja X variável aleatória com esperança μ e $a \in \mathbb{R}$. Vale que*

1. $\text{Var}(X) = E[X]^2 - \mu^2$
2. $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$
3. $\text{Var}(X + a) = \text{Var}(X)$

Demonstração. Com efeito, do Teorema 2.10 segue que

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[(X - \mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2X\mu + \mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[X]^2 - \mu^2 \end{aligned}$$

provando 1. Usando isso para 2,

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX) &= E[(aX)^2] - E[aX]^2 \\ &= E[a^2 X^2] - E[aX] \cdot E[aX] \\ &= a^2 E[X^2] - a^2 E[X]^2 \\ &= a^2 \text{Var}(X) \end{aligned}$$

E a aquela ainda pode ser usada para obter 3:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X + a) &= E[(X + a)^2] - E[X + a]^2 \\ &= E[X^2] + 2aE[X] + a^2 - (E[X] + a)(E[X] + a) \\ &= E[X^2] + 2aE[X] + a^2 - E[X]^2 - 2aE[X] - a^2 \\ &= E[X^2] - E[X]^2 \\ &= \text{Var}(X) \end{aligned}$$

■

Uma transformação aplicável a variáveis aleatórias é aquela que subtrai a mede e divide o resultado pelo desvio-padrão, conhecida como **padronização**. O destaque para ela justifica-se pelo fato de que a variável resultante sempre terá valor esperado igual a 0 e desvio-padrão igual a 1, o que é provado na Proposição 2.12. Esse resultado é especialmente útil quando temos um conjunto de várias variáveis e queremos tratá-las na mesma escala.

Proposição 2.12. *Se X é uma variável aleatória com esperança μ e variância σ^2 , então a variável definida por*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

possui esperança 0 e variância 1.

Demonstração. Com efeito,

$$E[Z] = \frac{1}{\sigma} \cdot E[X] - \frac{\mu}{\sigma} = 0$$

enquanto que,

$$\text{Var}(Z) = E\left[\frac{(X - \mu)^2}{\sigma^2}\right] = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

■

As funções geradoras de momentos (mgf), como seu nome sugere, são usadas para obter os momentos de uma variável aleatória. No entanto, na prática, é mais razoável utilizar a própria definição de momento para fins de computação. A sua real utilidade está em oferecer uma forma de representar todos os momentos de uma variável enquanto uma função com poderosas propriedades teóricas.

Definição 2.15. *A função geradora de momentos (mgf) da variável X é*

$$M_X : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

caso o valor esperado exista para t numa vizinhança de 0. Caso contrário, dizemos que a mgf não existe.

A presença de uma exponencial no argumento do valor esperado na definição da mgf pode ser confusa a primeira vista. A razão disso é revalada na demonstração do Teorema 2.12, o qual enuncia como obter os momentos por meio da mgf: avaliando a derivada de ordem n do gerador de momentos em torno de $t = 0$.

Teorema 2.12. *Se X uma variável aleatória cuja mgf existe, então*

$$E[X^n] = \left. \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \right|_{t=0}.$$

Demonstração. Se $f(x)$ é a função de densidade de X , então

$$\left. \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \right|_{t=0} = \left. \frac{d^n}{dt^n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \right|_{t=0}$$

Usando a Regra de Leibniz, que permite diferenciar sobre o sinal de integral,

$$\left. \frac{d^n}{dt^n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \right|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{tx} f(x) dx \Big|_{t=0}.$$

Uma vez que

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{tx} = x^n e^{tx},$$

então

$$\left. \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \right|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{tx} f(x) dx \Big|_{t=0} = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x) dx = E[X^n]$$

■

O próximo resultado diz como obter a mgf de uma variável obtida por transformação afim de uma outra.

Proposição 2.13. *Se X e Y é uma variável aleatória tal que $Y = aX + b$, com a e b reais, então*

$$M_Y(t) = e^{bt} M_X(at)$$

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= E[e^{ty}] \\ &= E[e^{(at)x} \cdot e^{tb}] \\ &= e^{tb} \cdot E[e^{(at)x}] \\ &= e^{tb} \cdot M_X(at) \end{aligned}$$

■

Apesar de serem usados para descrever distribuições de variáveis aleatórias, momentos não necessariamente as definem. Em outras palavras, embora duas variáveis possuam a mesma sequência de momentos, não necessariamente elas possuem a mesma distribuição. O Teorema 2.13 estabelece algumas condições para que sequências de momentos idênticos permitam dizer que estamos tratando das mesmas distribuições.

Teorema 2.13. *Sejam X e Y variáveis aleatórias com distribuições $F_X(x)$ e $F_Y(y)$ cujos momentos existem. Valem as seguintes afirmações:*

1. *Se os suportes das variáveis são limitados, $F_X(u) = F_Y(u)$ para todo $u \in \mathbb{R}$ se, e somente se, $E[X^r] = E[Y^r]$ para todo inteiro r não negativo.*
2. *Se as funções geradoras de momentos das variáveis existem e $M_X(t) = M_Y(t)$ para todo t em uma vizinhança de 0, então $F_X(u) = F_Y(u)$ para todo $u \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Sejam f_x e f_y as densidades de X e Y respectivamente. Utilizando-se a integração por partes para expressar $E[X^n]$,

$$E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} u^n f_X(u) du = u^n F_X(u) - n \int_{-\infty}^{\infty} u^{n-1} F_X(u) du$$

mas supondo que $F_X(u) = F_Y(u)$, então

$$E[X^n] = u^n F_Y(u) - n \int_{-\infty}^{\infty} u^{n-1} F_Y(u) du = \int_{-\infty}^{\infty} u^n f_Y(u) du = E[Y^n]$$

■

Aqui é que notamos a utilidade das funções geradoras de momentos: apesar de uma sequência de momentos não ser suficiente para caracterizar uma distribuição, a convergência de geradores de momentos permite afirmar a convergência de uma distribuição.

Teorema 2.14. *Seja $(X_i)_{i=1}^n$ uma sequência de variáveis aleatórias com geradores de momentos $M_{X_i}(t)$ respectivamente. Se para todo t numa vizinhança de 0 é satisfeito que*

$$\lim_{i \rightarrow \infty} M_{X_i}(t) = M_X(t)$$

então há uma única distribuição $F_X(x)$ tal que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} F_{X_i}(x) = F_X(x)$$

A demonstração desse Teorema está fora do escopo deste texto, pois ela baseia-se no fato de que $M_X(t)$ é Transformada de Laplace de uma única função de densidade $f(x)$. Também seria necessário mostrar que, dada a convergência das transformadas, as densidades das variáveis envolvidas satisfazem determinadas hipóteses de continuidade e convergência, as quais permitem dizer que as próprias densidades convergem para a mesma função $f(x)$.

2.7 Simetria

Definição 2.16. *Uma variável X possui distribuição simétrica entorno de $x = m$ se, e somente se,*

$$\forall t \in \mathbb{R}, P(X - m \leq t) = 1 - P(X - m < -t)$$

Observação 2.1. *Se fizémos $t = -u$, então*

$$P(X - m \leq -u) = 1 - P(X - m < u) \quad (2.1)$$

para todo $u \in \mathbb{R}$. Logo, a expressão 2.1 é uma formulação equivalente para a definição 2.16.

Observação 2.2. *Se X for variável contínua, então a definição de simetria equivale a*

$$\begin{aligned} P(X - m \leq t) &= 1 - P(X - m \leq -t) \\ F_X(m + t) &= 1 - F_X(m - t) \end{aligned}$$

Proposição 2.14. *Se X é uma variável com distribuição simétrica entorno de m , então*

$$P(X \leq m) = P(X \geq m).$$

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned}
 P(X - m \leq 0) &= 1 - P(X - m < 0) \\
 P(X \leq m) &= 1 - P(X < m) \\
 P(X \leq m) - [1 - P(X < m)] &= 0 \\
 P(X \leq m) - P(X \geq m) &= 0 \\
 P(X \leq m) &= P(X \geq m)
 \end{aligned}$$

■

Definição 2.17. *A mediana m da distribuição de uma variável aleatória X satisfaz*

$$P(X \geq m) \geq \frac{1}{2} \quad e \quad P(X \leq m) \geq \frac{1}{2}$$

Proposição 2.15. *Se X possui distribuição simétrica entorno de m , então m é mediana da distribuição de X .*

Demonstração. Sabemos que

$$\begin{aligned}
 P(X \leq m) + P(X > m) &= 1 \\
 P(X \leq m) + P(X > m) + P(X = m) &= 1 + P(X = m) \\
 P(X \leq m) + P(X \geq m) &= 1 + P(X = m)
 \end{aligned}$$

mas pela Proposição 2.14

$$2P(X \leq m) = 1 + P(X = m)$$

Uma vez que $P(X = m) \geq 0$, então $1 + P(X = m) \geq 1$, e

$$\begin{aligned}
 2P(X \leq m) &\geq 1 \\
 P(X \leq m) &\geq \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Mais uma vez, pela Proposição 2.14,

$$P(X \geq m) \geq \frac{1}{2}$$

■

Teorema 2.15. *A variável X ter simetria entorno de m equivale a*

1. *Se X for discreta, então*

$$p_X(m + t) = p_X(m - t).$$

2. Se X for contínua, então

$$f_X(m+t) = f_X(m-t).$$

Demonstração. Suponha que X seja simétrica. Para provar 1, considere que

$$P(X-m \leq t) = P(X-m = t) + P(X-m < t)$$

mas, por simetria,

$$P(X-m \leq t) = 1 - P(X-m < -t)$$

de forma que

$$P(X-m = t) = 1 - [P(X-m < -t) + P(X-m < t)]$$

Analogamente, por σ -aditividade e simetria, iremos concluir que,

$$P(X-m = -t) = 1 - [P(X-m < -t) + P(X-m < t)]$$

Logo,

$$P(X-m = t) = P(X-m = -t)$$

e, como X é discreto, então

$$p_X(m+t) = p_X(m-t)$$

Para provar a afirmação 2, observe que

$$F_X(m+t) = 1 - F_X(m-t),$$

e como f_X é contínua em Ω_X , então fazendo $F_Y(y) = F_X(m+t)$ e $F_U(u) = F_X(m-t)$, obtemos

$$\frac{d}{dt}F_Y(y) = -\frac{d}{dt}F_U(u).$$

Já que $y = m+t$ e $u = m-t$, então pelo Teorema 2.7

$$f_X(m+t) = -[-f_X(m-t)] = f_X(m-t).$$

Agora suponha que as equações das afirmações 1 e 2 valem. Partindo de 1, temos que

$$P(X-m \leq -t) = \sum_{y \leq -t} P(X-m = y)$$

mas como para todo $t \in \mathbb{R}$ vale que $P(X-m = t) = P(X-m = -t)$, então

$$P(X-m \leq -t) = \sum_{y \leq -t} P(X-m = y) = \sum_{-y \geq t} P(X-m = -y) = P(X-m \geq t).$$

Uma vez que $P(X-m \geq t) = 1 - P(X-m < t)$, então

$$P(X-m \geq t) = 1 - P(X-m < t).$$

O que prova a simetria para o caso discreto. Direcionando agora para o caso contínuo, considere $Y = X - m$, de modo que $f_Y(y) = f_X(y + m)$. Com efeito

$$F_Y(Y \leq t) = \int_{-\infty}^t f_X(m + y) dy = 1 - \int_t^{\infty} f(m + y) dy.$$

mas supondo a afirmação 2, obtemos

$$F_Y(Y \leq t) = 1 - \int_t^{\infty} f(m - y) dy.$$

Fazendo a substituição $y = -u$ e invertendo os limites de integração ajustados à troca de variável, veremos que

$$F_Y(Y \leq t) = 1 - \int_{-\infty}^{-t} f(m + u) du$$

Fazendo outra troca de variável do tipo $u = w$, é possível concluir que

$$\begin{aligned} F_Y(Y \leq t) &= 1 - F_Y(Y \leq -t) \\ F_X(m + t) &= 1 - F_X(m - t) \end{aligned}$$

■

Corolário 2.1. *Se X tem distribuição simétrica entorno de m e com função de probabilidade – seja de massa ou densidade – $\pi(x)$, então*

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \leq m \leq x_2 \text{ e } \pi(x_1) = \pi(x_2) \rightarrow \frac{x_1 + x_2}{2} = m$$

Demonstração. Suponha que $x_1 = m - a$ e $x_2 = m + b$, logo

$$\pi(x_1) = \pi(m - a) = \pi(m + a)$$

mas, pela hipótese $\pi(x_1) = \pi(x_2)$, temos

$$\pi(m + a) = \pi(m + b).$$

Logo, $a = b$ e, por conseguinte,

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = m.$$

■

Definição 2.18. *A moda $\text{moda}(X)$ de uma variável aleatória X é o valor tal que*

1. *Se X é discreta, então*

$$\text{moda}(X) = \arg \max_x p_X(x)$$

2. *Se X for contínua, então*

$$\text{moda}(X) = \arg \max_x f_X(x)$$

Teorema 2.16. *Se X é uma variável aleatória cuja distribuição é simétrica entorno da mediana m , então*

1. *Se a distribuição é unimodal, então $m = \text{moda}(X)$.*
2. *Se $E[X] < \infty$, então $m = E[X]$.*

Demonstração. Seja p a função de massa de X discreta. Suponha que a moda esteja num valor x diferente de m , de modo que $x = m + a$ ou $x = m - a$. No entanto, por hipótese de simetria, do Teorema 2.15 segue que

$$p(m + a) = p(m - a),$$

implicando que a distribuição tem duas modas, logo não pode ser unimodal. O mesmo argumento é replicado para uma variável contínua substituindo a função p pela densidade f . Portanto, m é a moda da distribuição.

Consideremos agora a transformação $Y = X - m$, tal que

$$P_X(Y \leq t) = 1 - P_X(Y \leq -t)$$

$$P_X(Y \leq t) = P_X(Y \geq -t)$$

$$P_X(Y \leq t) = P_X(-Y \leq t),$$

indicando que Y e $-Y$ tem a mesma distribuição, logo, o mesmo valor esperado. Com efeito,

$$E[Y] = E[-Y]$$

$$E[X] - m = m - E[X]$$

$$E[X] = m.$$

■

Modelos de Distribuição de Probabilidade

Toda variável aleatória é caracterizada por uma distribuição F que contém zero ou mais parâmetros. As distribuições que contém os mesmos parâmetros compõem uma família de funções denominadas **modelos de distribuição de probabilidade**. Na estatística, esses modelos são usados para estudar diferentes tipos de populações de forma abrangente.

Neste capítulo, serão apresentados os principais modelos de distribuição usados na modelagem estatística, compreendendo modelos discretos, contínuos

3.1 Modelos Discretos

3.1.1 Distribuição Uniforme Discreta

O primeiro e mais simples modelo de distribuição discreto é a uniforme discreta. Ela modela experimentos onde a frequência de todos os resultados são iguais, ou seja, são equiprováveis. Se $(\Omega_X, \mathcal{A}, P_X)$ é equiprovável, então a função de massa de X é dada simplesmente por

$$p_X(x) = \frac{1}{|\Omega_X|}.$$

Definição 3.1. *A variável discreta X tem distribuição uniforme discreta se sua função de massa for dada por*

$$p_X(x) = \frac{1}{|\Omega_X|}$$

onde Ω_X é o seu suporte.

Exemplo 3.1. O número de caras obtidas em 1 lançamento tem dois resultados possíveis: 0 ou 1. Se a moeda é honesta, então

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

e X tem distribuição uniforme discreta.

Exemplo 3.2. Num dado honesto, as seis faces são equiprováveis de serem sorteadas. Logo

$$P(X = k) = \frac{1}{6}$$

onde $k \in \{1, \dots, 6\}$.

3.1.2 Distribuição Bernoulli

As variáveis Bernoulli modelam fenômenos que só possuem dois resultados possíveis: verdadeiro ou falso, codificados comumente como 1 e 0 respectivamente. Seja $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ um espaço de probabilidade, e $A \in \mathcal{A}$ tal que

$$\omega \in A \rightarrow X(\omega) = 1 \quad \text{e} \quad \omega \notin A \rightarrow X(\omega) = 0.$$

Dessa forma, X equivale à função indicadora I_A . O único parâmetro p da distribuição é a probabilidade do evento A , implicando que $X = 1$ com probabilidade p e $X = 0$ com probabilidade $1 - p$.

Definição 3.2. A variável X tem distribuição de Bernoulli com parâmetro $p \in [0, 1]$, denotada por

$$X \sim \text{Bernoulli}(p),$$

se sua função de massa for

$$p_X(x) = p^x(1 - p)^{1-x}$$

Repetições de um experimento aleatório que resultam em *sucesso* ou *fracasso* são chamados de ensaios Bernoulli. A variável que indica se o experimento resultou num sucesso tem distribuição Bernoulli com parâmetro p , que é chamado de **taxa de sucesso** do experimento.

Exemplo 3.3. Sortear cara com uma moeda honesta é um ensaio Bernoulli com taxa de sucesso $1/2$.

Proposição 3.1. Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, então

$$E[X] = p \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Demonstração. Com efeito,

$$E[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

Ademais, pela Proposição 2.11

$$\text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

■

3.1.3 Distribuição Binomial

Essa distribuição é usada para modelar contagens de sucessos dentro de uma quantidade fixa de ensaios Bernoulli independentes, isto é, o sucesso ou fracasso de ensaio não interfere na probabilidade do resultado do próximo ensaio. Se $\{X_i\}_{i=1}^n$ é uma amostra independente com $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, então a variável definida por

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

quantificará quantos *sucessos* há nessa amostra. A probabilidade de obter $X = k$ é a probabilidade de obter k sucessos após n ensaios Bernoulli. Para qualquer sequência de ensaios $(X_i = x)_{i=1}^n$, com $x \in \{0, 1\}$, a probabilidade de haver k sucessos será

$$p^k(1-p)^{n-k}.$$

Ademais, o número de sequência em que ocorrem exatamente k sucessos é

$$\binom{n}{k},$$

e como todas elas possuem a mesma probabilidade $p^k(1-p)^{n-k}$ de ocorrer, então

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Definição 3.3. A variável X terá distribuição Binomial com parâmetros n e p , denotado por $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, se sua função de massa for

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Exemplo 3.4. Uma moeda honesta é lançada 10 vezes. A probabilidade do número de caras ser 4 será

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} 0.5^4 \cdot 0.5^6 \approx 0.21$$

Proposição 3.2. Se $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, então

$$E[X] = np \quad e \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$$

Demonstração. Com efeito,

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Utilizando o fato de que

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1},$$

reduzimos então a

$$E[X] = n \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k},$$

o que nos sugere realizar uma troca de variável em k para que consigamos usar o Teorema Binomial. Para tanto, realizemos que

$$n \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$$

já que somar o termo $k = 0$ equivale a somar 0. Fazendo então a troca $j = k - 1$, obtemos

$$E[X] = np \sum_{j=0}^n \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j},$$

e pelo Teorema Binomial,

$$E[X] = np \cdot (p + 1 - p)^{n-1} = np$$

■

3.1.4 Distribuição Hipergeométrica

As variáveis hipergeométricas modelam a contagem de sucessos numa amostra retirada de uma população finita. A cada extração da população, o elemento extraído não é repostado, de modo que a probabilidade de se obter um novo sucesso é modificada a cada tentativa.

Considere uma população de tamanho N da qual m elementos são sucessos e $N - m$ são fracassos, e que uma amostra de tamanho n é extraída dessa população. Considere um conjunto $\{X_i\}_{i=1}^n$ de variáveis indicadora tais que

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se a } i\text{-ésima tentativa é um sucesso} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

e definamos

$$X = \sum_{i=1}^n X_i,$$

como o número de sucessos dentro da amostra.

Para deduzir a probabilidade de se observar $X = k$, tratemos o problema de forma combinatória. O número de amostras com k sucessos e $n - k$ fracassos é

$$\binom{m}{k} \cdot \binom{N-m}{n-k},$$

enquanto que o número total de amostras de tamanho n que podem ser obtidas dessa população é

$$\binom{N}{n}$$

Uma vez que toda amostra, sem observar o número de sucessos ou fracassos, possui a mesma probabilidade de ser sorteada, então:

$$P(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \cdot \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Definição 3.4. A variável X tem distribuição hipergeométrica com parâmetros N , m e $n - X \sim \text{HG}(N, n, k)$ – se

$$P(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \cdot \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

com $\max\{0, n - (N - m)\} \leq k \leq \min\{n, m\}$.

Exemplo 3.5. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 7 verdes. Teremos então que, por exemplo, a probabilidade de que, ao selecionar 3 bolas da urna, 2 delas sejam vermelhas será

$$\frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{7}{1}}{\binom{12}{3}} \approx 0.053$$

Exemplo 3.6. Considere numa fábrica são produzidos lotes com 100 peças cada. Suponha que num lote hajam 10 peças defeituosas. Ao selecionar 5 peças desse lote, a probabilidade de que ao menos uma seja defeituosa é

$$1 - P(X = 0) = 1 - \frac{\binom{90}{5} \cdot \binom{10}{0}}{\binom{100}{5}} \approx 0.416$$

Observação 3.1. Se $X \sim \text{HG}(N, m, n)$ com $n = 1$, então $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ com $p = \frac{m}{N}$.

Observação 3.2. Para amostras de tamanho n retiradas de populações de tamanho N muito grandes – $N \gg n$ – é razoável aproximar a hipergeométrica por uma binomial. Suponha que o número de sucessos nessa população seja m , e definamos $p = m/N$. Na k -ésima extração, com $k \leq n$, a probabilidade p_k de se extrair um sucesso, considerando-se que se obteve u sucessos até então, é

$$p_k = \frac{Np - u}{N - k}$$

Já que $u \leq k \leq n \ll N$, então $u \ll N$ e $k \ll N$, tal que

$$p_k \approx \frac{Np - u}{N} = p - \frac{u}{N} \approx p.$$

Logo, em toda extração, temos, aproximadamente, a mesma probabilidade de se extrair um sucesso. Em outras palavras, ao extrair uma amostra de uma população muito grande, a extração sem reposição equivale, praticamente, a uma extração com reposição. Observemos também que, nesse caso

$$E[X] = n \frac{Np}{N} = np \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = np(1 - p) \cdot \frac{N - n}{N - 1} \approx np(1 - p)$$

que são, aproximadamente, a mesma esperança e variância da variável binomial de parâmetros n e p .

3.1.5 Distribuição Geométrica

Considere o experimento aleatório que consiste na realização de ensaios Bernoulli até obter o primeiro sucesso. Desse modo, obtém-se uma amostra $(X_i = x)_{i=1}^n$ com $X_i = 0$ para $i < n$ e $X_n = 1$. Presuma que X seja a variável que represente o número de tentativas até resultar em um sucesso. Logo, se a taxa de sucesso é p , então a probabilidade de $X = n$ é

$$(1 - p)^{n-1}p$$

Definição 3.5. A variável X tem distribuição geométrica com parâmetro p se

$$P(X = n) = (1 - p)^{n-1}p$$

Observação 3.3. Uma formulação alternativa para a variável geométrica seria aquela onde a variável é o número de fracassos até o primeiro sucesso, e não o número total. Dessa forma, se X é o número de tentativas até o primeiro sucesso, então o número de fracassos é $Y = X - 1$, e a função de massa seria dada por

$$P(Y = y) = (1 - p)^y p$$

Exemplo 3.7. Considere o experimento de lançar um dado até que a soma das faces seja 4. A probabilidade de se obter esse resultado em um lançamento é $1/12$. Logo, a probabilidade de que o número de vezes que o dado seja lançado até que a soma das faces resulte no valor desejado seja 5 é

$$\left(1 - \frac{1}{12}\right)^4 \cdot \frac{1}{12} \approx 0.06$$

Proposição 3.3. Se $X \sim \text{Geo}(p)$, então

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

Demonstração. Com efeito,

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k(1 - p)^{k-1}p = p \sum_{k=0}^{\infty} k(1 - p)^{k-1}.$$

O somatório à esquerda é a derivada de uma série geométrica de razão $q = 1 - p$, tal que $q < 1$. Observemos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dq} \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right) &= \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1 - q} \right) \\ \sum_{k=0}^{\infty} k(1 - p)^{k-1} &= \frac{1}{(1 - q)^2} \end{aligned}$$

donde conclui-se

$$E[X] = \frac{p}{(1 - 1 + p)^2} = \frac{1}{p}$$

■

Exemplo 3.8. No exemplo 3.7, o número esperado de lançamentos até que se obtenha a soma dos dados igual a 4 é 12.

Observação 3.4. A variável geométrica é dotada da propriedade “sem memória”. Matematicamente, se $X \sim \text{Geo}(p)$, então temos que $P(X > s)$ dado que $X > t$ é igual a $P(X > s - t)$, com $s > t$. Isso significa que, se observamos t fracassos desde o início do experimento, então a probabilidade de observarmos mais $s - t$ fracassos é a mesma de ter recomeçar a contagem (daí a perda de memória) e obter $s - t$ fracassos. A fim de verificar, sabemos que

$$P(X > s \mid X > t) = \frac{P(X > s \text{ e } X > t)}{P(X > t)} = \frac{P(X > s)}{P(X > t)},$$

e como $P(X > k) = (1 - p)^k$, já que as k primeiras tentativas foram fracassos, então

$$P(X > s \mid X > t) = (1 - p)^{s-t} = P(X > s - t).$$

A verdade é que a variável geométrica é a única dentre as discretas com tal propriedade. Além disso, implica-se que, em experimentos nos quais conta-se o número de tentativas até o primeiro sucesso, e a probabilidade de um sucesso depende do tempo decorrido até então, a variável geométrica não pode ser aplicada.

3.1.6 Distribuição Binomial Negativa

A variável binomial negativa conta quantas ensaios Bernoulli independentes são realizados até que se acumulem um número desejado de sucessos. Suponha que os ensaios são repetidos até que se observe r sucessos, e que a taxa de sucesso é igual a p . Como o último ensaio deve ser obrigatoriamente um sucesso, então há

$$\binom{n-1}{r-1}$$

maneiras de ter se observado r sucessos ao longo de n ensaios, e cada uma delas ocorre com probabilidade

$$(1 - p)^{n-r} p^r.$$

Portanto, a probabilidade de que o número de ensaios realizados tenha sido igual a n é

$$\binom{n}{r} (1 - p)^{n-r} p^r$$

Definição 3.6. A variável discreta X terá distribuição binomial negativa com parâmetros r e p se

$$P(X = n) = \binom{n}{r} (1 - p)^{n-r} p^r$$

Observação 3.5. Assim como a geométrica, a variável binomial negativa tem uma formulação alternativa enquanto a contagem do número de fracassos até o r -ésimo sucesso. Se X é o número de ensaios realizados até se acumularem r sucessos, então o número de fracassos observados é $Y = X - r$, cuja função de massa é dada por

$$P(Y = y) = \binom{y+r-1}{y} p^r (1 - p)^y.$$

Essa formulação possui algumas vantagens algébricas, como a maior facilidade de tratamento algébrico e seu suporte ser o próprio conjunto dos inteiros não negativos.

Proposição 3.4. *Se $X \sim \text{BinNeg}(r, p)$, então*

$$E[X] = \frac{r}{p} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{r}{p^2}(1 - p)$$

Demonstração. Suponha que $\{X_i = x\}_{i=1}^r$ seja uma amostra de variáveis tais que X_i denote o número de tentativas Bernoulli independentes após o último sucesso até se obter um novo. Com efeito, para todo $i \in [n]$, $X_i \sim \text{Geo}(p)$ e

$$X = \sum_{i=1}^r X_i$$

téa distribuição binomial negativa com parâmetros r e p . Pela linearidade da esperança e pela esperança de uma geométrica de parâmetro p , conclui-se que

$$E[X] = \sum_{i=1}^r E[X_i] = \sum_{i=1}^r \frac{1}{p} = \frac{r}{p}$$

■

Observação 3.6. Se usássemos a formulação da variável Y enquanto contagem de fracassos, então

$$E[X] = E[Y + r] = E[Y] + r$$

mas como $E[X] = r/p$,

$$E[Y] = \frac{r}{p} - r = \frac{r}{p}(1 - p).$$

Além disso, pode-se reformular a distribuição em termos da sua própria média, ou seja, definindo uma variável binomial negativa cujo parâmetro é $\mu = r(1 - p)/p$, de modo que

$$\text{Var}(Y) = \mu + \frac{1}{r}\mu^2.$$

Logo, a medida que a média cresce, a dispersão aumenta em ritmo quadrático em função dela, condição essa conhecida como **superdispersão**, a qual possui aplicações estatísticas na análise de dados.

3.1.7 Distribuição Poisson

A distribuição de Poisson modela contagem de eventos que ocorrem dentro de um intervalo contínuo – como o tempo, uma superfície ou volume – com probabilidade praticamente desprezível. Uma de suas premissas consiste em, para intervalos pequenos, a probabilidade de ocorrência de um evento é proporcional ao tamanho do intervalo. Essa distribuição pode ser compreendida como a uma aproximação da Binomial quando $n \rightarrow \infty$.

Considere que $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, logo

$$p_X(a) = \binom{n}{a} (1 - p)^{n-a} p^a$$

Suponha que np seja igual a uma constante λ . Se tomarmos o limite da função de massa de X quando $n \rightarrow \infty$, obteremos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} p_X(a) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{a} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^a \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-a} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \dots (n-a+1)}{a!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^a \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-a} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{a-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^a (1 - \lambda/n)^n}{a! (1 - \lambda/n)^a} \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{a-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - (\lambda/n)^a = 1$$

então,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_X(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^a}{a!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$$

Usando o limite exponencial fundamental

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

obtemos, por fim,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_X(a) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^a}{a!}$$

Definição 3.7. A variável X tem distribuição de Poisson com parâmetro λ se

$$P(X = a) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^a}{a!}$$

É possível mostrar, formalmente, que a distribuição de Poisson é a distribuição limite da binomial. Para tanto, utilizamos o Teorema 2.14, de forma a demonstrar que, quando $n \rightarrow \infty$, a mgf da variável binomial converge para a mgf da variável de Poisson.

Proposição 3.5. Se $X_n \sim \text{Binomial}(n, p_n)$, com $p_n = \lambda/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Demonstração. A função geradora de momentos da binomial X_n é dada por

$$M_{X_n}(t) = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p_n^x (1 - p_n)^{n-x} = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (p_n e^t)^x (1 - p_n)^{n-x},$$

e, pelo Teorema Binomial,

$$M_{X_n}(t) = (p_n e^t + 1 - p_n)^n = [1 + p_n(e^t - 1)]^n.$$

Avaliando $M_{X_n}(t)$ quando $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = \left[1 + \frac{\lambda}{n}(e^t - 1)\right]^n = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Resta agora verificar a mgf da variável de Poisson de parâmetro λ . Com efeito, se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$,

$$M_X(t) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} = \sum_{x=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!}.$$

Utilizando o polinômio de Taylor para a função exponencial,

$$M_X(t) = e^{-\lambda} e^{e^t \lambda} = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Já que $\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = M_X(t)$, então pelo Teorema 2.14,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

■

Mostramos, a seguir, que o parâmetro da distribuição de Poisson é a sua própria média e variância. Pela interpretação dessa distribuição como uma aproximação da Binomial, λ denota o número esperado de sucessos dentro de um número praticamente infinito de tentativas.

Proposição 3.6. *Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, então*

$$E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$$

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \end{aligned}$$

O somatório equivale ao Polinômio de Taylor de e^λ , portanto

$$E[X] = \lambda e^{-\lambda} e^\lambda = \lambda.$$

Para variância, temos que

$$E[X^2] = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} x^2 \frac{\lambda^x}{x!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$

Fazendo a substituição $k = x - 1$, obtemos

$$E[X^2] = \lambda e^{-\lambda} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right).$$

realizando a substituição $u = k - 1$, temos, por fim,

$$E[X^2] = \lambda e^{-\lambda} (\lambda e^\lambda + e^\lambda) = \lambda^2 + \lambda$$

Uma vez que $E[X]^2 = \lambda^2$, então

$$\text{Var}(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

■

3.1.8 Distribuição Zeta

A distribuição Zeta modela eventos cuja frequência é inversamente proporcional à sua posição num ranking, como frequência de palavras, população de cidades, citações de artigos científicos, entre outros. A ideia é que há poucos elementos muito frequentes, enquanto há muitos outros poucos frequentes.

Suponha que X seja a variável que indique o ranking de um evento conforme a sua posição nele tal que

$$P(X = k) \propto \frac{1}{k^s}$$

onde s indica o grau de diminuição da frequência em relação ao decaimento no ranking. Logo, há uma constante C tal que

$$P(X = k) = \frac{C}{k^s}.$$

Temos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{C}{k^s} = 1,$$

o que implica

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{1}{C}.$$

O membro esquerdo da expressão é conhecida como a função Zeta de Riemann $\zeta(s)$. Logo

$$P(X = k) = \frac{k^{-s}}{\zeta(s)}$$

Definição 3.8. A variável discreta X tem distribuição Zeta com parâmetro $s \in (1, \infty)$ se sua função de massa for

$$P(X = k) = \frac{k^{-s}}{\zeta(s)},$$

onde ζ é a função Zeta de Riemann.

3.2 Distribuição Normal

A distribuição normal foi introduzida em 1733 por Abraham de Moivre para aproximar probabilidades de variáveis binomiais quando o parâmetro n é grande. Essa distribuição possui grande importância na Teoria de Probabilidades e na Estatística, pois suas propriedades analíticas permitem o tratamento adequado de inúmeros fenômenos

Definição 3.9. A variável contínua X tem distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 se sua densidade for

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Uma variável normal será padrão caso $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$.

A função de distribuição da variável normal é um caso de integral que não pode ser expressa em termos de funções elementares. No entanto, isso não a torna menos rica analiticamente. O lema a seguir mostra que, embora não possamos integrar a função de densidade para obter a função de distribuição, somos capazes de encontrar algumas propriedades analíticas de partes da função de densidade que nos serão úteis futuramente.

Lema 3.1. *A integral definida de $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ avaliada em $(-\infty, \infty)$ é $\sqrt{2\pi}$.*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} = \sqrt{2\pi}$$

Demonstração. Equivalentemente, podemos provar que

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = 2\pi.$$

Espressando o problema como uma integral dupla, tal que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(t+u)^2}{2}} dt du,$$

e colocando em termos de coordenadas polares, isto é,

$$r^2 = u^2 + t^2, \quad t = r \cos \theta, \quad u = r \sin \theta,$$

obtemos

$$\int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr d\theta = 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr,$$

essa que pode ser resolvida via substituição, resultando em

$$-2\pi e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{\infty} = 2\pi.$$

■

Uma aplicação direta do Lema 3.1 é mostrar que a função de densidade da normal é de fato válida.

Proposição 3.7. *A função*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

é uma função de densidade.

Demonstração. Para tanto, devemos mostrar que

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

Realizemos a substituição

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

de modo que

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1.$$

Resta concluir que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi},$$

o que é garantido pelo Lema 3.1. ■

Quanto às transformações, toda transformação afim – um escalonamento seguido de um deslocamento – de uma variável normal resulta numa nova variável normal com parâmetros previstos.

Teorema 3.1. *Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ e a e b são constantes, então a variável $aX + b$ é normalmente distribuída com parâmetros $a\mu + b$ e $a^2\sigma^2$.*

Demonstração. Se a distribuição de X é dada por

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

e temos que

$$y = ax + b \implies x = \frac{y - b}{a}$$

então, substituindo x na função de distribuição, obtemos

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi a^2 \sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-(y-a\mu-b)^2}{2a^2\sigma^2}} dy.$$

Logo, a expressão anterior trata-se da distribuição de uma variável $Y = aX + b$ tal que $Y \sim \text{Normal}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$. ■

Corolário 3.1. *Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ e $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, então $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$.*

Demonstração. Se μ_z e σ_z^2 são os parâmetros da distribuição de Z , então

$$\mu_z = \frac{1}{\sigma} \cdot \mu - \frac{\mu}{\sigma} = 0 \quad \text{e} \quad \sigma_z^2 = \left(\frac{1}{\sigma}\right)^2 \cdot \sigma^2 = 1$$

e ■

Teorema 3.2. *Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então*

$$E[X] = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Demonstração. Se $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$, então

$$E[Z] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{\frac{-z^2}{2}}.$$

Resolvendo por substituição $u = \frac{-z^2}{2}$, obtemos

$$E[Z] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

Por outro lado,

$$\text{Var}(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{\frac{-z^2}{2}},$$

a qual pode ser resolvida usando-se integração por partes com $u = z$ e $dv = -ze^{\frac{-z^2}{2}} dz$, obtendo $v = e^{\frac{-z^2}{2}}$ e

$$\text{Var}(Z) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(z^2 e^{\frac{-z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-z^2}{2}} dz \right).$$

Utilizando o Lema 3.1, encontramos que

$$\text{Var}(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$$

Então conclui-se que o Teorema vale para uma variável normal padrão. Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ e $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, então, pelo Corolário 3.1, Z é normal padrão. Pelos Teoremas 2.10 e 2.11, temos que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\sigma Z + \mu] = \sigma \mathbb{E}[Z] + \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(\sigma Z + \mu) = \sigma^2 \text{Var}(Z).$$

Mas como $\mathbb{E}[Z] = 0$ e $\text{Var}(Z) = 1$, então

$$\mathbb{E}[X] = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

■

Portanto, temos que uma variável normal é caracterizada pelo seu valor esperado e por sua variância. Em conjunto com o Corolário 3.1, mostra-se que ao tomar uma variável normal, subtrair a sua média e depois a dividir pelo desvio-padrão resulta numa variável normal padrão. A utilidade desse fato é semelhante ao exposto para transformação de variáveis uniformes contínuas: podemos tabelar os valores de uma única distribuição normal e usá-los para computar probabilidades relacionadas a qualquer outra distribuição normal. Esse fato é ainda mais valioso, já que a distribuição de probabilidade de variáveis normais não possui fórmula fechada como da uniforme contínua. A proposição e o Teorema a seguir nos dizem a respeito da simetria da distribuição normal.

Proposição 3.8. *A função de densidade $f(x)$ de uma variável normal é uma função par, isto é,*

$$f(-x) = f(x)$$

Demonstração. Seja $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$. Uma vez que

$$|-x - \mu| = |x - \mu| \implies (-x - \mu)^2 = (x - \mu)^2,$$

então

$$f(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{\frac{-(-x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = f(x).$$

■

Teorema 3.3. *Se $F(x)$ for a função de distribuição de uma variável normal, então*

$$F(-x) = 1 - F(x)$$

Demonstração. Com efeito,

$$F(-x) = \int_{-\infty}^{-x} f(u) du.$$

onde f é a função de densidade da normal. Realizando a substituição $u = -t$, então $du = -dt$. Além disso, temos que $u \rightarrow -\infty$ implica em $t \rightarrow \infty$, enquanto que $u = -x$ nos dá $t = x$. Obtemos, por consequência,

$$F(-x) = - \int_{\infty}^x f(-t) du.$$

Pelas propriedades de integrais,

$$F(-x) = \int_x^{\infty} f(-t) du,$$

e como f é par pela Proposição 3.8, então

$$F(-x) = \int_x^{\infty} f(t) du.$$

No entanto,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^x f(t) dt + \int_x^{\infty} f(t) dt &= 1 \\ \int_x^{\infty} f(t) dt &= 1 - \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ \int_x^{\infty} f(t) dt &= 1 - F(x) \end{aligned}$$

mostrando, enfim, que

$$F(-x) = 1 - F(x)$$

■

Com isso, temos mais uma facilidade em calcular probabilidades para variáveis normais. Não precisamos, necessariamente, tabelar as densidades de probabilidade para valores negativos da variável, basta usar a relação de simetria usando os valores positivos.

O próximo Teorema enuncia o que De Moivre descobriu e que depois foi generalizado por Laplace: para uma amostra suficientemente grande, a contagem de sucessos tem distribuição aproximadamente normal. Isso caracteriza a aproximação da variável binomial pela variável normal.

Teorema 3.4 (de De Moivre-Laplace). *Se $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, então para quaisquer reais a e b com $a < b$ é satisfeito que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b \right) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

A verdade é que resultado é ainda mais geral, não se restringindo somente às distribuições binomiais. A verdade é que para qualquer distribuição, se tomamos uma amostra suficientemente grande dela e somar os seus valores, a soma deles tem distribuição aproximadamente normal. Esse o Teorema Central do Limite e a razão da importância e destaque da distribuição normal na Estatística.

3.3 Outros Modelos Contínuos

3.3.1 Uniforme Contínua

Analogamente à distribuição uniforme discreta, na distribuição uniforme contínua, todos os valores no suporte possuem a mesma densidade de probabilidade. Os parâmetros dessa distribuição definem o suporte dessa variável, e a densidade de probabilidade sobre cada valor possível é o inverso do comprimento do intervalo.

Definição 3.10. *Uma variável X tem distribuição uniforme contínua com parâmetros a e b caso a sua função de densidade seja dada por*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Proposição 3.9. *Se $X \sim \text{Unif}(a, b)$, então*

1. *sua função de distribuição é dado por*

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{se } x > b \end{cases}$$

2. $E[X] = \frac{b+a}{2}$

3. $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Observação 3.7. A função de distribuição da variável uniforme contínua cresce linearmente a partir de $(a, 0)$ até $(b, 1)$. Portanto, a probabilidade de um determinado intervalo $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$ é proporcional ao tamanho do próprio intervalo:

$$F(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha) = \frac{\beta - \alpha}{b - a} \propto (\beta - \alpha)$$

A próxima proposição mostra que uma determinada transformação aplicada numa variável uniforme sempre resulta na mesma variável uniforme, independente dos parâmetros da distribuição original.

Proposição 3.10. *Se $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ e*

$$U = \frac{X - \frac{a+b}{2}}{b-a}$$

então $U \sim \mathcal{U}(-1/2, 1/2)$.

Demonstração. Se $u = g(x)$ é a transformação dada por

$$\frac{x - \frac{a+b}{2}}{b-a},$$

então ela é uma transformação monótona crescente. Pelo Teorema 2.6,

$$F_U(u) = F_X(g^{-1}(u))$$

onde $F_U(u)$ e $F_X(x)$ são as funções de distribuição de U e X respectivamente. Se $a \leq x \leq b$, então

$$F_U(u) = \frac{1}{b-a} [u(b-a) + (b+a)/2] - \frac{a}{b-a},$$

e, após algumas manipulações algébricas, chegamos a

$$F_U(u) = \frac{(b-a)u + \frac{b-a}{2}}{b-a} = u + \frac{1}{2}.$$

Para determinar os parâmetros α e β da distribuição de U , percebamos que

$$\begin{cases} \beta - \alpha = 1 \\ -\alpha = 1/2 \end{cases}$$

cujas soluções são $\alpha = -1/2$ e $\beta = 1/2$, logo $U \sim \mathcal{U}(-1/2, 1/2)$. ■

Essa Proposição é útil para que programas de computador, por exemplo, possam tabelar valores para uma única distribuição uniforme e, com isso, sejam capazes de determinar valores de probabilidade para qualquer outra distribuição uniforme de forma eficiente.

3.3.2 Exponencial

A variável exponencial é rotineiramente aplicada para modelar tempos de espera entre eventos os quais ocorrem a uma taxa fixa, como chamadas telefônicas a um *call center* ou de requisições a um servidor de dados. Sua função de densidade inclui um parâmetro λ , que denota a taxa de ocorrência de eventos, de sorte que o seu inverso denota o tempo médio entre dois eventos.

Definição 3.11. *A variável X tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda > 0$ se sua função de densidade for dada por*

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Proposição 3.11. *Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, então*

1. *Sua função de distribuição é dada por*

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

2. $E[X] = \frac{1}{\lambda}$

3. $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Observação 3.8. A variável exponencial é a contraparte contínua da variável geométrica quanto a propriedade de sem memória. Basta observar que

$$P(X \geq s \mid X \geq t) = \frac{P(X \geq s)}{P(X \geq t)} = \frac{1 - P(X \leq s)}{1 - P(X \leq t)} = \frac{e^{-\lambda s}}{e^{-\lambda t}} = P(X \geq s - t).$$

É verdade também que a variável exponencial é a única dentre as contínuas com tal propriedade

3.3.3 Distribuição Gama

A variável com distribuição Γ é uma generalização da distribuição exponencial. A integral

$$\int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

denota a função $\Gamma(\alpha)$, a qual é finita quando $\alpha > 0$, podendo ser expressa por uma fórmula fechada. Essa função satisfaz algumas relações importantes; em particular

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \alpha > 0.$$

Uma vez que $\Gamma(1) = 1$, então, pela relação anterior, vale que $\Gamma(n) = n!$ para todo n inteiro positivo.

Como o integrando na definição da função Γ é positivo, então segue de imediato que

$$f(t) = \frac{t^{\alpha-1} e^{-t}}{\Gamma(\alpha)} \quad (3.1)$$

é uma função de densidade. No entanto, é possível generalizar a distribuição com um parâmetro adicional β . Se T tem densidade igual àquela dada por 3.1 e $X = \beta T$, então defini-se a distribuição Γ da maneira a seguir:

Definição 3.12. *A variável X tem distribuição Γ com parâmetros positivos α e β se sua função de densidade for dada por*

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$$

onde a função $\Gamma(\alpha)$ é definida como

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt.$$

O parâmetro α é chamado de **forma** (*shape*), pois caracteriza o pico da distribuição, enquanto que o parâmetro β é denominado **escala** (*scale*), já que influencia a dispersão dela. Percebamos também que a distribuição exponencial de taxa λ é um caso particular da distribuição Γ , onde $\alpha = 1$ e $\beta = 1/\lambda$. Com efeito,

$$f(x \mid \alpha = 1, \beta = 1/\lambda) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} = \lambda e^{-\lambda x}$$

Proposição 3.12. *Se $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, então*

$$E[X] = \alpha\beta \quad e \quad \text{Var}(X) = \alpha\beta^2$$

Proposição 3.13. *Se $t < 1/\beta$, então a função geradora de momentos da distribuição Γ está definida e é determinada por*

$$M_X(t) = \left(\frac{1}{1 - \beta t} \right)^\alpha$$

Assim como a exponencial é a contraparte contínua da variável geométrica, e a variável Γ é a contraparte contínua da variável binomial negativa. Com isso, a distribuição Γ é compreendida como a soma de variáveis exponenciais, e pode ser usada para modelar contagem de eventos até um número desejado α que ocorrem com tempo médio de intervalos iguais a β .

Proposição 3.14. *Seja $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$. Para todo $x \in \mathbb{R}$, se $Y \sim \text{Poisson}(x/\beta)$, então*

$$P(X \leq x) = P(Y \geq \alpha)$$

3.3.4 Distribuição χ^2

Outra especialização da distribuição Γ é a χ^2 com n graus de liberdade, onde $\alpha = n/2$ e $\beta = 2$. Ela é uma das principais distribuições utilizadas em inferência estatística, sendo usada para teste de significância estatística de parâmetros de outras distribuições e para amostragem da distribuição normal.

Definição 3.13. *A variável X tem distribuição χ^2 com n graus de liberdade se sua função de densidade for dada por*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{n/2} e^{-x/2}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Proposição 3.15. *Se $X \sim \chi^2(n)$, então*

$$E[X] = n \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = 2n$$

Proposição 3.16. *Seja $(Z_i)_{i=1}^n$ uma sequência de variáveis aleatórias com distribuição Normal(0, 1). A variável*

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2$$

tem distribuição χ^2 com n graus de liberdade.

3.3.5 Distribuição de Cauchy

A distribuição de Cauchy, assim como a normal, é simétrica e possui um forato de sino, porém com caldas mais pesadas. Sua função é definida a seguir:

Definição 3.14. *Uma variável aleatória X tem distribuição de Cauchy com parâmetros $\theta \in \mathbb{R}$ e $\gamma > 0$ se sua função de densidade for*

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma} \left[1 + \left(\frac{x - \theta}{\gamma} \right)^2 \right]^{-1}$$

Uma propriedade dessa distribuição é que seus momentos não existem, uma vez que todos eles são infinitos. Por consequência, a função geradora de momentos dessa variável não é definida.

Proposição 3.17. *Para todo $\theta \in \mathbb{R}$, se $X \sim \text{Cauchy}(\theta)$, então*

$$E[X^n] = \infty$$

para todo n inteiro positivo.

Apesar da inexistência de momentos, o formato da distribuição com pico θ sugere um fato interessante. Como visto, a distribuição de Cauchy não possui média, e, na verdade, θ denota a mediana da distribuição, o que é enunciado na próxima Proposição.

Proposição 3.18. *Se $X \sim \text{Cauchy}(\theta)$, então*

$$P(X \leq \theta) = \frac{1}{2}$$

A distribuição de Cauchy é muito utilizada para modelar razões entre duas outras variáveis. Em verdade, é possível mostrar que a razão entre duas variáveis com distribuição normal padrão tem distribuição de Cauchy.

3.3.6 Distribuição de Weibull

A variável de Weibull é um modelo de distribuição ainda mais geral que a distribuição Γ usada para modelar tempos de vida. Além dos parâmetros de forma e escala, adiciona-se mais um parâmetro de localização, indicando o tempo mínimo antes de uma falha poder ocorrer.

Definição 3.15. *A variável X tem distribuição de Weibull com parâmetros positivos α , β e γ se sua função de densidade for dada por*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x-\gamma}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-\gamma}{\alpha}\right)^\beta}, & \text{se } x \geq \gamma \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Uma interpretação pode ser atribuída a cada parâmetro dessa distribuição:

- Parâmetro de forma α – Se $\alpha < 1$, então a taxa de falha diminui com o tempo, a exemplo das taxas de mortalidade infantil com relação à idade. Caso $\alpha = 1$, então as falhas ocorrem de maneira aleatória em todo período de tempo observado, similar à distribuição exponencial. Já se $\alpha > 1$, então a taxa de falha aumenta com o tempo, como peças que se desgastam com o tempo.
- Parâmetro de escala β – modela a dispersão da distribuição no eixo do tempo, e, a medida que cresce, mais probabilidade é atribuída aos valores maiores. Seu argumento representa o quantil no qual cerca de 63.2% da população terá apresentado alguma falha.
- parâmetro de localização γ – indica o tempo mínimo antes que seja possível de ocorrer uma falha. Corresponde à origem da curva de densidade no eixo do tempo.

3.3.7 Distribuição Beta

A distribuição Beta possui a propriedade de concentrar toda probabilidade num único intervalo, sendo esse, nesse caso, o intervalo $(0, 1)$. Com isso, ela é comumente aplicada para modelar proporções e taxas que se encontram no intervalo citado.

Definição 3.16. A variável X tem distribuição beta com parâmetros positivos a e b se sua densidade for dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

onde

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Essa distribuição também possui a característica de assumir formas totalmente distintas a depender dos valores dos parâmetros. Em síntese, temos que

- $\alpha > 1$ e $\beta = 1$ – distribuição estritamente crescente.
- $\alpha = 1$ e $\beta > 1$ – distribuição estritamente decrescente.
- $\alpha < 1$ e $\beta < 1$ – formato de “U”.
- $\alpha > 1$ e $\beta > 1$ – formato unimodal.
- $\alpha = \beta$ – simétrica entorno de $1/2$ e com variância $[4(2\alpha + 1)]^{-1}$.

No último caso, a distribuição torna-se cada vez mais concentrada a medida que α cresce. Por fim, quando $\alpha = \beta = 1$, a distribuição degenera-se na uniforme no intervalo $(0, 1)$.

3.3.8 Distribuição log-normal

Quando lidando com dados assimétricos à direita (cujos distribuição concentra-se à esquerda da mediana), é muito comum aplicar a transformação $\log(x)$ para corrigir essa assimetria, pois os valores na calda à direita são “puxados” para estarem mais próximos dos menores. Quando essa transformação leva a uma distribuição normal, então dizemos que a variável original tem distribuição log-normal.

Definição 3.17. A variável X tem distribuição log-normal com parâmetros μ e σ^2 se sua função de densidade for dada por

$$f(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \frac{1}{x} e^{-(\log x - \mu)^2 / (2\sigma^2)}$$

Proposição 3.19. Se $\log X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então

$$E[X] = e^{\mu + (\sigma^2/2)} \quad e \quad \text{Var}(X) = e^{2(\mu + \sigma^2)} - e^{2\mu + \sigma^2}$$

3.3.9 Distribuição de Laplace

A distribuição de Laplace é obtida ao espelhar a distribuição exponencial em torno da sua média. Visualmente, ela possui caldas mais pesada e longas do que a normal. Além disso, a curva da distribuição no ponto $x = \mu$ é um “bico”, ou seja, a densidade não é diferenciável naquele ponto.

Definição 3.18. *A variável X tem distribuição de Laplace se sua função de densidade é dada por*

$$f(x \mid \mu, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x-\mu|/\sigma}$$

Uma das aplicações da distribuição de Laplace é na seleção de atributos para uma regressão linear, atribuindo pesos iguais a zero às características consideradas não significativas para explicar outra variável.

3.4 Desigualdades

Teorema 3.5 (da Desigualdade de Markov). *Se X é uma variável aleatória não negativa, então para todo $a > 0$*

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Demonstração. Seja I a função indicadora tal que

$$I(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq a \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Com isso,

$$I \leq \frac{X}{a},$$

e tomando a esperança de ambos os lados

$$E[I] \leq \frac{E[X]}{a}$$

Já que

$$E[I] = 1 \cdot P(I = 1) = P(X \geq a),$$

então

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

■

Corolário 3.2. *Se X é uma variável aleatória com média μ e variância σ^2 , então para todo $k > 0$*

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

Demonstração. Pela desigualdade de Markov,

$$P((X - \mu)^2 \geq k^2) \leq \frac{E[(X - \mu)^2]}{k^2}$$

mas como $(X - \mu)^2 \geq k^2$ se, e somente se, $|X - \mu| \geq k$, e pela definição de variância, temos que

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

■

Proposição 3.20. *Se X é uma variável aleatória com $\text{Var}(X) = 0$, então $X = E[X]$.*

Demonstração. Pela desigualdade de Chebyshev,

$$P\left(|X - \mu| > \frac{1}{n}\right) \leq 0$$

e por não negatividade de probabilidades,

$$P\left(|X - \mu| > \frac{1}{n}\right) = 0$$

para todo $n \in \mathbb{R}$. Sabemos então que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(|X - \mu| > \frac{1}{n}\right) = 0,$$

no entanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(|X - \mu| > \frac{1}{n}\right) = P\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(|X - \mu| > \frac{1}{n}\right)\right] = P(|X - \mu| > 0),$$

de modo que

$$P(|X - \mu| > 0) = 0.$$

Portanto,

$$P(X = \mu) = 1 \implies X = E[X].$$

■

Teorema 3.6. *Se X é uma variável aleatória e g é uma função convexa, então*

$$E[g(X)] \geq g(E[X])$$

Corolário 3.3. *A variância de uma variável aleatória é sempre não negativa.*

Demonstração. A função $g(x) = x^2$ é convexa, e pela Desigualdade de Jansen segue que

$$E[X^2] \geq E[X]^2.$$

Uma vez que $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$, então $\text{Var}(X) \geq 0$.

■

Variáveis Aleatórias Multidimensionais

Simulação

PARTE II

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Tipos de Dados e Gráficos

Um dos primeiros passos na exploração de uma base de dados é a identificação do tipo dos dados que estamos lidando a fim de empregar as técnicas exploratórias mais adequadas a cada caso. Os dados podem ser vir nos mais variados formatos, como métricas, categoriais, nomes, datas, etc. No entanto, por mais variados que sejam os formatos possíveis, normalmente classicamos-os de acordo com um número limitado de tipos. Após isso, selecionamos quais técnicas usaremos para representar, apresentar e visualizar os dados visando a identificação de padrões e a geração das primeiras hipóteses que irão guiar o resto da exploração.

6.1 Tipos e Escala de Dados

A forma comum em estatística de representar dados é por meio de matrizes retangulares chamadas de **tabelas** – ou também, devido aos softwares usados para tratá-las, de **quadro de dados** (*Dataframe*). Por padrão, sendo D um quadro de dados de dimensões $m \times n$, cada coluna de D corresponde a um **atributo**, também chamado de variável ou *feature*, e cada linha corresponde a um registro, que representa um indivíduo na amostra coletada.

Cada atributo possui um domínio de valores possíveis, que embora possam ser os mais variados possíveis, podem ser organizados numa taxonomia simples. Os tipos de atributos podem ser divididos em dois grande grupos: **quantitativos** ou **qualitativos**. O primeiro refere-se a dados com domínio num conjunto numérico, sendo dividido em

- **Discretos** – São atributos que assumem valores em subconjuntos dos números inteiros $\mathbb{Z}$, sendo que, na maioria dos contextos, são não negativos. Geralmente, representam contagens, como número de filhos e idades.
- **Contínuos** – O domínio do atributo é um intervalo dos números reais $\mathbb{R}$. Na prática, pelas limitações ontológicas de representar um número real, a realização desses valores se limita a valores aproximados. A diferença fundamental para

os discretos é que o conjunto de valores possíveis é não enumerável. Exemplos incluem, principalmente, medidas, como preços, alturas e pesos.

Os dados qualitativos representam uma qualidade dentro de um conjunto finito de possibilidades chamadas de fatores, sendo divididos em

- **Ordinais** – os fatores possuem uma ordem natural. Exemplos são graus de uma qualidade, como classe social (baixa, média e alta) ou veracidade de um exame médico.
- **Nominais** – os fatores não possuem ordem natural, sendo também chamados de categóricos, pois representam categorias. Exemplos são grupos, como sexo ou estado civil. Um tipo especial de variáveis nominais são as dicotômicas, cujos valores possíveis são apenas dois e de caráter antagônico: sucesso ou fracasso, positivo ou negativo, sim ou não, 0 ou 1, etc.

Alternativamente às classificações apresentadas, podemos tipificar atributos através de escalas de medição de seus valores. As escalas são similares às classificações apresentadas anteriormente, sendo elas:

- **Escala Nominal** – para dados nessa escala, só podemos dizer que seus valores são diferentes de outros, sendo usada para categorizar indivíduos. Um exemplo simples é o sexo de uma pessoa: feminino ou masculino. Essa escala não suporta operações matemáticas, e uma medida de centralidade comum para resumir dados nessa escala é a moda.
- **Escala Ordinal** – nessa escala, os valores podem ser ordenados, e podemos então dizer que, além de diferentes, um valor é maior do que o outro. Essa escala tem sua estrutura preservada por operações que mantenham a ordem. Um exemplo de variável ordinal é o nível de escolaridade: fundamental, médio e superior. Medidas de tendência central comuns para dados nessa escala são a moda e a mediana.
- **Escala Intervalar** - essa escala possui uma origem arbitrária e necessita de uma unidade de medida, sendo um exemplo a temperatura de um ambiente. Podemos afirmar que valores são diferentes, maiores e quão o maior em relação a outro, e transformações afim não alteram a estrutura dessa escala. Podemos utilizar medidas como média, moda e mediana.
- **Escala de Razão** – nessa escala, existe uma origem absoluta, e podemos dizer quantas vezes um valor maior do que outro através de razões. Um exemplo de variável nessa escala é o peso de um indivíduo. Transformações lineares preservam a estrutura dessa escala, e podemos utilizar medidas como média, moda e mediana.

Em muitos casos, os atributos de um quadro de dados podem ser modelados enquanto variáveis aleatórias. É preciso, para tanto, que os atributos tenham representações numéricas válidas, especialmente no caso dos atributos qualitativos, a exemplo dos

ordinais, que podem ser representados por uma enumeração de 1 até n , onde n indica o número de fatores, e dos dicotômicos, que são podem ser simplesmente representados por 0 e 1. A modelagem por variáveis aleatórias, visa, nas tarefas de análise exploratória, explicar os atributos aplicando os resultados da teoria de distribuições de probabilidade. Com essa abordagem, pode-se explicar aspectos como frequências (absolutas relativas ou acumuladas), pontos de centralidade, dispersão, assimetria, valores atípicos, entre outros.

6.2 Tabelas de Frequência

Um procedimento para entender o comportamento e distribuição dos dados consiste no uso tabelas de frequência, especialmente para variáveis qualitativas, que não podem ser resumidas por medidas de estatística descritiva a serem vistas mais adiante. Considere um quadro de dados D com n registros e com um atributo X com k valores possíveis iguais a $d_1, \dots, d_k$. Numa tabela de frequência para D em relação ao atributo X constam, geralmente, duas colunas: a primeira é frequência (absoluta), i.e., o número de registros n_i tais que $X = d_i$, enquanto a terceira é a frequência relativa $f_i = n_i/n$, também chamada de proporção e representada geralmente em porcentagem, denotando a fração de registros que pertencem à classe d_i .

As tabelas de frequência também podem ser usadas para descrever dados quantitativos desde que esses sejam devidamente discretizados, o que ocorre, comumente, por meio de intervalos de amplitude pré-determinada, de forma que cada intervalo passa a representar uma classe. Diferentes valores de amplitudes para cada classe podem levar a visualizações distintas. Amplitudes pequenas levam a muitas classes, que por sua vez podem gerar perda de informação, enquanto que amplitudes grandes criam poucas classes, prejudicando a tarefa de resumo. O recomendado é a criação de 5 a 15 classes de mesma amplitude.

Para dados contínuos discretizados em intervalos de amplitude Δ_i para a classe d_i , a tabela pode conter também: a densidade de frequência, dada por n_i/Δ_i , a densidade de proporção, obtida por f_i/Δ_i , e a frequência acumulada, dada por

$$\sum_{j=1}^i f_j$$

Essas novas colunas podem ser usadas para construir gráficos que permitam analisar distribuição dos valores de uma variável numérica.

6.3 Gráficos

Nesta seção iremos descrever brevemente gráficos para realizar análise univariada de variáveis de acordo com o seu tipo. Para variáveis qualitativas, os gráficos são bsicamente construídos com base na tabela de frequência de cada classe, mostrando a contagem ou a frequência relativa em cada classe. Alguns exemplos incluem:

- Gráfico de Barras – uma barra é dedicada a cada classe, e o tamanho da barra é

proporcional à contagem de registros na classe. O código 6.1 mostra a criação de tal gráfico com a base `cd_brasil` usando o pacote `ggplot2` da linguagem R.

```
1 library(ggplot2)
2
3 cd_brasil |>
4   ggplot(aes(x = regiao)) +
5     geom_bar(stat = "count")
```

CÓDIGO 6.1. Gráfico de Barras

- Gráfico de Setores – construído com um círculo de raio arbitrário em que a contagem ou frequência de registros é proporcional à área do setor circular que o representa. O código 6.2 constrói o gráfico de setores correspondente à distribuição de `regiao` na base `cd_brasil`.

```
1 tab_regiao <- table(cd_brasil$regiao)
2
3 pie(tab_regiao, labels = names(tab_regiao))
```

CÓDIGO 6.2. Gráfico de Setores

- Gráfico de Pirulito – mesmo princípio que o de barras, mas com aspecto mais simples, em que o tamanho é proporcional a uma linha vertical com um ponto no eixo do valor da contagem ou frequência. O código 6.3 mostra a construção desse gráfico com `ggplot2`, combinando `geom_segment` para a linha e `geom_point` para o ponto no topo.

```
1 library(ggplot2)
2
3 cd_brasil |>
4   group_by(regiao) |>
5   summarise(count = n()) |>
6   ggplot(aes(x = regiao, y = count)) +
7     geom_segment(aes(xend = regiao, y = 0, yend =
8                     count)) +
9     geom_point(size = 3)
```

CÓDIGO 6.3. Gráfico de Pirulito

Para variáveis numéricas discretas, barras e pirulito também podem funcionar se houver um número não muito grande de realizações distintas no conjunto de dados. Para variáveis contínuas, a discretização em intervalos permite gerar vários tipos de gráficos que ajudam a entender a distribuição de valores da variável, como

- Histogramas – construído também com barras com tamanho proporcional densidade – de registros ou frequência – em cada intervalo. Há várias fórmulas para determinar o número de intervalos (*bins*), como a de Sturges, dada por $k = 1 + 3.3 \log_{10}(n)$, da raiz quadrada, com $k = \sqrt{n}$, de Scott, com $k = \frac{3.5\sigma}{\sqrt[3]{n}}$,

onde σ é o desvio-padrão, ou a de Freedman-Diaconis, dada por $k = \frac{2 \cdot \text{IQR}}{\sqrt[3]{n}}$. O código 6.4 constrói o histograma da variável `temp` da base `cd_poluicao`.

```

1 hist(cd_poluicao$temp,
2       xlab = "Temperatura",
3       ylab = "Frequencia",
4       border = "white",
5       col = "darkblue")

```

CÓDIGO 6.4. Histograma

- Ramo-e-folha – os ramos são uma coluna vertical com os valores inteiros distintos assumidos pelas realizações. As folhas são as partes fracionárias, empilhadas verticalmente ou horizontalmente em seus ramos. O código 6.5 mostra a construção do diagrama para a mesma variável `temp`.

```

1 stem(cd_poluicao$temp, scale = .5)

```

CÓDIGO 6.5. Ramo-e-folha

- Gráfico Dispersão Unidimensional – os dados são mapeados a pontos na reta correspondentes a seus valores. Valores repetidos podem ser empilhados, de modo a dar uma melhor visualização à distribuição dos dados. O código 6.6 mostra a construção desse gráfico, empilhando os pontos repetidos com a opção `method = "stack"`.

```

1 stripchart(cd_poluicao$temp,
2            xlab = "Temperatura",
3            method = "stack",
4            offset = 2,
5            at = 0,
6            pch = 19,
7            cex = 0.5,
8            col = "darkblue")

```

CÓDIGO 6.6. Dispersão Unidimensional

Medidas de Resumo

7.1 Medidas de Posição

Um grau maior de resumo dos dados pode ser obtido ao se computar determinadas estatísticas numéricas que sejam representativas de todo o conjunto, e não somente de agrupamentos deles, como é o caso das frequências absolutas e relativas. Para tanto, podemos utilizar algumas das medidas que explicam uma determinada distribuição vistas na parte I, geralmente usadas em conjunto para evitar uma redução muito drásticas dos dados. Nesta seção, veremos como obter, a partir da amostra, estimativas para medidas de posição, em especial a moda, mediana e o valor esperado.

A primeira da qual iremos tratar será a moda, que pode ser interpretada como o valor mais frequente numa distribuição. Dada uma amostra $\{x_i\}_{i=1}^n$ de realizações para um atributo X , a **moda amostral** – estimativa da moda teórica a partir de uma amostra – pode ser definida simplesmente como o valor mais frequente nessa amostra. A moda é adequada para atributos qualitativos e quantitativos discretos, ao passo que para quantitativos contínuos ela pode ser pouco representativa devido ao grande número de possibilidades de realizações.

A mediana é outra medida de centralidade muito utilizada em resumos, sendo definida a seguir. Com isso, a mediana é o valor que acumula metade da distribuição de probabilidade de uma distribuição e, por consequência, sua contraparte amostral pode ser estimada ao tomar a realização que tem frequência acumulada igual a 50%. Se $N(x)$ é o número de observações tais que $X \leq x$, então a mediana amostral é o valor x que satisfaz

$$\frac{N(x)}{n} = 0.5$$

Computacionalmente, uma forma de obtê-la é ordenado as n observações por seus valores, e, caso n seja ímpar, a mediana é o valor no índice $\frac{n}{2}$, ao passo que, caso n seja par, ela será a média aritmética entre as realizações de índice $\frac{n}{2}$ e $\frac{n+1}{2}$. Há outros métodos computacionais para obter a mediana sem necessariamente ordenar os dados, a exemplo do algoritmo `quickselect`.

Por fim, a média é a estimativa do valor esperado de uma variável X , sendo, pois, o valor que corresponde ao centro de massa da amostra. Para a obter, basta computar

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

Tanto a média quanto a mediana são apropriadas apenas à atributos quantitativos, com uma possível exceção àqueles que denotam uma ordenação, cuja média pode não ter uma interpretação no contexto dos dados. Caso estejamos lidando com intervalos discretizados desses valores, então a forma de computar essas medidas é por estimativa, como, por exemplo, a tomar o ponto médio de cada intervalo e usá-los para obter a média final.

7.2 Medidas de Dispersão

Além de ver onde nossos dados estão centrados, é desejável saber o quanto eles variam, geralmente entorno do próprio centro. Para esse fim, utiliza-se as medidas de dispersão.

Tomando a média como centro, podemos obter, como medida de dispersão, o desvio médio absoluto, que corresponde a uma estimativa do erro médio cometido ao substituir todos os dados pela própria média, indicando, também, se essa é uma boa medida de resumo dos dados.

$$\text{dm}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \quad e$$

Outra candidata a medida de dispersão é a variância, que, como visto na seção ??, corresponde ao segundo momento central de uma distribuição. Numa amostra, ela pode ser interpretada como o erro quadrático médio ao substituir todos os dados pela média, sendo obtida, geralmente para amostras grandes, pela fórmula

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|^2.$$

Ao elevar as diferenças ao quadrado, desvios maiores tem mais peso do que os menores. Como a variância possui unidade igual ao quadrado da unidade do atributo original, então sua interpretação pode ser prejudicada, e, com isso, o desvio-padrão, dado como

$$\text{dp}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)},$$

pode ser usado para substituir a variância caso deseje-se que o erro esteja na unidade dos dados.

O desvio absoluto médio e o desvio-padrão possuem interpretações e aplicações semelhantes ao avaliar a dispersão entorno da média. No entanto, o primeiro nos oferece uma noção mais intuitiva de dispersão, pois todos os desvios possuem o mesmo peso independente da magnitude. Já o desvio-padrão, uma vez que atribui pesos distintos a erros conforme a sua magnitude, é preferível quando objetiva-se detectar rapidamente a presença de realizações muito distantes da média, o que pode indicar valores atípicos.

7.3 Quantis

Definição 7.1. Seja X uma variável aleatória com suporte Ω_X e função de distribuição $F(x)$. O número $q \in \Omega_X$ é o quantil de probabilidade $p \in [0, 1]$ da distribuição de X se

$$F(q) = p$$

Com isso, o quantil de probabilidade p é o valor que acumula p de probabilidade na distribuição de X , cuja interpretação seria dada como o número tal que a probabilidade de X ter realização menor ou igual a ele é q .

Observação 7.1. A mediana $\text{med}(X)$ de X é o quantil de probabilidade 0.5.

A mediana compõe também um grupo de quantis muito utilizados no resumo de distribuições chamados quartis, que tratam-se dos quantis de probabilidade 0.25, 0.5 e 0.75. O seu destaque deve-se ao fato deles dividirem uma distribuição em quatro partes com mesma probabilidade, todas iguais a 25%. Analogamente, também poderia-se utilizar os decis, que são os quantis de probabilidade igual a $0.1 \cdot k$, para $k \in [10]$. Outros quantis de destaque são os de 0.05 e 0.95, muito utilizados em inferência.

A determinação de quantis empíricos – a partir de uma amostra de dados – pode ser realizadas de diferentes maneiras que adotam variadas premissas. Uma das mais simples é uma generalização daquela usada para a mediana apresentada na seção 7.1, chamada de interpolação.

Suponha estatísticas de ordem $x_1, \dots, x_n$ e queremos encontrar o quantil q de probabilidade p . Presumiremos que as estatísticas dividem a distribuição em intervalos de mesma probabilidade, ou seja, se $Q(p)$ é o quantil de p , então

$$\forall i \in [n], \left(Q^{-1}(x_{i+1}) - Q^{-1}(x_i) = \frac{1}{n-1} \right).$$

Por consequência,

$$\forall i \in [n], \left(Q^{-1}(x_i) = \frac{i-1}{n-1} \right),$$

e, em especial, $Q^{-1}(x_1) = 0$ e $Q^{-1}(x_n) = 1$. Suponha que p esteja entre

$$p_j = \frac{j-1}{n-1} \quad \text{e} \quad p_{j+1} = \frac{j}{n-1}.$$

Disso, segue que

$$\begin{aligned} p_j &< p < p_{j+1} \\ (n-1)p_j + 1 &< (n-1)p + 1 < (n-1)p_{j+1} + 1 \\ x_j &< (n-1)p + 1 < x_{j+1}. \end{aligned}$$

Fazendo $h = (n-1)p + 1$ e fazendo $j = \lfloor h \rfloor$, basta interpolar linearmente as estatísticas x_j e x_{j+1} usando o fator $\gamma = h - j$, que representa o quão longe estamos de x_j em direção a x_{j+1} . Desse modo,

$$q = (1 - \gamma)x_j + \gamma x_{j+1}.$$

Algoritmo 1: Método de Interpolação do Quantil Empírico

Entrada: vetor de estatísticas $\mathbf{x}$ de tamanho n e $p \in [0, 1]$

Saída: O quantil empírico q

```
1 início
2    $s \leftarrow \text{ordene}(\mathbf{x});$ 
3   se  $n = 1$  então
4     |   retorna  $s[1];$ 
5   fim
6    $h \leftarrow (n - 1)p + 1;$ 
7    $j \leftarrow \lfloor h \rfloor;$ 
8    $\gamma \leftarrow h - j;$ 
9   retorna  $(1 - \gamma)s[j] + \gamma \cdot s[j + 1];$ 
10 fim
```

O algoritmo 1 organiza esses passos para a determinação do quantil empírico via interpolação recebendo o vetor de estatísticas e a probabilidade acumulada pelo quantil ao ser obtido.

Além de uma medida de posição, os quantis podem ser usados para medir dispersão. O Intervalo Interquantílico (IQR) é a distância entre o primeiro e terceiro quartil, e quanto maior for sua magnitude, mais dispersa será a distribuição.

Definição 7.2. Se q_1 e q_3 são os primeiro e terceiro quartis respectivamente da distribuição da variável X , então

$$d_q = q_3 - q_1$$

é o intervalo interquantílico da distribuição.

Uma vantagem do uso dessa medida são que ela ignora 50% mais extremos – os 25% inferiores e os 25% superiores – e preservar os 50% mais centrais, de forma a medir a dispersão típica da variável, isto é, sem a presença dos valores atípicos. Ela também é considerada mais robusta para distribuições assimétricas, pois medidas como a variância e, conseqüentemente, o desvio-padrão são facilmente distorcidos por distribuições de calda longa.

Os quartis também possuem outra aplicação, neste caso a construção dos diagramas de *box-plot*. Neles, usam-se caixas verticais (ou horizontais) para representar a distribuição dos dados, onde a o limite inferior (ou mais à esquerda) é o primeiro quartil, e o limite superior (ou mais à direita) é o terceiro quartil. A mediana também é marcada como uma linha vertical ou horizontal a depender da orientação da caixa. Outro elemento do *box-plot* são os bigodes, que consistem de traços conectados a caixa por um segmento que marcam a última instância da amostra cujo valor está dentro de $q_1 - 1.5(q_3 - q_1)$ no caso inferior ou $q_3 + 1.5(q_3 - q_1)$ no caso superior. Os *box-plot* são de grande ajuda para compreender a distribuição de um atributo, especialmente em aspectos de simetria e na detecção de valores atípicos.

7.4 Simetria e Assimetria

Entre as motivações para se estudar a assimetria ou simetria dos dados estão a constatação de

- Concentração dos dados em uma dada região de valores.
- Presença de caldas particularmente longas.
- Afastamento dos dados do centro.
- Validade de hipóteses sobre o modelo adotado para a distribuição.

Quando os dados possuem distribuição simétrica, algumas vantagens analíticas e estatísticas surgem. Por exemplo, a média se torna representativa para medir centralidade, pois essa localiza-se justamente no centro da distribuição, de sorte que a variância – e o desvio-padrão – também passa a ser representativa para medir variabilidade, já que os dados estão centrados na média. Quando os dados são assimétricos, medidas de resumo como mediana e quartis são preferíveis por serem menos sensíveis à forma da distribuição. Algumas técnicas de inferência estatística, principalmente aquelas que se baseiam no uso da distribuição normal, a serem apresentadas adiante, também se aproveitam da estrutura simétrica da distribuição, facilitando a produção de algumas análises.

Seja X um atributo. Para medir sua assimetria, são geralmente usados

- Coeficiente de Assimetria de Pearson I – usado quando a distribuição é unimodal, e a moda pode ser bem definida.

$$\frac{\bar{x} - \text{moda}(X)}{\sigma^3}$$

- Coeficiente de Assimetria de Pearson II – usado quando a distribuição não é unimodal ou a moda não pode ser bem definida, dada por

$$\frac{3(\bar{x} - \text{med}(X))}{\sigma^3}$$

- Coeficiente Quatílico de Assimetria – utiliza os quartis da distribuição, partindo do princípio que o primeiro e terceiro quartil são equidistantes da mediana

$$\frac{q_1 + q_2 - 2 \text{med}(X)}{q_3 - q_1}$$

- Coeficiente de Assimetria de Fisher – um estimador baseado no terceiro momento central multiplicado por um fator que remove o viés do tamanho da amostra

$$\frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} \cdot \frac{1}{n\sigma^3} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3$$

A depender da medida c utilizada, ela pode ter seus valores interpretados como

- $c > 0$ – assimetria positiva, indicando que $\bar{X} > \text{moda}(X)$, também chamada de assimetria à esquerda, pois os dados possuem uma calda mais longa nessa direção enquanto que seus valores concentram-se mais à direita.
- $c < 0$ – assimetria negativa, e provavelmente temos $\bar{X} < \text{moda}(X)$, o que é chamado de assimetria à direita, direção na qual se estende a calda da distribuição, e os dados concentram-se em valores mais baixos.
- $c = 0$ – ausência de assimetria, levando a hipótese de que $\bar{X} = \text{moda}(X)$ e que a distribuição é possivelmente simétrica.

Uma ferramenta visual para medir assimetria de dados são os **gráficos de simetria**. As estatísticas de ordem são usadas para computar pares (u_i, v_i) tais que

$$u_i = \text{med}(X) - x_i \quad \text{e} \quad v_i = x_{n-i+1} - \text{med}(X).$$

Junto desses pares, é mostrado também a reta $v = u$. Se os pontos se alinharem a reta, temos uma evidência visual de que os dados tem pouca assimetria ou são simétricos, enquanto que, caso alguns pontos se desviem das extremidades dela, então teremos uma visualização que indica assimetria.

7.5 Medidas Robustas

Tomemos o exemplo de uma base que contenha salários de funcionários de uma empresa. A média pode ser pouco representativa para descrever esses dados, pois, normalmente, há poucos funcionários que ganham altos salários, como executivos, enquanto a grande maioria dos funcionários tem uma remuneração consideravelmente mais baixa. Por consequência, a variância e o desvio-padrão também podem não ser apropriados para medir a variabilidade, pois os valores extremos podem indicar uma dispersão enquanto que os dados, na realidade, concentram-se num determinado intervalo.

A mediana e o IQR, usados para medir centralidade e dispersão respectivamente, sofrem menos influência da magnitude do dado do que a média e variância, por exemplo. Isso se deve ao fato de que seus valores são computados utilizando somente parte dos dados, e não por uma agregação completa deles. Logo, na suspeita da presença de valores extremos e de forte assimetria, essas medidas podem ser mais apropriadas para realizar a descrição da base.

Há também outras medidas muito utilizadas para descrever dados de maneira robusta. A primeira a citar é a **média aparada**, que consiste no cálculo da média considerando apenas parte dos dados menos extremos. Para isso, decidiu-se por um parâmetro $\alpha \in [0, 1]$ e calcula-se a média apenas das estatísticas entre aquelas que acumulam α e $1 - \alpha$ de probabilidade. Isso garante que a média não será influenciada por valores extremos, sendo, pois, mais representativa.

Uma segunda medida, dessa vez de dispersão, é o **coeficiente de variação**. Ele é calculado apenas tomando-se o desvio-padrão e o dividido pela média, produzindo, por conseguinte, uma grandeza adimensional. Essa propriedade permite avaliar a

variabilidade de um atributo de forma padronizada, ou seja, independente da escala dele, tornando possível, também, comparar a variabilidade de dois atributos de magnitude ou escala distintos.

Uma segunda medida robusta de dispersão é o **desvio absoluto mediano**, análogo ao desvio absoluto médio. Para o computar, basta tomar a mediana dos desvios das estatísticas em relação a mediana do atributo. Assim, valores extremos pouco interferem no valor final.

Análise de Dados de Duas Variáveis

PARTE III

INFERÊNCIA CLÁSSICA

Amostragem

Estimação de Parâmetros

Testes de Hipóteses

Inferência Multipopulacional

Análise de Aderência e Adesão

Teste de Hipótese Não Paramétricos

PARTE IV

REGRESSÃO

Covariância e Correlação

Regressão Linear

Regressão Linear Generalizada

PARTE V

INFERÊNCIA BAYESIANA

Paradigma Bayesiano

Inferência e Decisão

Computação Bayesiana

PARTE VI

PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

Introdução aos Processos Estocásticos

Cadeias de Markov

Ergodicidade

Processos de Contagem

Simulação por Processos Estocásticos

PARTE VII

SÉRIES TEMPORAIS

Fundamentos de Séries Temporais

Modelos Lineares de Séries Temporais

Modelos Intergrados e Sazonais

Previsão

Métodos de Suavização

Tópicos Avançados
