

Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje

**Iskanje presečišč Bèzierjevih krivulj z metodo hibridnih  
izrezkov**

Domen Keglevič


1. UVOD

V seminarski nalogi nas bo zanimalo kako najti presečišča dveh ravninskih Bèzierjevih krivulj. Ta problem lahko opišemo na naslednji način. Naj bosta  $\mathbf{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2$  in  $\mathbf{g} : [\xi, \eta] \rightarrow \mathbb{R}^2$  ravninski Bèzierjevi krivulji. Želimo najti učinkovit algoritem, ki za poljuben  $\epsilon > 0$  vrne pare intervalov  $[\alpha_i, \beta_i]$  in  $[\xi_i, \eta_i]$ , ki vsebujejo presečišča  $\mathbf{f}(t_i) = \mathbf{g}(s_i)$ ,  $t_i \in [\alpha_i, \beta_i]$ ,  $s_i \in [\xi_i, \eta_i]$ , tako da velja  $|\alpha_i - \beta_i| < \epsilon$  in  $|\xi_i - \eta_i| < \epsilon$ .

Ta problem se da rešiti na več načinov. Tu bomo predstavili metodo hibridnih izrezkov, ki je razširitev metode Bèzierjevih izrezkov.

Metoda Bèzierjevih izrezkov najprej aproksimira krivuljo  $\mathbf{g}$  z ozkim pasom  $\mathcal{L}$  v ravnini (*fat line*), tako da  $\mathbf{g}$  leži znotraj  $\mathcal{L}$ . Nato izračuna presek pasa  $\mathcal{L}$  in konveksne ovojnice kontrolnih točk krivulje  $\mathbf{f}$ , ter definicijsko območje krivulje  $\mathbf{f}$  omeji na intervale, kjer je presek neprazen. Nato vlogi  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$  zamenja in postopek ponavlja, dokler ne pride do željene natančnosti.

Ideja metode hibridnih izrezkov je podobna kot ideja metode Bèzierjevih izrezkov, le da ne opazujemo presek pasa  $\mathcal{L}$  s konveksno ovojnico kontrolnih točk krivulje  $\mathbf{f}$ , ampak z območjem  $\mathcal{P}$  (*fat curve*). Tega dobimo tako, da z nižanjem stopnje krivulje  $\mathbf{f}$  dobimo aproksimacijo, ki jo lahko premaknemo v dve nasprotni smeri tako, da je krivulja  $\mathbf{f}$  vsebovana v območju  $\mathcal{P}$  vmes (slika (1)). Nato krivuljo  $\mathbf{f}$  zmanjšamo na tiste intervale, kjer je presek  $\mathcal{L} \cap \mathcal{P}$  neprazen. V naslednjem koraku vlogi  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$  zamenjamo in postopek ponavljamo do željene natančnosti.



SLIKA 1. *Fat line*  $\mathcal{L}$  in *fat curve*  $\mathcal{P}$ , ki omejujeta  $\mathbf{g}$  in  $\mathbf{f}$ .

## 2. METODA HIBRIDNIH IZREZKOV

Vpeljimo nekaj oznak, ki jih bomo uporabljali v nadaljevanju. Z

$$B_{i,[\alpha,\beta]}^n(t) = \binom{n}{i} \frac{(t-\alpha)^i(\beta-t)^{n-i}}{(\beta-\alpha)^n}$$

označimo  $i$ -ti Bernsteinov bazni polinom stopnje  $n$  na intervalu  $[\alpha, \beta]$ . Intervale  $[\alpha, \beta]$  namesto intervala  $[0, 1]$  opazujemo zato, ker bo algoritem generiral zaporedje vedno manjših intervalov.

Naj bosta  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$  ravninski Bèzierjevi krivulji dani z

$$\mathbf{f}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{a}_i B_{i,[\alpha,\beta]}^n(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

in

$$\mathbf{g}(s) = \sum_{j=0}^m \mathbf{b}_j B_{j,[\xi,\eta]}^m(s), \quad s \in [\xi, \eta],$$

kjer so  $\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^2$  kontrolne točke od  $\mathbf{f}$  oz.  $\mathbf{g}$ . Naj bo  $\|\cdot\|$  Evklidska norma na  $\mathbb{R}^2$ . Definiramo še naslednje norme:

(1) Normalizirana  $L_2$  norma

$$\|\mathbf{f}\|_2^{[\alpha,\beta]} = \sqrt{\frac{1}{\beta-\alpha} \int_{\alpha}^{\beta} \|\mathbf{f}(t)\|^2 dt},$$

(2)  $L_{\infty}$  norma

$$\|\mathbf{f}\|_{\infty}^{[\alpha,\beta]} = \max_{t \in [\alpha,\beta]} \|\mathbf{f}(t)\|,$$

(3) BB norma

$$\|\mathbf{f}\|_{\text{BB}}^{[\alpha,\beta]} = \max_{i=0,\dots,n} \|\mathbf{a}_i\|.$$

**2.1. Fat line.** Naj bo  $\mathbf{n}$  normalni vektor, ki je pravokoten na  $\mathbf{b}_m - \mathbf{b}_0$ . Definiramo predznačeni razdalji

$$d_{\max} = \max_{i=0,\dots,m} (\mathbf{n} \cdot (\mathbf{b}_i - \mathbf{b}_0)),$$

$$d_{\min} = \min_{i=0,\dots,m} (\mathbf{n} \cdot (\mathbf{b}_i - \mathbf{b}_0)).$$


Množico  $\mathcal{L}$ , ki ga sestavljajo točke, ki so od premice  $\mathbf{b}_0\mathbf{b}_m$  oddaljene kvečjemu za  $d_{\min}$  oz.  $d_{\max}$  imenujemo *fat line*. Krivulja  $\mathbf{g}$  je vsebovana v  $\mathcal{L}$ , saj je v  $\mathcal{L}$  vsebovana njena konveksna ovojnica.

**2.2. Fat curve.** Naj bo  $\hat{\mathbf{p}}(t)$  polinom stopnje  $k < n$ , ki optimalno aproksimira  $\mathbf{f}(t)$  glede na normo  $L_2$ . Konstruiramo ga s pomočjo nižanja stopnje krivulje  $\mathbf{f}(t)$ , kot je opisano v [referenca](#). S pomočjo višanja stopnje mu lahko zvišamo stopnjo do  $n$  in zapišemo

$$\hat{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{p}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{c}_i B_{i,[\alpha,\beta]}^n(t),$$

kjer so  $\mathbf{c}_i$  nove kontrolne točke. Naj bo

$$\delta = \|\mathbf{f}(t) - \mathbf{p}(t)\|_{\text{BB}}^{[\alpha,\beta]}. \quad (1)$$



SLIKA 2. Krivulja  $\mathbf{g}$  in *fat line*.

Velja naslednja ocena

$$\|\mathbf{f}(t) - \mathbf{p}(t)\| = \left\| \sum_{i=0}^n (\mathbf{a}_i - \mathbf{c}_i) B_{i, [\alpha, \beta]}^n(t) \right\| \leq \sum_{i=0}^n \|\mathbf{a}_i - \mathbf{c}_i\| B_{i, [\alpha, \beta]}^n(t) \leq \delta.$$


Sledi, da  $\mathbf{f}(t)$  leži med  $\mathbf{p}_1(t) = \hat{\mathbf{p}}(t) + \delta \mathbf{n}(t)$  in  $\mathbf{p}_2(t) = \hat{\mathbf{p}}(t) - \delta \mathbf{n}(t)$ , kjer je  $\mathbf{n}$  normala pravokotna na  $\mathbf{b}_m - \mathbf{b}_0$  (kot v *fat line*). Naj bo

$$\begin{aligned} d(t) &= \mathbf{n} \cdot (\mathbf{f}(t) - \mathbf{b}_0), \quad d_0(t) = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{p}(t) - \mathbf{b}_0) \\ d_1(t) &= \mathbf{n}(\mathbf{p}_1(t) - \mathbf{b}_0) = d_0(t) + \delta \\ d_2(t) &= \mathbf{n}(\mathbf{p}_2(t) - \mathbf{b}_0) = d_0(t) - \delta. \end{aligned}$$

Potem velja ocena

$$|d(t) - d_0(t)| = |\mathbf{n} \cdot (\mathbf{f}(t) - \mathbf{p}(t))| \leq \|\mathbf{n}\| \cdot \|\mathbf{f}(t) - \mathbf{p}(t)\| \leq \|\mathbf{f}(t) - \mathbf{p}(t)\|_{\infty}^{[\alpha, \beta]} \leq \delta.$$

To pomeni, da  $d(t)$  leži v pasu med  $d_1(t)$  in  $d_2(t)$  kot prikazuje slika (3).



SLIKA 3

**2.3. Iskanje intervalov.** Iz zgornjih dveh razdelkov vemo, da je (predznačena) razdalja točke  $\mathbf{g}(t)$  od premice  $\mathbf{b}_0\mathbf{b}_m$  med  $d_{\min}$  in  $d_{\max}$ , ter da je (predznačena) razdalja točke  $\mathbf{f}(t)$  od premice  $\mathbf{b}_0\mathbf{b}_m$  med  $d_1(t)$  in  $d_2(t)$ . Vsa tista območja, kjer je  $d_1(t) < d_{\min}$  in  $d_2(t) > d_{\max}$ , lahko zavržemo. Natančneje, če najdemo rešitve enačb

$$d_1(t) = d_{\min} \text{ in } d_2(t) = d_{\max},$$

potem lahko v domeni krivulje  $\mathbf{f}$  najdemo iskane intervale  $[\alpha_i, \beta_i]$ .

V obeh zgoraj navedenih enačbah iščemo ničle polinoma. Če smo krivuljo  $\mathbf{f}$  aproksimirali s krivuljo stopnje 2 ali 3, potem lahko ti dve enačbi rešimo analitično, kar je v praksi najbolj učinkovita možnost.

## 2.4. Psevdo koda algoritma.

**Vhod:**  $(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\alpha, \beta], [\xi, \eta], k)$  : ravninski Bèzierjevi krivulji, njuni domeni in stopnja aproksimacijske krivulje

```

1: if  $|\alpha - \beta| < \epsilon$  in  $|\xi - \eta| < \epsilon$  then                                ustavitveni pogoj
2:   return  $[\alpha, \beta], [\xi, \eta]$ 
3: else
4:   if  $|\alpha - \beta| < |\xi - \eta|$  then                                       če ima  $\mathbf{f}$  manjšo domeno
5:      $\text{HybridClip}(\mathbf{g}, \mathbf{f}, [\xi, \eta], [\alpha, \beta], k)$                        zamenjamo vloži  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$ 
6:   else
7:      $L, C \leftarrow \text{fat line}(\mathbf{g}), \text{fat curve}(\mathbf{f})$                        aproksimiraj  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$ 
8:     Najdi intervale  $[\alpha_i, \beta_i]$ , kjer je  $L \cap C \neq \emptyset$ 
9:     if  $l > 0$  in  $\max_{i=1, \dots, l} \{|\alpha_i - \beta_i|\} \geq \frac{1}{2}|\alpha - \beta|$  then   aproksimacija ni dobra
10:      return  $\text{HybridClip}(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\alpha, \frac{1}{2}(\alpha + \beta)], [\xi, \frac{1}{2}(\xi + \eta)], k)$ 
            $\cup \text{HybridClip}(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\alpha, \frac{1}{2}(\alpha + \beta)], [\frac{1}{2}(\xi + \eta), \eta], k)$ 
            $\cup \text{HybridClip}(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\frac{1}{2}(\alpha + \beta), \beta], [\frac{1}{2}(\xi + \eta), \eta], k)$ 
            $\cup \text{HybridClip}(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\frac{1}{2}(\alpha + \beta), \beta], [\xi, \frac{1}{2}(\xi + \eta)], k)$ 
11:    else                                                                    aproksimacija je dobra
12:       $S \leftarrow \emptyset$ 
13:      for  $i = 1, \dots, l$  do
14:         $S \leftarrow S \cup \text{HybridClip}(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\alpha_i, \beta_i], [\xi, \eta], k)$    rekurziven klic
15:      end for
16:      return  $S$                                                                 vrnemo rezultat
17:    end if
18:  end if
19: end if

```

Klic funkcije  $\text{HybridClip}(\mathbf{f}, \mathbf{g}, [\alpha, \beta], [\xi, \eta], k)$  vrne pare intervalov  $[\alpha_i, \beta_i], [\xi_i, \eta_i]$ , ki vsebujejo vsa presečišča in so manjši od predpisanega  $\epsilon$ . Lahko se zgodi, da med njimi vrne tudi par intervalov, kjer se krivulji  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$  ne sekata, ampak le prideta blizu skupaj.

## 3. RED KONVERGENCE

### Trditev 3.1. *invarianca norm za afine transformacije*

*Dokaz.*

□

**Lema 3.2.** *Naj bo  $\mathbf{f}$  ravninska Bèzierjeva krivulja in  $\mathbf{p}$  njena optimalna  $L_2$  aproksimacija stopnje  $k$ . Potem obstaja konstanta  $C$ , da za poljuben interval  $[\alpha, \beta] \subseteq [0, 1]$  velja  $\|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_{BB}^{[\alpha, \beta]} \leq C|\alpha - \beta|^{k+1}$ .*

*Dokaz.* Spomnimo se, da za poljubni normi  $\|\cdot\|_1$  in  $\|\cdot\|_2$  na končno dimenzionalnem vektorskem prostoru  $V$  obstajata konstanti  $0 < C_1 \leq C_2$ , tako da je

$$C_1\|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq C_2\|v\|_2, \quad v \in V. \quad (2)$$

Zato obstajata konstanti  $D_1$  in  $D_2$ , da je  $\|\mathbf{r}\|_{BB}^{[\alpha,\beta]} \leq D_1\|\mathbf{r}\|_2^{[\alpha,\beta]}$  in  $\|\mathbf{r}\|_2^{[\alpha,\beta]} \leq D_2\|\mathbf{r}\|_\infty^{[\alpha,\beta]}$  za vsak  $\mathbf{r} \in \Pi_{[\alpha,\beta]}^n$ . Pri tem konstanti  $D_1$  in  $D_2$  nista odvisni od intervala  $[\alpha, \beta]$ , saj so po trditvi (3.1) norme invariantne glede na afine transformacije.

Od tod sledi, da je  $\|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_{BB}^{[\alpha,\beta]} \leq D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_2^{[\alpha,\beta]}$ . Naj bodo komponente  $\mathbf{q}_\alpha$  Taylorjevi polinomi stopnje  $k$  razviti okrog točke  $t = \alpha$  za vsako komponento krivulje  $\mathbf{f}$ . Potem velja

$$D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_2^{[\alpha,\beta]} \leq D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{q}_\alpha\|_2^{[\alpha,\beta]},$$

saj je  $\mathbf{p}$  optimalna  $L_2$  aproksimacija za  $\mathbf{f}$ . Iz (2) sledi, da je  $D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{q}_\alpha\|_2^{[\alpha,\beta]} \leq D_1D_2\|\mathbf{f} - \mathbf{q}_\alpha\|_\infty^{[\alpha,\beta]}$ . Spomnimo se, da lahko razliko med  $\mathbf{f}(t) - \mathbf{q}_\alpha(t)$  zapišemo v obliki

$$\mathbf{f}(t) - \mathbf{q}_\alpha(t) = \frac{\mathbf{f}^{(k+1)}(t_0)}{(k+1)!}(t - \alpha)^{k+1},$$

kjer je  $\mathbf{f}^{(k+1)}$   $(k+1)$ -vi odvod krivulje  $\mathbf{f}$  in kjer vse člene opazujemo po komponentah. Od tod dobimo oceno

$$D_1D_2\|\mathbf{f} - \mathbf{q}_\alpha\|_\infty^{[\alpha,\beta]} \leq \frac{\sqrt{2}}{(k+1)!}D_1D_2\max_{t \in [0,1]}\|\mathbf{f}^{(k+1)}(t_0)\||\alpha - \beta|^{k+1}.$$

□

**Lema 3.3.** *Naj bo  $\mathbf{f}$  ravninska Bèzierjeva krivulja stopnje  $n$ . Potem obstajajo konstante  $C_j$ , tako da za poljuben interval  $[\alpha, \beta] \subseteq [0, 1]$  in optimalno  $L_2$  aproksimacijo  $\mathbf{p}$  stopnje  $k$  od  $\mathbf{f}$  velja  $\|\mathbf{f}^{(j)} - \mathbf{p}^{(j)}\|_\infty \leq C_j|\alpha - \beta|^{k+1-j}$ , za  $j = 0, 1, \dots, k$ .*

*Dokaz.* Definirajmo novo normo z naslednjim predpisom

$$\|\mathbf{r}\|_*^{[\alpha,\beta]} = \|\mathbf{r}\|_\infty^{[\alpha,\beta]} + |\alpha - \beta|\|\mathbf{r}'\|_\infty^{[\alpha,\beta]} + \dots + |\alpha - \beta|^k\|\mathbf{r}^{(k)}\|_\infty^{[\alpha,\beta]}.$$

To je res norma, saj je  $\|\cdot\|_\infty$  norma. Po trditvi (3.1) in iz **neka referenca** sledi, da obstaja konstanta  $D_1$ , da je

$$\|\mathbf{r}\|_*^{[\alpha,\beta]} \leq D_1\|\mathbf{r}\|_2^{[\alpha,\beta]}.$$

S pomočjo te ocene lahko zapišemo

$$\begin{aligned} \|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_*^{[\alpha,\beta]} &= \|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_\infty^{[\alpha,\beta]} + |\alpha - \beta|\|\mathbf{f}' - \mathbf{p}'\|_\infty^{[\alpha,\beta]} + \dots + \\ &\quad + |\alpha - \beta|^k\|\mathbf{f}^{(k)} - \mathbf{p}^{(k)}\|_\infty^{[\alpha,\beta]} \leq D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_2^{[\alpha,\beta]} \end{aligned}$$

Sedaj podobno kot v lemi (3.2) s pomočjo Taylorjevega polinoma in izreka o ostanku ocenimo

$$\begin{aligned} D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{p}\|_2^{[\alpha,\beta]} &\leq D_1\|\mathbf{f} - \mathbf{q}_\alpha\|_2^{[\alpha,\beta]} \leq D_1D_2\|\mathbf{f} - \mathbf{q}_\alpha\|_\infty^{[\alpha,\beta]} \leq \\ &\quad \frac{\sqrt{2}}{(k+1)!}D_1D_2\max_{t \in [0,1]}\|\mathbf{f}^{(k+1)}(t_0)\||\alpha - \beta|^{k+1}. \end{aligned}$$

□

**Definicija 3.4.** *Naj bosta  $\mathbf{f}(t)$  in  $\mathbf{g}(s)$  ravninski Bèzierjevi krivulji s presečiščem  $\mathbf{z}_0 = \mathbf{f}(t_0) = \mathbf{g}(s_0)$ . Presečišče  $\mathbf{z}_0$  imenujemo:*

- transverzalno presečišče, če je  $\mathbf{f}'(t_0) \times \mathbf{g}'(s_0) \neq \mathbf{0}$ ,

- tangentno presečišče, če je  $\mathbf{f}'(t_0) \times \mathbf{g}'(s_0) = \mathbf{0}$  in  $\mathbf{f}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{g}'(s_0) \neq \mathbf{0}$ ,
- degenerirano presečišče, če je  $\mathbf{f}'(t_0) = \mathbf{0}$  ali  $\mathbf{g}'(s_0) = \mathbf{0}$ .

**Trditev 3.5.** Naj imata Bezierjevi krivulji  $\mathbf{f}$  in  $\mathbf{g}$  transversalno presečišče v  $\mathbf{f}(t_0) = \mathbf{g}(s_0)$ . Potem obstajajo konstante  $C_f, C'_f, C_g$  in  $C'_g$ , da za dovolj velike  $i \in \mathbb{N}$  velja

$$|\alpha_{i+1} - \beta_{i+1}| \leq C_f |\alpha_i - \beta_i|^{k+1} + C_g |\xi_i - \eta_i|^2 \quad (3)$$

oz.

$$|\xi_{i+1} - \eta_{i+1}| \leq C'_f |\alpha_i - \beta_i|^2 + C'_g |\xi_i - \eta_i|^{k+1}. \quad (4)$$

*Dokaz.* Dokazali bomo le neenakost (3), saj je dokaz za (4) podoben.

Naj bosta  $[\alpha_i, \beta_i]$  in  $[\xi_i, \eta_i]$  zaporedji intervalov, ki jih algoritem generira. Oglejmo si kako se algoritem obnaša za velike  $i$ . Ker se dolžine intervalov v vsakem koraku zmanjšajo vsaj za polovico, je

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |\alpha_i - \beta_i| = 0 \quad \text{in} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} |\xi_i - \eta_i| = 0.$$

Sledi, da  $\mathbf{b}_0 \mathbf{b}_m$  konvergira proti tangenti  $\mathbf{g}'(s_0)$ . Zato gre normala  $\mathbf{n}$  na  $\mathbf{b}_0 \mathbf{b}_m$  proti normalni  $\mathbf{n}_0$  na  $\mathbf{g}(s_0)$ .

Naj bo  $\omega = \mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{f}'(t_0)$ . Po predpostavki je  $\mathbf{f}'(t_0) \times \mathbf{g}'(s_0) \neq \mathbf{0}$ , torej je  $\omega \neq 0$ .

Oglejmo si situacijo v  $i$ -tem koraku algoritma, ki jo prikazuje slika (??). Velja

$$|\alpha_{i+1} - \beta_{i+1}| = h_{i+1,\mathbf{f}} \leq L_{i+1} = l_{i+1,1} + l_{i+1,2} + l_{i+1,3}.$$

Želimo oceniti člene na desni strani neenakosti. Ker je  $\frac{\omega}{4} = \frac{d_{\max} - d_{\min}}{l_{i+1,1} + l_{i+1,3}}$  je

$$l_{i+1,1} + l_{i+1,3} = \frac{4(d_{\max} - d_{\min})}{\omega}. \quad (5)$$

Želimo oceniti še člen  $l_{i+1,2}$ . V ta namen si najprej oglejmo ali sta funkciji  $d_1(t)$  in  $d_2(t)$  naraščajoči. Najprej opazimo, da obstaja tak  $\epsilon_1 > 0$ , da je za dovolj velike  $i$

$$|d'(t_0) - \omega| = |\mathbf{n} \cdot \mathbf{f}'(t_0) - \mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{f}'(t_0)| < \frac{\omega}{4}, \quad (6)$$

ko je  $|\xi_i - \eta_i| < \epsilon_1$ , saj gre  $\mathbf{n}$  proti  $\mathbf{n}_0$ , ko  $i \rightarrow \infty$ . Obstaja tudi tak  $\epsilon_2 > 0$ , da je za dovolj velike  $i$

$$\|\mathbf{f}'(t) - \mathbf{f}'(t_0)\| < \frac{\omega}{4}, \quad (7)$$

ko je  $|\alpha_i - \beta_i| < \epsilon_2$  saj je  $\mathbf{f}'$  zvezna. Dalje obstaja tudi tak  $\epsilon_3 > 0$ , da za dovolj velike  $i$  velja

$$|d'(t) - d'_1(t)| < \frac{\omega}{4}, \quad (8)$$

ko je  $|\alpha_i - \beta_i| < \epsilon_3$ , saj po lemi (3.3) velja

$$|d'(t) - d'_1(t)| = |\mathbf{n} \cdot (\mathbf{f}'(t) - \mathbf{p}'(t))| \leq \|\mathbf{f}'(t) - \mathbf{p}'(t)\| \leq \|\mathbf{f}'(t) - \mathbf{p}'(t)\|_{\infty}^{[\alpha, \beta]} \leq C |\alpha_i - \beta_i|^k.$$

Naj bo  $\epsilon_4 = \min(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ . S pomočjo ocen (6) in (7) lahko ocenimo

$$\begin{aligned} |d'(t) - \omega| &= |\mathbf{n} \cdot \mathbf{f}'(t) - \mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{f}'(t_0)| \\ &\leq |\mathbf{n} \cdot \mathbf{f}'(t) - \mathbf{n} \cdot \mathbf{f}'(t_0)| + |\mathbf{n} \cdot \mathbf{f}'(t_0) - \mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{f}'(t_0)| \\ &\leq \|\mathbf{f}'(t) - \mathbf{f}'(t_0)\| + |d'(t_0) - \omega| \\ &\leq \frac{\omega}{4} + \frac{\omega}{4} = \frac{\omega}{2}, \end{aligned}$$

za vse dovolj velike  $i$ , tako da je  $|\alpha_i - \beta_i| < \epsilon_4$  in  $|\xi_i - \eta_i| < \epsilon_4$ . Zato je

$$d'(t) < \frac{\omega}{2}, \quad (9)$$

in skupaj z (8) dobimo, da je  $d'_1(t) = d'_2(t) > \frac{\omega}{4}$ . Torej smo ugotovili, da sta funkciji  $d_1(t)$  in  $d_2(t)$  strogo naraščajoči na dovolj poznih intervalih  $[\alpha_i, \beta_i]$ .

Od tod sledi, da za poljuben  $y_0$ , za katerega velja  $d_1(\alpha_i) < y_0 < d_2(\beta_i)$ , velja, da imata enačbi  $d_1(t) = y_0$  in  $d_2(t) = y_0$  rešitvi  $t_1$  in  $t_2$  na intervalu  $[\alpha_i, \beta_i]$ . Zato je

$$l_{i+1,2} \leq \sup_{y_0 \in (d_1(\alpha_i), d_2(\beta_i))} \{|t_1 - t_2|; d_1(t_1) = d_2(t_2) = y_0\}.$$

Če najdemo oceno za  $|t_1 - t_2|$ , potem lahko s pomočjo zgornje enačbe ocenimo  $l_{i+1,2}$ . Oceno za  $|t_1 - t_2|$  bomo dobili na sledeč način. Opazimo, da za  $d_1(t_1) = d_2(t_2) = y_0$  velja

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p}(t_1) - \mathbf{p}(t_2)) = 2\delta,$$

kjer je  $\delta$  kot v **delta**. Naj bo  $\mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))$ . Potem po Lagrange-ovem izreku o srednji vrednosti obstajata takšna  $t^*$  in  $t^\diamond$ , da je

$$\mathbf{p}(t_1) - \mathbf{p}(t_2) = (x(t_1) - x(t_2), y(t_1) - y(t_2)) = (x'(t^*)(t_1 - t_2), y'(t^\diamond)(t_1 - t_2)).$$

Od tod dobimo oceno

$$\begin{aligned} & |\mathbf{n} \cdot (x'(t^*), y'(t^\diamond)) - d'(t)| \\ &= |\mathbf{n}(x'(t^*), y'(t^\diamond)) - \mathbf{n} \cdot \mathbf{f}'(t)| \\ &\leq \|(x'(t^*), y'(t^\diamond)) - \mathbf{f}'(t)\| \\ &= \|(x'(t^*), y'(t^*)) - \mathbf{f}'(t) + (0, y'(t^\diamond)) - (0, y'(t^*))\| \\ &\leq \|\mathbf{p}'(t^*) - \mathbf{f}'(t)\| + \|\mathbf{p}'(t^\diamond) - \mathbf{p}'(t^*)\| \\ &\leq \|\mathbf{p}'(t^*) - \mathbf{p}'(t)\| + \|\mathbf{p}'(t) - \mathbf{f}'(t)\| + \|\mathbf{p}'(t^\diamond) - \mathbf{p}'(t^*)\| \\ &\leq 2 \max_{t^1, t^2 \in [\alpha_i, \beta_i]} \|\mathbf{p}'(t^1) - \mathbf{p}'(t^2)\| + \|\mathbf{p}'(t) - \mathbf{f}'(t)\|_{\infty}^{[\alpha_i, \beta_i]}. \end{aligned}$$

Po lemi (3.3) in ker je  $\mathbf{p}'(t)$  enakomerno zvezna na  $[\alpha_i, \beta_i]$  obstaja  $\epsilon_5 > 0$ , da za dovolj velike  $i$  velja

$$\begin{aligned} \max_{t^1, t^2 \in [\alpha_i, \beta_i]} \|\mathbf{p}'(t^1) - \mathbf{p}'(t^2)\| &< \frac{\omega}{16}, \\ \|\mathbf{p}'(t) - \mathbf{f}'(t)\|_{\infty}^{[\alpha_i, \beta_i]} &< \frac{\omega}{8}, \end{aligned}$$

ko je  $|\alpha_i - \beta_i| < \epsilon_5$ . Naj bo  $\epsilon_0 = \min(\epsilon_4, \epsilon_5)$ . Potem je

$$|\mathbf{n} \cdot (x'(t^*), y'(t^\diamond)) - d'(t)| < \frac{\omega}{4},$$


ko je  $|\alpha_i - \beta_i| < \epsilon_0$  in  $|\xi_i - \eta_i| < \epsilon_0$ . Če (9) kombiniramo z zgornjo neenakostjo dobimo oceno

$$\mathbf{n} \cdot (x'(t^*), y'(t^\diamond)) > \frac{\omega}{4}.$$

Ker je  $2\delta_i = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{p}(t_1) - \mathbf{p}(t_2)) = (t_1 - t_2)\mathbf{n} \cdot (x'(t^*), y'(t^\diamond))$ , dobimo

$$|t_1 - t_2| < \frac{2\delta_i}{\omega/4} = \frac{8\delta_i}{\omega}.$$

□



SLIKA 4. Situacija v  $i$ -tem koraku algoritma.

#### 4. EKSPERIMENTALNI REZULTATI

V [2] so narejeni eksperimentalni testi metode hibridnih izrezkov. Implementirani sta aproksimaciji s krivuljo stopnje 2 in 3 ter narejene primerjave z metodo Bèzierjevih izrezkov za vse tri različne tipe presečišč in za krivulji z več kot enim presečiščem. Izkaže se, da je tudi v praksi konvergenca metode hibridnih izrezkov boljša. Pri tem je aproksimacija s krivuljo stopnje 2 pogosto boljša kot aproksimacija s krivuljo stopnje 3, razlog pa je verjetno računsko manj zahtevna aproksimacija. Primerjave so prikazane na sliki (5) (povzeto po [2]).


#### 5. ZAKLJUČEK

Predstavili smo metodo hibridnih izrezkov, ki omogoča izračun presečišč dveh ravninskih Bèzierjevih krivulj. Algoritem temelji na aproksimaciji ene in druge krivulje z območjema, ki krivulji vsebujeta (vsak eno), in zmanjšanjem domene le na tiste dele, kjer je presek območij neprazen. Na ta način dobimo zaporedje vedno manjših intervalov, ki konvergirajo proti presečiščem.

Pokazali smo, da je v primeru transversalnih presečišč konvergenca vsaj kvadratična. Tega nismo mogli pokazati za primer tangentnih in degeneriranih presečišč. V primeru tangentnih presečišč algoritem degenerira v metodo *deli in vladaj*, saj območja ne omejujejo krivulj dobro. V primeru degeneriranih presečišč je aproksimacija boljša. Podobno sliko pokažejo tudi eksperimentalni rezultati. Hitrost konvergence transversalnih presečišč je najboljša, hitro sledijo degenerirana presečišča in precej slabše se odrežejo tangentna presečišča.

Zaključimo, da je metoda hibridnih izrezkov uporabna tudi v praksi, saj najde vsa presečišča in je hitrejša od metode Bèzierjevih izrezkov. Možnosti za posplošitev metode hibridnih izrezkov vključujejo izračun presečišč dveh racionalnih Bèzierjevih krivulj in izračun preseka dveh Bèzierjevih ploskev.





SLIKA 5. Primerjave časovne zahtevnosti.

## LITERATURA

- [1] Sederberg T., Nishita T., *Curve intersection using Bèzier clipping*, Comput. Aided Des., 1990, 538–49.
- [2] Qi Lou, Ligang Liu, *Curve intersection using hybrid clipping*, Computers and Graphics, 36 (5), 2012, 309–320.