

# 게임 수학 강의 노트 03 - 벡터 연산


강영민

동명대학교

2015년 2학기



# 벡터의 덧셈

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_x + w_x, v_y + w_y, v_z + w_z)$$



# 벡터의 뺄셈

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = (v_x - w_x, v_y - w_y, v_z - w_z)$$



# 벡터에 스칼라 곱하기

벡터는 크기만을 가진 스칼라와 곱할 수 있다. 어떤 스칼라 값  $s$ 가 있다고 하자, 이 스칼라 값과 벡터  $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 를 곱한  $s\mathbf{v}$ 는 다음과 같다.

$$s\mathbf{v} = (sv_x, sv_y, sv_z)$$

# 벡터의 기본적인 연산 규칙

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

$$\mathbf{a} + \vec{0} = \vec{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{a} - \mathbf{a} = \vec{0}$$

$$(k + l)\mathbf{a} = k\mathbf{a} + l\mathbf{a}$$

$$(kl)\mathbf{a} = k(l\mathbf{a})$$

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a}$$

$$0\mathbf{a} = \vec{0}$$


$$(-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}$$

# 벡터의 스칼라 곱, 혹은 내적(dot product)

- 내적

- 스칼라 곱(scalar product)라고도 부름
- 두 개의 벡터를 피연산자(operand)로 하는 이항 연산(binary operator)로서 그 결과가 스칼라 값
- 두 벡터  $\mathbf{a}$ 와  $\mathbf{b}$ 의 내적은  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 로 표현
- 두 벡터가 이루는 사잇각이  $\theta$ 라고 하며, 내적의 크기는 다음과 같다.
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$
- 실제 계산 방법
  - $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = \sum_{i=1}^n a_ib_i$


# 벡터 내적의 의미



$$l_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}} = \|\mathbf{a}\| \cos \theta$$

$$l_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}} = (\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta) / \|\mathbf{b}\|$$

$$l_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} / \|\mathbf{b}\|$$



$$l_{\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a}} = \|\mathbf{b}\| \cos \theta$$

$$l_{\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a}} = (\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta) / \|\mathbf{a}\|$$

$$l_{\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a}} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} / \|\mathbf{a}\|$$

# 벡터 내적의 활용

- 코사인 함수의 특성을 통해 간단히 얻어지는 사실
  - $\theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$
  - $\theta = \pi/2 \Rightarrow \cos \theta = 0, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2$
- 벡터를 이용하여 각도를 계산하거나 투영을 계산하는 데에 널리 사용
  - $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta$
  - $\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}$
  - $\theta = \cos^{-1} \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}$
  - $\theta = \cos^{-1} \frac{v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \sqrt{w_x^2 + w_y^2 + w_z^2}}$



# 벡터 내적의 활용

## 예제

어떤 두 벡터가 각각 (3,2)와 (4,1)이라고 하자. 두 벡터가 이루는 각도를 구하라.

## 정답

두 벡터를 각각  $\mathbf{v}$ 와  $\mathbf{w}$ 로 표현하자. 두 벡터의 내적  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ 는  $3 \cdot 4 + 2 \cdot 1$ , 즉 14이다. 각각의 길이는  $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$ 과  $\|\mathbf{w}\| = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$ 이다. 따라서 두 벡터의 사이각은 다음과 같다.

$$\theta = \cos^{-1} \frac{14}{\sqrt{13}\sqrt{17}} = \cos^{-1} \frac{14}{\sqrt{221}} \simeq \cos^{-1} 0.94174191159484 \simeq 19.65^\circ$$