



# 厦门大学《微积分 I-1》课程期末试卷答案

试卷类型：(理工类 A 卷) 考试日期 2023.02.18

## 一、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 若  $\int f(x) dx = x^2 + C$ , 则  $\int xf(1-x^2) dx =$  ( D )。

(A)  $2(1-x^2)^2 + C$ ; (B)  $-2(1-x^2)^2 + C$ ; (C)  $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$ ; (D)  $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$ 。

2. 定积分  $\int_0^2 \sqrt{2x-x^2} dx =$  ( B )。

(A)  $\frac{\pi}{4}$ ; (B)  $\frac{\pi}{2}$ ; (C)  $\pi$ ; (D)  $\frac{\pi}{8}$ 。

3. 设  $a = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ ,  $b = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx$ , 则 ( C )。

(A)  $a > b > 1$ ; (B)  $1 > a > b$ ; (C)  $b > a > 1$ ; (D)  $1 > b > a$ 。

4. 对于  $\int_0^3 \frac{dx}{x^2 - x - 2}$ , 下列说法正确的是 ( D )。

(A) 其值为  $-\ln 2$ ; (B) 其值为  $\ln 2$ ; (C) 其值为  $2\ln 2$ ; (D) 发散。

## 二、填空题: (每小题 4 分, 共 24 分)

1. 两条抛物线  $y = x^2$  与  $x = y^2$  所围图形的面积为  $\frac{1}{3}$ 。

2.  $\int_{-1}^1 \frac{(\sin x + \cos x)^2}{1 + |x|} dx = 2\ln 2$ 。

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+xt) dt}{x^3} = \frac{1}{2}$ 。

4.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1^2} + 2\sqrt{n^2+2^2} + 3\sqrt{n^2+3^2} + \cdots + n\sqrt{n^2+n^2}}{n^3} = \frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$ 。

5.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx = \frac{1}{5}(e^{\frac{\pi}{2}} - 2)$ 。

6. 若  $f(x) = 3x + 4 \int_0^1 t f(t) dt$ , 则  $f(2) = 2$ 。

三、(8 分) 设函数  $f(x)$  满足  $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$ ，其中  $C$  为任意常数，求不定积分  $\int f(x)dx$ 。

解：由  $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$ ，得  $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$ 。因此

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx = \int \frac{x}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx = \int \frac{1}{-x^2}d\sqrt{1-x^2} = \int \frac{1}{(\sqrt{1-x^2})^2-1}d\sqrt{1-x^2} \\ &= \frac{1}{2}\ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}} + C = \ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|} + C\end{aligned}$$

或者  $\int f(x)dx = \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx$ ，令  $x = \sin t, t \in (-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$ ，则  $\sqrt{1-x^2} = \cos t$ ，代入得，

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx &= \int \frac{1}{\sin t \cos t} d\sin t = \int \frac{1}{\sin t} dt = \ln |\csc t - \cot t| + C \\ &= \ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|} + C.\end{aligned}$$

四、求下列定积分（每小题 8 分，共 16 分）：

1.  $\int_1^{16} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx;$

解：令  $t = \sqrt[4]{x}$ ，则

$$\begin{aligned}\int_1^{16} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} dx &= \int_1^2 \frac{1}{t^2 + t} dt^4 = 4 \int_1^2 \frac{t^2}{t+1} dt = 4 \int_1^2 t - 1 + \frac{1}{t+1} dt \\ &= [2t^2 - 4t + 4\ln(t+1)] \Big|_1^2 = 2 + 4\ln 3 - 4\ln 2.\end{aligned}$$

2.  $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx.$

解法一：  $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 |\ln x| dx + \int_1^e |\ln x| dx = -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx + \int_1^e \ln x dx$

$$= -(x \ln x - x) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 + (x \ln x - x) \Big|_1^e = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} + (e - e + 1) = 2 - \frac{2}{e}.$$

解法二:  $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx \stackrel{t=\ln x}{=} \int_{-1}^1 |t| de^t = \int_{-1}^1 |t| e^t dt = \int_0^1 t(e^t + e^{-t}) dt$

$$= \int_0^1 t d(e^t - e^{-t}) = t(e^t - e^{-t}) \Big|_0^1 - \int_0^1 (e^t - e^{-t}) dt = t(e^t - e^{-t}) \Big|_0^1 - (e^t + e^{-t}) \Big|_0^1$$

$$= 2 - \frac{2}{e}.$$

五、(8分) 求反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{(x+1)^2}{(x^2+1)^2} dx$ 。

解:  $\int_0^{+\infty} \frac{(x+1)^2}{(x^2+1)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2+1+2x}{(x^2+1)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2} d(x^2+1) = \arctan x \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{x^2+1} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \arctan x \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{x^2+1} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - 0 - (0-1) = \frac{\pi}{2} + 1.$$

六、(10分) 设两条曲线  $y = \sec^2 x$ 、 $y = \cos 2x$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ) 和直线  $x = \frac{\pi}{4}$  所围成的平面图形为 D。试求该平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所形成的立体的体积 V。

解:  $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x)^2 dx - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2x)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4 x dx - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2x dx$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^2 x + 1) d \tan x - \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos 4x}{2} dx = \pi \left( \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \pi \left( \frac{1}{2} x + \frac{\sin 4x}{8} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{4}{3} \pi - \frac{1}{8} \pi^2.$$

七、(10分) 在摆线  $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 上求分该曲线的弧长成 3:1 的点的坐标。

解: 令该点坐标为  $(x_0, y_0)$ , 其对应的参数  $t = t_0$ , 则  $\pi \leq t_0 \leq 2\pi$ 。注意到

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + (\sin t)^2} dt$$

$$= \sqrt{2 - 2 \cos t} dt = 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt,$$

从而整条摆线全长为  $s = \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt = 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8$ ,

摆线对应于  $0 \leq t \leq t_0$  的那一段曲线弧长为

$$s_1 = \int_0^{t_0} 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt = 2 \int_0^{t_0} \sin \frac{t}{2} dt = -4 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{t_0} = -4 \cos \frac{t_0}{2} + 4。$$

根据题意, 有  $s_1 = \frac{3}{4}s$ , 故  $-4 \cos \frac{t_0}{2} + 4 = 6$ , 进而有  $\cos \frac{t_0}{2} = -\frac{1}{2}$ , 解得  $t_0 = \frac{4}{3}\pi$ , 因此该点坐

$$\text{标为 } (x_0, y_0) = (t - \sin t, 1 - \cos t) \Big|_{t=\frac{4}{3}\pi} = \left( \frac{4}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2} \right)。$$

八、(8分) 设函数  $f(x)$  在区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上连续, 在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内可导, 且  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 0$ 。证明:

存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使得  $f'(\xi) = f(\xi) \tan \xi$ 。

**证明:** 作辅助函数  $\varphi(x) = f(x) \cos x$ ,  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 则  $\varphi(x)$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  连续, 在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内可导。

由积分中值定理, 存在  $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使得  $0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = f(x_0) (\frac{\pi}{2} - 0)$ , 即有  $f(x_0) = 0$ 。因

此  $\varphi(x_0) = \varphi(\frac{\pi}{2}) = 0$ , 在  $[x_0, \frac{\pi}{2}]$  上用罗尔定理, 可知存在  $\xi \in (x_0, \frac{\pi}{2}) \subset (0, \frac{\pi}{2})$ , 使得

$\varphi'(\xi) = 0$ , 结论得证。