

历届试题选 (六) 解答

一、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(0) \cdot f(2) > 0$, $f(0) \cdot f(1) < 0$. 证

明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 2f(\xi)$. (2016—2017)

证明: 因为函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) \cdot f(2) > 0$, $f(0) \cdot f(1) < 0$, 由零点定理,

存在 $x_1 \in (0, 1)$, $x_2 \in (1, 2)$, 使得 $f(x_1) = 0$, $f(x_2) = 0$.

作辅助函数 $F(x) = f(x)e^{-2x}$, 则 $F'(x) = f'(x)e^{-2x} - 2f(x)e^{-2x}$.

因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 故 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 内可导,

且 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi)e^{-2\xi} - 2f(\xi)e^{-2\xi} = 0,$$

移项后可得 $f'(\xi) = 2f(\xi)$.

二、设函数 $f(x)$ 在 $[0, n]$ 上连续 (n 为自然数, $n \geq 2$), $f(0) \neq f(n)$. 证明: 存在

$\xi, \xi+1 \in [0, n]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi+1)$. (2016—2017)

证明: 由已知条件, 可得 $F(0) + F(1) + \cdots + F(n-1) = f(0) - f(n) \neq 0$.

如果 $F(0) = F(1) = \cdots = F(n-1) = 0$, 则可取 $\xi = k (k = 0, 1, \cdots, n-1)$.

如果存在某个整数 $k (0 \leq k \leq n-1)$, 使得 $F(k) \neq 0$, 由 $F(0) + F(1) + \cdots + F(n-1) \neq 0$ 知,

一定能找到另一个整数 $l (0 \leq l \leq n-1)$, 使得 $F(k)F(l) < 0$.

由于 $f(x)$ 在 $[0, n]$ 上连续, 由零点定理, 在 k 和 l 之间必存在点 ξ , 使得 $F(\xi) = 0$, 即

$f(\xi) = f(\xi+1)$.

显然, $\xi \in [0, n-1]$, $\xi+1 \in [0, n]$.

三、设函数 $f(x)$ 在 \mathbb{R} 上三阶可导, 并且满足 $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq 1, |f'''(x)| \leq 1$. 证明:

$\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)|^3 \leq \frac{9}{8}$. (2016—2017)

证明：由已知条件和泰勒公式，有

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + \frac{1}{2!}f''(x)(t-x)^2 + \frac{1}{3!}f'''(\xi)(t-x)^3,$$

其中 ξ 介于 x 和 t 之间.

任取 $h > 0$ ，分别将 $t = x+h$ 及 $t = x-h$ 代入上式，得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2!}f''(x)h^2 + \frac{1}{3!}f'''(\xi_1)h^3,$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2!}f''(x)h^2 - \frac{1}{3!}f'''(\xi_2)h^3.$$

其中 $x-h < \xi_2 < x < \xi_1 < x+h$.

两式相减，有

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + \frac{1}{3!}f'''(\xi_2)h^3 + \frac{1}{3!}f'''(\xi_1)h^3,$$

即,
$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{1}{3!}f'''(\xi_2)h^2 - \frac{1}{3!}f'''(\xi_1)h^2.$$

于是,
$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq \frac{|f(x+h)| + |f(x-h)|}{2h} + \frac{1}{2 \cdot 3!}|f'''(\xi_2)|h^2 + \frac{1}{2 \cdot 3!}|f'''(\xi_1)|h^2 \\ &\leq \frac{2}{2h} + \frac{1}{2 \cdot 3!}h^2 + \frac{1}{2 \cdot 3!}h^2 = \frac{1}{h} + \frac{1}{6}h^2. \end{aligned}$$

令 $\frac{1}{2h} = \frac{1}{6}h^2$ (或令 $(\frac{1}{h} + \frac{1}{6}h^2)' = 0$), 有 $h = \sqrt[3]{3}$, 则有 $|f'(x)| \leq \frac{6+h^3}{6h} \leq \frac{9}{8}$.

四、设函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f(2) = 2f(1)$. 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$,

使得 $\xi f'(\xi) - f(\xi) = 0$. (2017—2018)

证明: 作辅助函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, 于是, $F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$.

由于函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 则函数 $F(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导.

因为 $f(2) = 2f(1)$, 故 $F(1) = \frac{f(1)}{1} = f(1) = \frac{f(2)}{2} = F(2)$.

由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2} = 0$, 也即

$\xi f'(\xi) - f(\xi) = 0$.

五、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有连续的二阶导数. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$,

$$\text{使得 } f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi). \quad (2017-2018)$$

证明: 由泰勒公式,

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2, \quad \xi \text{ 介于 } x \text{ 和 } \frac{a+b}{2} \text{ 之间.}$$

分别取 $x = a$, $x = b$, 得

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\frac{(b-a)^2}{4},$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\frac{(b-a)^2}{4},$$

$$\text{其中 } a < \xi_1 < \frac{a+b}{2} < \xi_2 < b.$$

两式相加, 得

$$\begin{aligned} f(a) + f(b) &= 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\frac{(b-a)^2}{4} \\ &= 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)], \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有连续的二阶导数, 所以, $f''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 故 $f''(x)$ 在

$[\xi_1, \xi_2]$ 上取得最大值 M 和最小值 m .

$$\text{于是, } m \leq \frac{1}{2}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)] \leq M.$$

由连续函数的介值定理, 存在 $\xi \in [\xi_1, \xi_2]$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]$.

$$\text{故 } f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

六、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且有 $f(0) = 0$, $f(1) + f(2) = 2$,

$f(3) = 4$. 证明: (1) 至少存在一点 $\xi \in [1, 2]$, 使得 $f(\xi) = 1$; (2) 至少存在一点 $\eta \in (0, 3)$,

使得 $f'(\eta) = 1$. (2018—2019)

证明: (1) 作辅助函数 $\varphi(x) = f(x) - 1$.

容易得到, $\varphi(1) + \varphi(2) = f(1) + f(2) - 2 = 0$, 即 $\varphi(1)\varphi(2) \leq 0$.

如果 $\varphi(1) = 0$, 即 $f(1) = 1$, 取 $\xi = 1$.

如果 $\varphi(1) \neq 0$, 则 $\varphi(1) < 0$, 由零点定理, 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $\varphi(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1$.

(2) 作辅助函数 $F(x) = f(x) - x$,

由 (1) 知, $\xi \in [1, 2]$, $f(\xi) = 1$. 于是, $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 1 - \xi \leq 0$, 而

$F(3) = f(3) - 3 = 4 - 3 > 0$, 由零点定理, 存在 $c \in [\xi, 3]$, 使得 $F(c) = 0$.

因为函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 则函数 $F(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续, 在 $(0, c)$ 内可导, 且 $F(c) = F(0) = 0$.

由罗尔定理, 存在 $\eta \in (0, c) \subset (0, 3)$, 使得 $F'(\eta) = 0$, 即 $f'(\eta) = 1$.

七、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1$, $f(1) = 0$. 试证: (1) 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = x_0$; (2) 存在不同的 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$. (2019—2020)

证明: 作辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$F(0) = f(0) = 1 > 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0.$$

由零点定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$.

(2) 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x_0)$, $\eta \in (x_0, 1)$

$$f(x_0) - f(0) = f'(\xi)(x_0 - 0), \quad \text{即 } x_0 - 1 = f'(\xi)x_0,$$

$$f(1) - f(x_0) = f'(\eta)(1 - x_0), \quad \text{即 } -x_0 = f'(\eta)(1 - x_0).$$

两式相乘, 可得 $-x_0(x_0 - 1) = f'(\eta)(1 - x_0)f'(\xi)x_0$, 即 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

八、设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(1) + f(2) = 0$. 证明存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$. (2020—2021)

证明: 首先证明在 $[1, 2]$ 中存在一点 c , 使得 $f(c) = 0$.

如果 $f(1) = f(2) = 0$, 则取 $c = 1$ 或 $c = 2$.

如果 $f(1) \neq 0$, 因为 $f(1) + f(2) = 0$, 则 $f(1)f(2) < 0$, 由 $f(x)$ 的连续及零点定理, 存在 $c \in (1, 2)$, 使得 $f(c) = 0$.

作辅助函数 $F(x) = xf(x)$.

由于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 可得 $F(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续, 在 $(0, c)$ 内可导, 且

$$F(0) = 0, F(c) = cf(c) = 0.$$

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

九、设 $a > b > 0$, 证明: $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$. (2020—2021)

证明: 利用拉格朗日中值定理, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b = \frac{1}{\xi}(a-b)$, 其中 $b < \xi < a$.

由 $\frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$, 得 $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$.

十、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 且有 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = -1$.

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$. (2021—2022)

证明: 作辅助函数 $F(x) = f(x)e^{-x}$.

由 $f(1) = 1$, $f(2) = -1$, 即 $f(1)f(2) < 0$. 有连续函数的零点定理, 存在 $c \in (1, 2)$, 使得 $f(c) = 0$.

因为函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 则函数 $F(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续, 在 $(0, c)$ 内可导, 且 $F(0) = F(c) = 0$. 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$, 使得

$$F'(\xi) = f'(\xi)e^{-\xi} + f(\xi)(-e^{-\xi}) = 0,$$

$$\text{即 } f'(\xi) = f(\xi).$$