

Capa

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Norma Regulamentadora NR 7
Portaria 3214/78 alterada pelas Portarias
24 de 29/12/1994 e 08 de 08/05/1996 e
Portaria SEPRT N.º 6.734, de 10/03/2020

CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA

08/12/2025

NORMA REGULAMENTADORA - NR7

O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) visa atender o disposto na Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, e Normas Regulamentadoras, especificamente a NR-7, de 08/06/1978, com modificações do texto através de portarias anteriores.

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. Estabelece, ainda, os parâmetros e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO.

OBJETIVO

Cumprir a Portaria nº 24 de 29/12/94 e alterada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, que estabelece novo texto da Norma Regulamentadora NR-7 promovendo o "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional" - PCMSO, com finalidade de promoção e manutenção da saúde do trabalhador.

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização (empresa).

O PCMSO visa o monitoramento biológico da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, contribuindo positivamente nos seguintes pontos:

- ✓ Diminuição do absenteísmo por motivos médicos ocupacionais;
- ✓ Melhoria na produtividade;
- ✓ Melhoria na qualidade de vida no trabalho;
- ✓ Melhoria das relações do trabalho;
- ✓ Aumento do comprometimento e satisfação dos colaboradores com a empresa.

O PCMSO pode ser alterado caso houver revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ou AET (Análise Ergonômica do Trabalho), ao detectar mudanças nos riscos ocupacionais passíveis de controle biológico, convenção coletiva do trabalho ou por determinação legal ou de órgão fiscalizador ou quando de sua revisão anual.

Alterações também podem surgir quando o médico detectar novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes; mudança de critérios de interpretação dos exames.

Deve haver a correlação do PCMSO com o ambiente de Trabalho, guardando a estreita relação com as características do ambiente e com os riscos inerentes à natureza e à organização do trabalho.

DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa harmonizado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR-1, NR-9, NR-17 e NR-18.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na empresa;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada os empregados, cujos estados de saúde possam ser especialmente

afetados pelos riscos ocupacionais;
j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
k) subsidiar ações de readaptação profissional;
l) monitorar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

Obs: A responsabilidade técnica- médica pelo PCMSO tem a vigência do período contratual com o Seconci-GO, em caso de não renovação do contrato ou cancelamento do mesmo a responsabilidade técnica cessa a partir da data desta rescisão.

PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

São considerados riscos ocupacionais para fins de monitoramento biológico e vigilância à saúde (e, portanto, constar em ASO), os agentes físicos, químicos e biológicos, reconhecido no PGR, que quantitativamente estão acima do nível de ação determinados na NR-09, ou o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Exceção aos riscos de poeiras, no qual, seguiremos conforme anexo III da NR-07. Assim também, para os agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR-07.

Os agentes que não possuem limites de tolerância, ou seja, que não possuem concentração ou intensidade máxima ou mínima identificada como segura, capaz de causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, devem determinar monitoramento biológico e vigilância à saúde sempre que reconhecidos.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A empresa deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
- e) Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa;

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da empresa, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
DESENVOLVIMENTO		
O desenvolvimento PCMSO deverá incluir a realização de exames médicos ocupacionais que incluem a avaliação clínica constituída pela anamnese ocupacional, exame físico e mental, bem como a realização de exames complementares conforme o risco ocupacional a que o trabalhador estiver exposto.		
RESPONSABILIDADES		
1) Da empresa: a) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO; b) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO; c) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. 2) Do Médico Responsável pelo PCMSO a) Elaborar e implementar o PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores; b) Planejar, analisar, controlar e acompanhar o desenvolvimento e execução do PCMSO e seus resultados; c) Elaborar o Relatório Analítico do PCMSO; d) Realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar a realização dos mesmos aos médicos examinadores; e) Gerenciar os casos que apresentem algum comprometimento da saúde relacionado ao trabalho ou não, decorrente dos exames médicos e/ou complementares; f) Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. g) Informar à empresa, constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR-07. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho. h) Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO. i) Avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. j) Prestar esclarecimentos, quando solicitado sobre os problemas de saúde ocupacional, respeitando o princípio ético do sigilo médico. k) Discutir conjuntamente com os profissionais da área de Segurança do Trabalho e/ ou Meio Ambiente, medidas preventivas quanto à melhoria do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa. 3) Do Médico Examinador a) Executar os exames médicos: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissionais, examinando os trabalhadores, avaliando os resultados dos exames complementares, informando aos mesmos os resultados dos exames; b) Comunicar o Médico Responsável pelo PCMSO e ao empregado, sempre que necessário, ao constatar uma ocorrência ou agravamento de doenças do trabalho ou ocupacionais, através de exames médicos, ou ao verificar as alterações que revelem qualquer tipo de disfunção; c) Indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho; d) Quando orientado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causais, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.		

4) Do Empregado

- a) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- b) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- c) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela empresa;
- d) Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança, saúde e meio ambiente, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;
- e) Comunicar imediatamente, ao médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando acometido por problemas de saúde.

EXAME MÉDICO OCUPACIONAL**1) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO**

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O médico examinador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias:

- 1.** A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da Fiscalização do Trabalho;
- 2.** A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via;
- 3.** A terceira via do ASO ficará arquivada no SECONCI-GO, dentro do prontuário médico do paciente.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) Razão social e CNPJ da empresa;
- b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO;
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas (trabalho em altura e trabalho em espaço confinado), quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

2) Exames Médicos Ocupacionais

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, os quais compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma e de outras NR:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de Riscos Ocupacionais;
- e) Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- I - No Exame Admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
- II - No Exame Periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
- b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Os exames periódicos que apresentarem alguma alteração terão novas orientações com periodicidade, acréscimo ou repetições de exames complementares a critério do Médico Responsável pelo PCMSO.

III. No Exame de Retorno ao Trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

IV. O Exame de Mudança de Risco Ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

VI. No Exame Demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Observações:

- O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.
- Quando a empresa realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.
- Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
- Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
- Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.
- Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.
- A monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, a níveis de pressão sonora elevados e a substâncias cancerígenas e radiações ionizantes ficará a critério do PGR da empresa.
- No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:
 - Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
 - Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
 - Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;

- Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.
- O empregado, em uma das situações previstas anteriormente, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

Por sua vez, o **Anexo II - Controle Médico Ocupacional da Exposição a Níveis de Pressão Sonora Elevados** versa sobre a periodicidade dos exames audiométricos:

O exame audiométrico deve ser realizado, no mínimo:

- a) na admissão;
- b) anualmente, tendo como referência o exame audiométrico admissional;
- c) na demissão.

3) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA

A meia-vida de uma substância ou de seu metabólito determina o momento em que deve ser realizada a coleta da amostra de material biológico para análise.

A meia-vida da maioria das substâncias do quadro I da NR-7 é curta ou muito curta e como existe a necessidade de um período entre o início da exposição ao agente químico e a possibilidade de se utilizar a dosagem biológica como indicador, o monitoramento da exposição a tais substâncias pode ser utilizada como indicador após 06 meses de exposição.

A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser realizada semestralmente (Exame Periódico).

Lista de Substâncias Quadro 1 – Anexo I NR-7

- Acetona
- Anilina
- Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e Arsenato de Gálio
- Benzeno
- 1,3 butadieno
- 2-butoxietanol
- Sulfeto de carbono
- Clorobenzeno
- Monóxido de carbono
- Chumbo tetraetila
- Cromo hexavalente (compostos solúveis)
- Cobalto e seus compostos inorgânicos (incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio)
- Ciclohexanona
- Diclorometano
- Dimetilacetamida
- Dimetilformamida
- Etoxietanol e Etoxietilacetato
- Óxido de etileno
- Etilbenzeno
- Furfural
- 1,6 diisocianato de hexametileno (HDI)
- n-hexano
- Mercúrio metálico
- Metanol
- Indutores de Metahemoglobina
- 2-metoxietanol e 2- metoxietilacetato
- Metil butil cetona
- 1,1,1 Tricloroetano
- Metiletilcetona (MEK)
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- N-metil-2- pirrolidona
- Nitrobenzeno
- Fenol

- 2-propanol
- Estireno
- Tetracloroetileno
- Tetrahydrofurano
- Tolueno
- 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos dois isômeros)
- Tricloroetileno
- Xilenos

4) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO

O monitoramento biológico das substâncias com meia-vida prolongada, deverá ser realizado no Exame Admissional e no Exame Periódico semestralmente, assim como no Exame Demissional.

Lista de Substâncias Quadro 2 – Anexo I NR-7

- Cádmio e seus compostos inorgânicos
- Inseticidas inibidores da Colinesterase
- Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos
- Chumbo e seus compostos inorgânicos

5) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA EXPOSIÇÃO À BENZENO

Os exames de Hemograma Completo e Contagem de Reticulócitos serão realizados no Exame Admissional, Exame Periódico semestral e no Exame Demissional para os colaboradores expostos a benzeno, precisamente, os que manipulam combustíveis (gasolina, diesel, etc.).

6) EXAMES PARA TRABALHO EM ALTURA NO EXAME MÉDICO DEMISSIONAL

Para os colaboradores que trabalham em altura, o Exame Médico Demissional contemplará apenas o Exame Clínico e Audiometria, visto que os mesmos estão previstos no item 3.4 do Anexo I da NR-7.

7) AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

A Avaliação Psicossocial é obrigatória para os colaboradores que executam trabalho em espaço confinado, segundo a NR-33, e será realizada no Exame Admissional e Periódico anual.

DOCUMENTOS

1) PRONTUÁRIO MÉDICO

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que sejam atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

2) RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela empresa, referentes aos empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A empresa deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O Relatório Analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da empresa, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na empresa.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados, podem elaborar Relatório Analítico apenas com as seguintes informações: número de exames clínicos realizados; número e tipos de exames complementares realizados.

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Identificação				
Empresa CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA				
Endereço Rua C152, S/N		Complemento R C152, S/N, QUADRA291 LOTE 20/23	CNPJ 37.896.782/0001-07	
CEP 74275-120	Cidade Goiânia	Bairro Jardim América	UF GO	
CNAE 4120-4/00	Grau de Risco 3	Descrição CNAE Construção de edifícios		
Unidade: CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA				
GHE 01 - BETONEIRA				
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.				
Cargo: Operador de Betoneira				
Descrição detalhada: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão				
Perigo / Fator de Risco		Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante		Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído		Físico	Irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Umidade		Físico	Doenças do aparelho respiratório, doenças de pele.	
Vibração Localizadas (Mão- Braço)		Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Cimento Portland		Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)		Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Sílica Livre		Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Levantamento e transporte manual de cargas		Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos (BETONEIRA)		Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão e emburra as giricas com argamassa até o elevador cremalheira.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	Irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Umidade	Físico	Doenças do aparelho respiratório, doenças de pele.
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Cimento Portland	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos (BETONEIRA)	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 02 - ARMAÇÃO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Armador		
Descrição detalhada: Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/Metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Movimentos repetitivos	Ergonômicos	Pode causar lesões como tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
--	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Armador		
Descrição detalhada: Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/Metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Movimentos repetitivos	Ergonômicos	Pode causar lesões como tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Cargo: Servente de Armador		
Descrição detalhada: Aux. Na montagem da ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/Metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Movimentos repetitivos	Ergonômicos	Pode causar lesões como tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 03 - CARPINTARIA
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Cargo: Carpinteiro		
Descrição detalhada: Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira da madeira (vegetal NHO 08)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Desmoldante Ácido Oleico	Químico	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Triacilglicerol	Químico	Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Carpinteiro		
Descrição detalhada: Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira da madeira (vegetal NHO 08)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Desmoldante Ácido Oleico	Químico	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Triacilglicerol	Químico	Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Servente de Carpinteiro		
Descrição detalhada: Aux. na aplicação de agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira da madeira (vegetal NHO 08)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Desmoldante Ácido Oleico	Químico	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Triacilglicerol	Químico	Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 04 - PRODUÇÃO 01

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, grade definitiva nas sacadas, contramarco e instala tubulação de gás.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Radiação não ionizante		Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Sílica livre		Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)		Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas		Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos		Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura		Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, grade definitiva nas sacadas, contramarco e instala tubulação de gás.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Radiação não ionizante		Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Sílica livre		Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)		Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas		Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos		Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura		Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 05 - LIMPEZA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Higieniza banheiros, vestiários, refeitório utilizando detergente e alvejante. Lava pratos e organiza as mesas e cadeiras no refeitório.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Produtos domissanitários	Químico	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias
Agentes patogênicos	Biológico	Infeções em geral
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 06 - ELÉTRICA ENERGIZADO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leads), mini trafos, chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens, Lubrificação do pião do moto redutor, Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos, Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
1,3 Propanediamine, N-[3 (tridecyloxy)propyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetilen o)	Químico	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Provoca irritação ocular grave. Ardência, vermelhidão, coceira, lágrimas. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas). Pode causar câncer. Pode causar alterações genéticas hereditárias.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Eletricidade	Acidente	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0133) Ácido Tricloroacético (urina)		6 meses	6 meses			
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Eletricista Industrial		
Descrição detalhada: Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds), mini trafos, chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens, Lubrificação do pião do moto redutor, Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos, Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
--	--	-------------------

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
1,3 Propanediamine, N-[3 (tridecyloxy)propyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetilen o)	Químico	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Provoca irritação ocular grave. Ardência. vermelhidão, coceira, lágrimas. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas). Pode causar câncer. Pode causar alterações genéticas hereditárias.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Eletricidade	Acidente	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0133) Ácido Tricloroacético (urina)		6 meses	6 meses			
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

GHE 07 - CREMALHEIRA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Operador de Cremalheira		
Descrição detalhada: Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais (argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Vibração (corpo inteiro)	Físico	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes e perfurações
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 08 - SINALIZAÇÃO DE GRUA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Cargo: Sinaleiro			
Descrição detalhada: Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via rádio.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 09 - PRODUÇÃO 02

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro

Descrição detalhada: Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Cargo: Pedreiro			
Descrição detalhada: Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
--	--	-------------------

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxilia o pedreiro no abastecimento de argamassa e tijolos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	---

GHE 10 - PRODUÇÃO 03

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Faz carga, descarga, cava valas com auxílio de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
2 - propanona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea
Ciclohexanona	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Cimento Portland	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Complexo Metálico	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Corante vermelho de classe	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Desmoldante Ácido Oleico	Químico	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Metiletilcetona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Tetrahidrofurano	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0391) Ciclohexanol na urina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(1181) Tetrahidrofurano na urina		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 11 - MANUTENÇÃO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, geralmente nos locais onde as máquinas estão, variando pé direito conforme o local e tipo de máquina e ser trabalhada. Ventilação natural e iluminação poderá ser natural ou artificial.

Cargo: Mecânico de Manutenção		
Descrição detalhada: Montagem e desmontagem da base do elevador, módulos com ancoramento fixo na laje, cabine, suporte do cabo fita, trolley, disjuntor geral, chave blindada, quadro de cancelas, kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens, Lubrificação do pião do moto redutor, Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos, Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
1,3 Propanediami ne, N-[3 (tridecyloxy)pr opyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetile no)	Químico	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Provoca irritação ocular grave Ardência. vermelhidão, coceira, lágrimas. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas). Pode causar câncer. Pode causar alterações genéticas hereditárias.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0133) Ácido Tricloroacético		6 meses	6 meses			
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Montador		
Descrição detalhada: Montagem e desmontagem da base do elevador; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; faz instalação de andaime suspenso, auxilia na manutenção da grua(ascensão).		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão-braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
1,3 Propanediami ne, N-[3 (tridecyloxy)pr opyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetile no)	Químico	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Provoca irritação ocular grave Ardência. vermelhidão, coceira, lágrimas. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas). Pode causar câncer. Pode causar alterações genéticas hereditárias.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0133) Ácido Tricloroacético		6 meses	6 meses			
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 12 - SEGURANÇA DO TRABALHO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Estagiário de Segurança do Trabalho		
Descrição detalhada: Auxilia nas seguintes atividades: entrega de EPI com preenchimento na ficha de EPI, checklist dos equipamentos estacionários, inspeção no canteiro e treinamentos admissionais e integração,		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho		
Descrição detalhada: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PCMAT, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras) DMS (diálogo mensal de segurança), emissão CAT (comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA (permissão trabalho em altura), check list dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 13 - SUPERVISÃO DE EQUIPES

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Encarregado de Eletricista		
Descrição detalhada: Supervisão na execução dos serviços (tubulação de laje, prumadas elétricas e telefônica, e outros) conforme projetos de instalações elétricas definitivas e instalações temporárias do canteiro, levantamento de materiais elétricos para compras (fios, tomadas, lâmpadas, soquetes, quadro elétrico, disjuntores e outros) conforme projeto, recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado de Encanador		
Descrição detalhada: Supervisão na execução dos serviços (tubulações e prumadas de esgoto, água pluvial, água potável, incêndio), levantamento de materiais de pintura para compras (tubos de PVC e galvanizados, cola, solução limpadora, veda rosca, conexões), recebimento de serviços com fechamento de FVS (ficha de verificação de serviços).		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Cargo: Encarregado de Pedreiro			
Descrição detalhada: Supervisão na execução dos serviços (alvenaria interna e externa, reboco interno e externo, contra piso, assentamento de piso cerâmico, azulejo, porcelanato e outros), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado de Pintor Descrição detalhada: Supervisão na execução dos serviços (pintura interna e externa) conforme projeto de arquitetura, levantamento de materiais de pintura para compras (pinceis, tintas, lixas), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços)				
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde		
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível		

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Radiação não ionizante		Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)		Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura		Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado de Rejunte		
Descrição detalhada: Supervisiona equipe de rejunte e limpeza na aplicação de rejunte e limpeza dos apartamentos, faz recebimento do serviço e medição das tarefas designadas para a equipe e fechamento de ponto.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Mestre de Obra		
Descrição detalhada: Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA				08/12/2025
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 14 - ADMINISTRAÇÃO

Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Administrativo de Obra

Descrição detalhada: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras, Distribuição e controle de EPI.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Auxiliar Administrativo de Obras

Descrição detalhada: Auxilia no fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras, Distribuição e controle de EPI.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Jovem Aprendiz (Maior ou igual a 18 anos)		
Descrição detalhada: Auxilia nas seguintes atividades: Conferência e recebimento de materiais, fechamento de ponto, lançamentos de notas fiscais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 15 - ALMOXARIFADO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.

Cargo: Almoxarife		
Descrição detalhada: Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DOS ESTADOS DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Cargo: Servente Descrição detalhada: Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 16 - ENGENHARIA

O profissional realiza suas atividades dentro da sala de engenharia, cujo pé direito é de 3m, ventilação natural e iluminação artificial. Fora da sala, supervisiona a produção em todo o canteiro, com características variáveis conforme a atividade.

Cargo: Engenheiro		
Descrição detalhada: Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro-sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
--	--	-------------------

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Estagiário de Engenharia		
Descrição detalhada: Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento dos projetos da obra, faz pedidos de materiais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 17 - GRUA

O profissional atua em diversas áreas da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação variam. Na cabine, é fundamental que haja janelas amplas para garantir boa visibilidade e sistemas de ar condicionado e aquecimento, mantendo a temperatura confortável durante o trabalho.

Cargo: Operador de Grua		
Descrição detalhada: Opera a grua içando aço (viga e pilar), tijolos, argamassa(concreto) e outros.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	

GHE 18 - SERRALHERIA

O profissional desenvolve suas atividades em local coberto, onde conta com ventilação e iluminação natural.

Cargo: Meio Oficial de Serralheiro

Descrição detalhada: Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Eletrodo 6013 Bentonita	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Carbonato de potássio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Celulose	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Dióxido de titânio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Eletrodo 6013 Feldspato	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Ferro	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Manganês	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio)	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Quartzo	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras por aquecimento e lesões na pele e olhos.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X	6 meses	6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Serralheiro

Descrição detalhada: Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Eletrodo 6013 Bentonita	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Carbonato de potássio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secreta ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Eletrodo 6013 Celulose	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Dióxido de titânio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Feldspato	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Ferro	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Manganês	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio)	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Quartzo	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras por aquecimento e lesões na pele e olhos.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X	6 meses	6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxilia no serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra polycorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Eletrodo 6013 Bentonita	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Carbonato de potássio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Celulose	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Dióxido de titânio	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Feldspato	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Ferro	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Manganês	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio)	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Eletrodo 6013 Quartzo	Químico	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras por aquecimento e lesões na pele e olhos.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X	6 meses	6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 19 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Encanador		
Descrição detalhada: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Ciclohexanona	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
2 - propanona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea
Complexo Metálico	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Corante vermelho de classe	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Metiletilcetona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tetrahidrofurano	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno, na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0391) Ciclohexanol na urina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(1181) Tetrahydrofurano na urina		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Encanador		
Descrição detalhada: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
2 – propanona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea	
Ciclohexanona	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	
Complexo Metálico	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	
Corante vermelho de classe	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	
Metiletilcetona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Tetrahidrofurano	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0391) Ciclohexanol na urina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(1181) Tetrahydrofurano na urina		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente Descrição detalhada: Auxilia nas ligações da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
2 - propanona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea
Ciclohexanona	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Complexo Metálico	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Corante vermelho de classe	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Metiletilcetona	Químico	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tetrahidrofurano	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0391) Ciclohexanol na urina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(1181) Tetrahidrofurano na urina		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADO

O profissional exerce suas atividades em diferentes áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar conforme o ambiente de trabalho. As tarefas podem ser realizadas tanto em locais fechados quanto abertos no canteiro de obras.

Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida, Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Eletricista		
Descrição detalhada: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida, Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
--------------------	-----------------	---

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente Descrição detalhada: Auxilia perfurando os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instalar eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida, Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.

Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 21 - IMPERMEABILIZAÇÃO

O profissional desempenha suas atividades em diversas áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar conforme o ambiente de trabalho. Em sua rotina, frequentemente atua em locais com espaço a necessidade de impermeabilização, atuando também em áreas abertas.

Cargo: Encarregado de Impermeabilização		
Descrição detalhada: Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Impermeabilização cristalizante: Aplicar o primer ao redor dos ralos e após secagem, aplicar o mastique na circunferência externa dos ralos e posterior aplicar o cimento polimérico semi-flexível. Uso de ferramenta: Caldeira, maçarico, espátula. Uso de produto: Manta asfáltica, asfalto, primer, cimento.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Calor	Físico	A exposição ao calor excessivo pode causar elevação da temperatura corporal, pele vermelha, dor de cabeça, tontura, náusea, confusão mental e, em casos extremos, perda de consciência, exaustão pelo calor.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Aguarrás	Químico	Provoca irritação à pele é reações alérgicas. Provoca lesões oculares graves.
Asfalto	Químico	Provoca irritação à pele é reações alérgicas. Provoca lesões oculares graves.
Cimento Asfáltico 95/30 - Asfalto	Químico	Irritante às vias respiratórias, podendo causar tontura ou vertigem; Irritante à pele; Irritante aos olhos
Cimento Portland	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Irritação da pele, reações alérgicas na pele, dermatite. Provoca lesões oculares graves, lacrimejamento excessivo

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	---

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Quartzo >5µm - Impermeabilizante	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Irritação da pele, reações alérgicas na pele, dermatite. Provoca lesões oculares graves, lacrimejamento excessivo
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras por aquecimento, lesões na pele
Trabalho em Espaço Confinado	Acidente	A falta de oxigênio pode levar à asfixia e em casos extremos à morte. A exposição a atmosfera tóxica (gases tóxicos com monóxido de carbono, amônia, sulfeto de hidrogênio, metano) pode causar danos aos pulmões, sistema nervoso e outros órgãos; incêndios e explosões pode causar queimaduras graves e lesões; temperaturas extremas podem causar exaustão por calor, hipertermia, insolação.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Auxilia no serviço com Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Impermeabilização cristalizante: Aplicar o primer ao redor dos ralos e após secagem, aplicar o mastique na circunferência externa dos ralos e posterior aplicar o cimento polimérico semi flexível. Uso de ferramenta: Caldeira, maçarico, espátula. Uso de produto: Manta asfáltica, asfalto, primer, cimento.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Calor	Físico	A exposição ao calor excessivo pode causar elevação da temperatura corporal, pele vermelha, dor de cabeça, tontura, náusea, confusão mental e, em casos extremos, perda de consciência, exaustão pelo calor.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Aguarrás	Químico	Provoca irritação à pele é reações alérgicas. Provoca lesões oculares graves.
Asfalto	Químico	Provoca irritação à pele é reações alérgicas. Provoca lesões oculares graves.
Cimento Asfáltico 95/30 - Asfalto	Químico	Irritante às vias respiratórias, podendo causar tontura ou vertigem; Irritante à pele; Irritante aos olhos
Cimento Portland	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Irritação da pele, reações alérgicas na pele, dermatite. Provoca lesões oculares graves, lacrimejamento excessivo
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Quartzo >5µm - Impermeabilizante	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Irritação da pele, reações alérgicas na pele, dermatite. Provoca lesões oculares graves, lacrimejamento excessivo
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras por aquecimento, lesões na pele

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
Trabalho em Espaço Confinado	Acidente	A falta de oxigênio pode levar à asfixia e em casos extremos à morte. A exposição a atmosfera tóxica (gases tóxicos com monóxido de carbono, amônia, sulfeto de hidrogênio, metano) pode causar danos aos pulmões, sistema nervoso e outros órgãos; incêndios e explosões pode causar queimaduras graves e lesões; temperaturas extremas podem causar exaustão por calor, hipertermia, insolação.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 22 - GESSO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Gesseiro		
Descrição detalhada: Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta), aplicar o gesso no teto com a desempenadeira.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Gesso (sulfato de cálcio hemi hidratado)	Químico	Comumente são diagnosticadas conjuntivite, rinite, amidalite, irritação nos brônquios e traqueia, sangramentos nasais e prejuízos ao olfato e paladar, ou doenças pulmonares crônicas, como exemplo, pneumoconiose, calciosilicose e fibrose pulmonar .

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	--

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 23 - PINTURA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Pintor		
Descrição detalhada: Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	---

Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais	Químico	Tóxico por inalação, em contato com a pele e ingestão.
Emulsão Acrílica	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele, Provoca irritação ocular.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
1,2,4-trimetilbenzeno	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
2-metil-4-isotiazolin-3-ona	Químico	Pode produzir irritação na boca e garganta, dor de cabeça, desmaios e náuseas.
5-Cloro- 2metil- 2H- isotiazole- 3- ona e 2- metil- 2H- isotiazole- 3- ona	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele, Provoca irritação ocular.
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona	Químico	Pode produzir irritação na boca e garganta, dor de cabeça, desmaios e náuseas.
Acetato de etila	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Acetato de etilglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Acetato de sec-butila	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Acetona (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Ácido benzoico	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Aguarrás Mineral	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele, Provoca irritação ocular.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Álcool diacetona	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite cronica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Carbonato de Cálcio e Magnésio	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele, Provoca irritação ocular.
Carbonato de cálcio natural	Químico	Tóxico por inalação, em contato com a pele e ingestão.
Complexo Metálicos de Sais Alcalinos	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele, Provoca irritação ocular.
Dibutilftalato	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite cronica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Etanol	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite cronica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Hidrocarboneto Alifático	Químico	Tóxico por inalação, em contato com a pele e ingestão.
Hidróxido de amônia (solução 25%)	Químico	Tóxico por inalação, em contato com a pele e ingestão.
Isopropilbenzeno	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite cronica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Massa PVA Amoníaco	Químico	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório e efeitos narcóticos com falta de ar, tosse, tontura, sonolência, fraqueza, perda de consciência e dor de cabeça.
Massa PVA Querosene	Químico	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório e efeitos narcóticos com falta de ar, tosse, tontura, sonolência, fraqueza, perda de consciência e dor de cabeça.
Massa PVA bactericida	Químico	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório e efeitos narcóticos com falta de ar, tosse, tontura, sonolência, fraqueza, perda de consciência e dor de cabeça.
Phosphoric acid	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite cronica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	---

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tolueno (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Xileno (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anemia, anorexia, bronquite crônica, dificuldade de concentração disfunção auditiva, distúrbio do sono, distúrbio visual e pneumonite.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 24 - PORTARIA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA				08/12/2025	
Cargo: Servente Descrição detalhada: Controle de entrada e saída de pessoas.							
Perigo / Fator de Risco		Grupo		Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde			
Postural		Ergonômicos		Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como diabetes e doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.			
Piso irregular ou em desnível		Acidente		Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.			
Queda de materiais		Acidente		Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes			
Violência Física		Acidente		Lesões superficiais, traumas e hemorragias.			
Exames		ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico		X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual		X		12 meses		X	
GHE 25 - PINTURA 2 O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.							
Cargo: Pintor Descrição detalhada: Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários, peças dos elevadores							
Perigo / Fator de Risco		Grupo		Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde			
Radiação não ionizante		Físico		Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.			
Ruído		Físico		A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.			
Vibrações localizadas (mão e braço)		Físico		Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.			
Butanona-oxima		Químico		Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.			
Sílica livre		Químico		A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).			
Thinner 2-butanol		Químico		Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.			
Thinner Metiletilcetona		Químico		Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.			

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	--

Aguarrás Mineral	Químico	Pode provocar irritações e conjuntivite química nos olhos. Provoca irritação ocular. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dor de cabeça, náuseas e desmaios; Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda de consciência.
Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Metil etil cetoxima	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Octoato de Cobalto (Risco trivial no PGR)	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Octoato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Octoato de Zircônio	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Solvente de nafta (petróleo)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor.
Thinner 1,2,4-trimetilbenzeno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhião, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Acetato de etila	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhião, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Acetona (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhião, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Etanol	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhião, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Isopropilbenzeno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhião, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Tolueno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhião, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Xileno	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Querosene (Petróleo)		Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.	
Levantamento e transporte manual de cargas		Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos		Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes .	
Trabalho em Altura		Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0116) Ácido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X	6 meses	6 meses		X	X
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxilia no preparo (lixamento) das peças para pintura.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Butanona-oxima	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Thinner 2-butanol	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Metiletilcetona	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Aguarrás Mineral	Químico	Pode provocar irritações e conjuntivite química nos olhos. Provoca irritação ocular. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dor de cabeça, náuseas e desmaios; Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda de consciência.
Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Metil etil cetoxima	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Octoato de Cobalto (Risco trivial no PGR)	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Octoato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Octoato de Zircônio	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Solvente de nafta (petróleo)	Químico	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.
Thinner 1,2,4-trimetilbenzeno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Acetato de etila	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Acetona (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Thinner Etanol	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Isopropilbenzeno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Thinner Tolueno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.
Xileno	Químico	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.
querosene (petróleo)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0116) Ácido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X	6 meses	6 meses		X	X
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 26 - PRODUÇÃO 04

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Cargo: Servente			
Descrição detalhada: Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxílio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o apartamento utilizando detergente, creox, thinner, sapólio.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
1,2,4-trimetilbenzeno	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
2- butanol	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Acetato de etila	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Acetona	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Etanol	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Isopropilbenzeno	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Metiletilcetona	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Produtos domissanitários	Químico	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias	
Tolueno	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	
Xileno	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar sonolencia ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepatica	

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	---

Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0116) Ácido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 27 - PRODUÇÃO 05

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Assentamento bancada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
--	--	-------------------

Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Assentamento bancada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
		nervos e tecidos moles da mão.	
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 28 - PRODUÇÃO 06

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA			08/12/2025
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

 SECONCI Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA		08/12/2025
Radiação não ionizante		Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Vibrações localizadas (mão e braço)		Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Sílica livre		Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)		Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas		Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos		Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura		Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Aux. Na limpeza do apartamento e lava a laje antes da aplicação do piso, transporta materiais e ferramentas de um pavimento para outro.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

OBSERVAÇÕES:

- Os exames complementares específicos para “trabalho em altura” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo e Glicemia de jejum. Algumas empresas optaram pela realização da Avaliação Psicossocial no Exame Admissional, sendo que a critério do médico examinador, esta avaliação pode ser solicitada durante o exame médico ocupacional, caso necessário.
- Os exames complementares específicos para “trabalho em espaço confinado” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo, Glicemia de jejum, Espirometria, Rx de tórax OIT, Avaliação Psicossocial (obrigatório no Exame Admissional e Exame Periódico).
- O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de baixo custo, integrar o conjunto de medidas preventivas dos Programas de Saúde Ocupacional a serem implantados, com diminuição do risco de absenteísmo.

Além disso, é um programa que assegura a prevenção de doenças que interferem na capacidade produtiva, evitando faltas, licenças temporárias por motivos de doenças e as aposentadorias precoces.

De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador.

Orienta-se também que a empresa mantenha junto ao ASO admissional, cópia do cartão de vacinação atualizado.

VACINAS RECOMENDADAS	DOSAGENS E INTERVALOS
Dupla Adulto	Três doses em não vacinados => 0, 60 e 120 dias (e reforço a cada 10 anos) Observação: esquema diferenciado para gestante
Influenza	Dose única anual
Covid-19	Conforme Programa Nacional de Imunizações - PNI
Febre Amarela	Dose única Observação: Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

A vacina é encontrada na rede pública de saúde, segue lista de postos de vacinação em Goiânia:

Funcionamento das salas de vacinas

SIM (SE ESTIVER FUNCIONANDO);

NÃO (CASO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO)

Unidade	Rotina (todas do Calendário Nacional de Vacinação)		Covid	
	Matutino	Vespertino	Matutino	Vespertino
Distrito Campinas-Centro				
1. Marinho Lemos	não	não	não	não
2. Cais Campinas	sim	sim	não	não
3. Canaa	não	não	sim	não
4. Crimeia leste	sim	sim	sim	sim
5. Leste Universitario	não	não	sim	sim
6. Norte Ferroviário	sim	sim	sim	sim
7. Cidade Jardim	sim	não	sim	não
8. Cais Vila Nova	sim	sim	sim	sim
9. CRASPI	Não faz	Não faz	sim	sim
10. Vila Moraes	sim	não	sim	sim
11. Fama	sim	não	sim	sim
12. Santa Helena	sim	sim	sim	sim
13. Crimeia Oeste	não	não	sim	sim
14. Esplanada				
Distrito Leste				
15. CSF Santo Hilário	sim	sim	sim	sim
16. CSF Parque Atheneu	sim	sim	sim	sim
17. CSF Ville De France	não	sim	sim	sim
18. CS Água Branca	sim	não	sim	não
19. CSF Jd Dom Fernando	sim	sim	sim	sim
20. UPA Chácara do Governador	sim	sim	sim	sim
21. UPA Novo Mundo	sim	sim	sim	sim
22. CSF Aruanã 3	sim	sim	sim	sim
23. Cais Amendoeiras	não	sim	sim	sim
24. CSF Recanto das Minas Gerais	não	sim	sim	sim
Distrito Sudoeste				
25. Ciams Novo Horizonte	Não	Não	Sim	Sim
26. CSF Real Conquista	sim	sim	sim	sim
27. CS Pq Anhanguera	Não	Sim	Sim	Sim
28. CS Vila União	Sim	Sim	Sim	Sim
29. CSF Garavelo B	sim	sim	sim	sim
30. CSF Eli Forte	sim	sim	sim	sim
31. CSF Caravelas	sim	sim	sim	sim
32. CSF Andréia Cristina	sim	não	sim	sim
33. CSF Condomínio das Esmeraldas	Sim	Não	Sim	Sim
34. CSF Pq Santa Rita	Sim	Sim	Sim	Sim
35. CSF Madre Germana	sim	sim	sim	sim
36. CS Vila Mauá	não	não	sim	sim

37. CSF Residencial Itaipu	sim	não	sim	sim
38. CS Vila Boa	não	não	sim	sim
Distrito Sul				
39. Centro Municipal de Vacinação	Sim	Sim	Sim	Sim
40. CS Pq Amazônia	Não	Não	Sim	Sim
41. CS Vila Redenção	Não	Sim	Sim	Não
Distrito Noroeste				
42. CSF Alto do Vale	sim	sim	sim	sim
43. CSF Finsocial	sim	sim	sim	sim
44. CSF Estrela Dalva	sim	sim	sim	sim
45. Cais Cândida de Moraes	sim	não	sim	não
46. CSF Brisas da Mata	sim	sim	sim	sim
47. CSF Novo Planalto	sim	sim	sim	sim
48. CSF Boa Vista	sim	sim	sim	sim
49. CSF Curitiba	sim	sim	sim	sim
50. CSF São Carlos	sim	sim	sim	sim
51. CSF Jd Primavera	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.
52. CSF Vila Mutirão	não	não	sim	sim
Distrito Oeste				
53. Cais Bairro Goiá	sim	sim	sim	sim
54. CSF Jd Cerrado 4	sim	sim	sim	sim
55. CS Vila Regina	sim	sim	sim	sim
56. CSF Pq dos Buritis	sim	sim	nao	nao
57. CSF Buena Vista	sim	sim	nao	nao
58. CSF Eldorado Oeste	sim	sim	sim	sim
59. CSF São Francisco	sim	sim	sim	sim
60. CSF João Braz	sim	sim	sim	sim
61. CSF Goiânia Viva	sim	sim	sim	sim
62. CSF Vera Cruz I	sim	sim	não	não
63. CSF Vera Cruz II	sim	não	sim	sim
64. CSF Jd Cerrado 6	sim	não	não	não
Distrito Norte				
65. CS Itatiaia	sim	não	sim	sim
66. CS Balneário Meia Ponte	sim	não	sim	sim
67. CS São Judas Tadeu	sim	sim	sim	sim
68. CS Vila Clemente	sim	não	sim	sim
69. CSF Guanabara I	sim	sim	sim	sim
70. Ciams Urias Magalhães	sim	não	sim	sim
71. CSF Cachoeira Dourada	sim	sim	sim	sim
72. CSF Vale dos Sonhos	sim	sim	sim	sim
73. CS Perim	sim	não	sim	sim

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Este cronograma contempla a realização dos Exames Médicos de Saúde Ocupacional a serem feitos no SECONCI-GO, Visitas Orientativas da equipe do SECONCI-GO à empresa/obra, Palestras Educativas na empresa/obra. No caso das palestras educativas, o detalhamento da programação se encontra em planilha específica na página a seguir deste anexo.

PERÍODO:

DEZEMBRO DE 2025 A
DEZEMBRO DE 2026

AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)

EMPRESA: CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA Local: RESIDENCIAL VISTAMERICA														
MÊS ANO	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	OBSERVAÇÕES
1 – Exames Médicos Ocupacionais														Realizados no Seconci-GO, agendados pela empresa.
2 – Palestras			X					X						Terão carga horária de 1 hora e serão ministradas no canteiro de obras.
3 – Elaboração de Relatório Analítico													X	Médico Responsável Pelo PCMSO

Obs: Importante justificar com antecedência mínima de 10 dias úteis, qualquer impossibilidade de realização das palestras agendadas pelo SECONCI-GO. O cancelamento sem aviso prévio implicará em ressarcimento das despesas com o palestrante e o deslocamento.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

MÊS/ANO	TEMA	Carga Horária	Local:	Horário	Palestrante
FEV/26	Noções básicas sobre DERMATOSE DE CONTATO	1 hora	Locais de Trabalho		
JUL/26	Noções básicas sobre DOENÇAS SILENCIOSAS	1 hora	Locais de Trabalho		

OBS: Todas as Palestras serão registradas em lista de presença assinada pelos participantes.
Os temas sugeridos poderão sofrer alterações conforme necessidade constatada.

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO

Data	Tema	Data da Remarcação	Horário	Motivo

A data da palestra remarcada não poderá sofrer mais alteração.

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
01 á 250 colaboradores		Quantidade
1	Bolsa de Resgate / Cx de acondimentos de PS	1 UNIDADE
2	Kit de prancha longa em polietileno completo	1 UNIDADE
3	Reanimador manual adulto (AMBU)	1 UNIDADE
4	Tesoura sem ponta (tamanho médio)	1 UNIDADE
5	Caixa de luvas (tamanho: M e G)	1 UNIDADE
6	Caixa de máscara descartáveis	
7	Máscara de RCP descartável	5 UNIDADES
8	Manta térmica	1 UNIDADE
9	Óculos de proteção	1 UNIDADE
10	Esparadrapo impermeável	2 UNIDADES
11	Caixa de curativo adesivo (band-aid) pequena	1 UNIDADE
12	Caixa de curativo adesivo (band-aid) grande	1 UNIDADE
13	Ataduras de crepe de 6 e 10 cm	3 UNIDADES DE CADA
14	Bandagens triangulares (Tecido de algodão cru -tamanhos P, M e G)	2 UNIDADES DE CADA
15	Colar cervical ajustável (Tamanho: P, M e G)	1 UNIDADES DE CADA
16	Kit de talas moldável aramada Eva para imobilização de membros	1 UNIDADE
17	Compressa de gazes estéril (7,5 x 7,5 cm)	10 UNIDADES
18	Antisséptico (Digliconato de Clorexidina)	2 UNIDADE EM SPRAY
19	Soro fisiológico 0,9% de 100 ML	10 UNIDADES
20	Saco plástico branco leitoso	20 UNIDADES
21	Termômetro infravermelho	1 UNIDADE
22	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço	1 UNIDADE

OBSERVAÇÕES:

Caso realize a abertura do **soro fisiológico** realizar o descarte do mesmo não fazer o reaproveitamento para outro atendimento.

Todo **descarte de material** utilizado em qualquer atendimento de emergência deve ser depositado no **saco branco leitoso** e fazer o descarte do mesmo em PS mais próximo juntamente com o lixo infectante.

Para a utilização de **AMBU** e **COLAR CERVICAL** só pode ser realizado com pessoas treinadas para a utilização do mesmo.

Caso a obra passe de 251 colaboradores, entrar em contato com willker.borges@seconcigoias.com.br para (contemplar uma nova planilha de sugestão de suprimentos) Adendo ao PCMSO.

TERMO DE COMPROMISSO

Assumo, em nome da Empresa **CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA** o compromisso de seguir as orientações do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprir suas determinações, contribuindo para a realização de todas as medidas preventivas de saúde adotadas:

- 1) Encaminhar ao Seconci mensalmente o número de trabalhadores da empresa;
- 2) Controle de absenteísmo acompanhar as faltas e seus motivos, informando as anormalidades encontradas e em conjunto com o Seconci tentar encontrar medidas eficazes;
- 3) Controlar e encaminhar ao Seconci os trabalhadores para realização dos Exames Médicos Ocupacionais e possibilitar a realização dos Exames Complementares solicitados;
- 4) Controlar e acompanhar todo processo de vacinação;
- 5) Controlar e acompanhar o Planejamento de Ações.

Através desses procedimentos que serão de responsabilidade da empresa, com orientações do Seconci, será permitido realizar uma avaliação das medidas de saúde adotadas com o PCMSO, inclusive o custo / benefício de sua implantação.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Nome do Responsável na Empresa pelo Acompanhamento do Programa:

Assinatura do Responsável:

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	--

Quadro de Recomendação de Exames

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 01 - BETONEIRA	Operador de Betoneira	Radiação não ionizante Ruído Umidade Vibração Localizadas (Mão-Braço) Cimento Portland Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos (BETONEIRA) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
			Radiação não ionizante Ruído Umidade Vibração Localizadas (Mão-Braço) Cimento Portland Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos (BETONEIRA) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 02 - ARMAÇÃO	Armador	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ Metálicas Levantamento e transporte manual de cargas Movimentos repetitivos Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 02 - ARMAÇÃO	Meio Oficial de Armador	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ Metálicas Levantamento e transporte manual de cargas Movimentos repetitivos Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025	
			Trabalho em Altura	menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado		
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame						
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.	
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 02 - ARMAÇÃO	Servente de Armador	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ Metálicas Levantamen to e transporte manual de cargas Movimentos repetitivos Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 03 - CARPINTARI A	Carpinteiro	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Poeira da madeira (vegetal NHO 08) Triacilglicero I Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 03 - CARPINTARIA	Meio Oficial de Carpinteiro	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Poeira da madeira (vegetal NHO 08) Triacilglicero l Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 03 - CARPINTARIA	Servente de Carpinteiro	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Poeira da madeira (vegetal NHO 08) Triacilglicero l Levantamen to e transporte manual de cargas	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025	
			Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado		
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame						
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.	
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 04 - PRODUÇÃO 01	Meio Oficial de Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 04 - PRODUÇÃO 01	Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0295) Exame Clínico	

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA							08/12/2025
			s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	menos um leitor habilitado	(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 04 - PRODUÇÃO 01	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 05 - LIMPEZA	Servente	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Produtos domissanitários Agentes patógenos Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
			Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) 1,3-Propane diamine, N-[3-(tridecyloxy propyl)]-, branched and linear, diacetate (Tricloroetileno) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			(Perfuração) Eletricidade Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIA L VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 06 - ELÉTRICA ENERGIZAD O	Eletricista Industrial	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) 1,3-Propane diamine, N-[3- (tridecyloxy) propyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetil eno) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Eletricidade Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	--

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 07 - CREMALHEIRA	Operador de Cremalheira	Radiação não ionizante Ruído Vibração (corpo inteiro) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0295) Exame Clínico
			Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0295) Exame Clínico

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 09 - PRODUÇÃO 02	Meio Oficial de Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Acuidade Visual Especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
			Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Acuidade Visual Especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 09 - PRODUÇÃO 02	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Acuidade Visual não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 10 - PRODUÇÃO 03	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) 2 - propanona Ciclohexano na Cimento Portland Complexo Metálico Corante vermelho de classe Metiletilceto na Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um		(0071) Acetona Urinária (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0391) Ciclohexanol na urina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025	
			especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Tetrahidrofu rano Éter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	leitor habilitado		(1181) Tetrahidrofu rano na urina (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 11 - MANUTENÇÃ O	Mecânico de Manutenção	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) 1,3-Propane diamine, N-[3- (tridecyloxy) propyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetil eno) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 11 - MANUTENÇÃO	Montador	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) 1,3-Propane diamine, N-[3- (tridecyloxy) propyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetil eno) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 12 - SEGURANÇA DO TRABALHO	Estagiário de Segurança do Trabalho	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Postural	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA							08/12/2025
			Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	menos um leitor habilitado	(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 12 - SEGURANÇA DO TRABALHO	Técnico de Segurança do Trabalho	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 13 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado de Encanador	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA				08/12/2025					
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 13 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado de Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 13 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado de Pintor	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 13 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado de Rejunte	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Postural	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA							08/12/2025
			Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	menos um leitor habilitado	(0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 13 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	Mestre de Obra	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espiometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espiometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espiometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espiometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 14 - ADMINISTRAÇÃO	Administrativo de Obra	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espiometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espiometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espiometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espiometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	-------------------

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 14 - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar Administrativo de Obras	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 14 - ADMINISTRAÇÃO	Jovem Aprendiz	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 15 - ALMOXARIFADO	Almoxarife	Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 15 - ALMOXARIFADO	Servente	Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 16 - ENGENHARIA	Engenheiro	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	---	---

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 16 - ENGENHARIA	Estagiário de Engenharia	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 17 - GRUA	Operador de Grua	Radiação não ionizante Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 18 - SERRALHERIA	Meio Oficial de Serralheiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) Eletrodo 6013 Bentonita Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio Eletrodo 6013 Carbonato de potássio Eletrodo 6013 Celulose Eletrodo 6013 Dióxido de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA							08/12/2025
			titânio Eletrodo 6013 Feldspato Eletrodo 6013 Ferro Eletrodo 6013 Manganês Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio) Eletrodo 6013 Quartzo Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente Trabalho em Altura	recente), com pelo menos um leitor habilitado		de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 18 - SERRALHERIA	Serralheiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão- Braço) Eletrodo 6013 Bentonita Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio Eletrodo 6013 Carbonato de potássio Eletrodo 6013	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihem oglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415)	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025	
			Celulose Eletrodo 6013 Dióxido de titânio Eletrodo 6013 Feldspato Eletrodo 6013 Ferro Eletrodo 6013 Manganês Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio) Eletrodo 6013 Quartzo Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente Trabalho em Altura	Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 18 - SERRALHERIA	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) Eletrodo 6013 Bentonita Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio Eletrodo 6013	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			Carbonato de potássio Eletrodo 6013 Celulose Eletrodo 6013 Dióxido de titânio Eletrodo 6013 Feldspato Eletrodo 6013 Ferro Eletrodo 6013 Manganês Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio) Eletrodo 6013 Quartzo Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente Trabalho em Altura	(0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	menos um leitor habilitado	(0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 19 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Encanador	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) 2 - propanona Ciclohexano na Complexo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de		(0071) Acetona Urinária (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente),	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente),	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			Metálico Corante vermelho de classe Metiletilceto na Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Tetrahidrofuro Éter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		na urina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1181) Tetrahidrofuro na urina (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	com pelo menos um leitor habilitado	jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 19 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Meio Oficial de Encanador	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) 2 - propanona Ciclohexano na Complexo Metálico Corante vermelho de classe Metiletilceto na Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0071) Acetona Urinária (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0391) Ciclohexanol na urina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1181) Tetrahidrofuro na	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025	
			Tetrahidrofurano Éter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura			urina (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado			
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 19 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) 2 - propanona Ciclohexanona Complexo Metálico Corante vermelho de classe Metiletilcetona Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Tetrahidrofurano Éter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0071) Acetona Urinária (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0391) Ciclohexanona na urina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1181) Tetrahidrofurano na urina (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			(Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADO	Eletricista	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADO	Meio Oficial de Eletricista	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADO	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 21 - IMPERMEABILIZAÇÃO	Encarregado de impermeabilização	Calor Radiação não ionizante Ruído Aguarrás Asfalto Cimento Asfáltico 95/30 - Asfalto Cimento Portland Particulados	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0364) Carboxihemoglobina	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025	
			(insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Quartzo >5µm - Impermeabilizante Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente Trabalho em Altura Trabalho em Espaço Confinado	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 21 - IMPERMEABILIZAÇÃO	Servente	Calor Radiação não ionizante Ruído Agarrás Asfalto Cimento Asfáltico 95/30 - Asfalto Cimento Portland Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Quartzo >5µm - Impermeabilizante Sílica Livre Levantamento e transporte manual de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0295) Exame Clínico

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025	
			cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente Trabalho em Altura Trabalho em Espaço Confinado	menos um leitor habilitado		Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado	
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 22 - GESSO	Gesseiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) Gesso (sulfato de cálcio hemi hidratado) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	--

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIA L VISTAMERICA A SPE LTDA	GHE 23 - PINTURA	Pintor	Radiação não ionizante Ruído Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais Emulsão Acrílica Sílica livre 1,2,4-trimetilbenzeno 2-metil-4-isotiazolin-3-ona 5-Cloro-2metil- 2H-isotiazole-3-ona e 2-metil- 2H-isotiazole-3-ona 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona Acetato de etila Acetato de etilglicol Acetato de sec-butila Acetona Acido benzoico Aguarrás Mineral Alcool diacetona Carbonato de Cálcio e Magnésio Carbonato de cálcio natural Complexo Metálicos de Sais Alcalinos Dibutilftalato Etanol Hidrocarboneto Alifático Hidróxido de amônia (solução 25%) Isopropilbenzeno Massa PVA Amoníaco Massa PVA Querosene Massa PVA bactericida Particulados (insolúveis ou de baixa	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA							08/12/2025
			solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Phosphoric acid Tolueno Xileno Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 24 - PORTARIA	Porteiro	Postural Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Violência Física	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 24 - PORTARIA	Servente	Postural Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Violência Física	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VISTAMERIC A SPE LTDA	GHE 25 - PINTURA 2	Pintor	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Butanona-ox ima Sílica livre Thinner 2-butanol Thinner Metiletilceto na Agarrás Mineral Destilados	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de		(0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente),	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA					08/12/2025		
			de Petróleo levemente tratados com hidrogênio Metil etil cetoxima Octoato de Cobalto Octoato de Cálcio Octoato de Zircônio Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Solvente de nafta (petróleo) Thinner 1,2,4-trimeti lbenzeno Thinner Acetato de etila Thinner Acetona Thinner Etanol Thinner Isopropilben zeno Thinner Tolueno Xileno querosene (petróleo) Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	com pelo menos um leitor habilitado	Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	--

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame						
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.	
CMO RESIDENCIA L VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 25 - PINTURA 2	Servente	Radiação não ionizante							
			Ruído							
			Vibrações localizadas (mão e braço)							
			Butanona-oxima							
			Sílica livre							
			Thinner							
			2-butanol							
			Thinner							
			Metiletilcetona							
			Agarrás Mineral							
			Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	(0281) Audiometria		(0116) Ácido Metil - Hipúrico			(0281) Audiometria	
			Metil etil cetoxima	(0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria			(0295) Exame Clínico	
			Octoato de Cobalto	(0296) Acuidade Visual		(0296) Acuidade Visual	(0281) Audiometria		(0296) Acuidade Visual	
			Octoato de Cálcio	(0531) ECG		(0531) ECG	(0295) Exame Clínico		(0531) ECG	
			Octoato de Zircônio	(0562) Espirometria		(0562) Espirometria	(0562) Espirometria		(0562) Espirometria	
			Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	(0658) Glicemia de jejum		(0658) Glicemia de jejum	(0693) Hemograma Completo		(0658) Glicemia de jejum	
			não especificado	(0693) Hemograma Completo		(0863) Metil Etil Cetona	(1086) Contagem de Reticulócitos		(0693) Hemograma Completo	
			s de outra maneira (PNOS)	(1086) Contagem de Reticulócitos		(0951) O-cresol urinário	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1086) Contagem de Reticulócitos	
			Solvente de nafta (petróleo)	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1086) Contagem de Reticulócitos	(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
			Thinner			(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
			1,2,4-trimetilbenzeno			(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado				
			Thinner							
			Acetato de etila							
			Thinner							
			Acetona							
			Thinner							
			Etanol							
			Thinner							
			Isopropilbenzeno							
			Thinner							
			Tolueno							
			Xileno							
			querosene (petróleo)							
			Levantamento e transporte manual de cargas							
			Postural							

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA							08/12/2025	
			Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura							
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame						
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.	
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 26 - PRODUÇÃO 04	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração Localizadas (Mão-Braço) 1,2,4-trimetilbenzeno 2- butanol Acetato de etila Acetona Etanol Isopropilbenzeno Metiletilcetona Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Produtos domissanitários Tolueno Xileno Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0071) Acetona Urinária (0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	08/12/2025
---	--	--

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 27 - PRODUÇÃO 05	Meio Oficial de Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 27 - PRODUÇÃO 05	Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso						

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 28 - PRODUÇÃO 06	Meio Oficial de Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 28 - PRODUÇÃO 06	Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico						

			PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA						08/12/2025
			inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA	GHE 28 - PRODUÇÃO 06	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão-braço) Sílica livre Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						

Patrícia Montalvo Moraes
 Médico responsável pelo PCMSO
 CRM: 14949 / RQE 9.662/GO
 Especialidade: Medicina do Trabalho