

Capa

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Norma Regulamentadora NR 7
Portaria 3214/78 alterada pelas Portarias
24 de 29/12/1994 e 08 de 08/05/1996 e
Portaria SEPRT N.º 6.734, de 10/03/2020

INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA (NATURIA)

12/11/2025

Índice

Objetivo.....	3
Unidade: NATURIA	11
Setor: GHE 01 - Engenharia	11
Cargo: Administrativo de Obras.....	11
Cargo: Analista de Engenharia	12
Cargo: Assistente de Engenharia	13
Cargo: Auxiliar de Engenharia.....	14
Cargo: Auxiliar de Escritório	15
Cargo: Coordenador de Obras.....	16
Cargo: Engenheiro Civil.....	17
Cargo: Estagiário de Engenharia	18
Setor: GHE 02 - Segurança do Trabalho	18
Cargo: Auxiliar de Segurança do Trabalho	19
Cargo: Coordenador de Segurança do Trabalho e Ações Sustentáveis	20
Cargo: Estagiário de Técnico de Segurança.....	21
Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho	22
Setor: GHE 03 - Supervisão de Atividades em Obra	22
Cargo: Encarregado de Abastecimento	23
Cargo: Encarregado de Instalações.....	24
Cargo: Encarregado Geral	25
Cargo: Mestre de Obras	26
Setor: GHE 04 - Almoxarifado.....	26
Cargo: Almoxarife	26
Cargo: Auxiliar de Almoxarife	27
Setor: GHE 05 - Limpeza	27
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	28
Setor: GHE 06 - Produção 01.....	28
Cargo: Meio Oficial de Pedreiro	30
Cargo: Pedreiro	31
Cargo: Servente	32
Setor: GHE 07 - Carpintaria.....	32
Cargo: Carpinteiro.....	34
Cargo: Meio Oficial de Carpinteiro	35
Cargo: Servente	36
Setor: GHE 08 - Armação.....	36
Cargo: Armador	37
Cargo: Meio Oficial de Armador.....	38
Cargo: Servente	39
Setor: GHE 09 - Instalações Hidrossanitárias	39
Cargo: Encanador	41
Cargo: Meio Oficial de Encanador	42
Cargo: Servente	43
Setor: GHE 10 - Elétrica.....	43
Cargo: Eletricista	45
Cargo: Meio Oficial de Eletricista	46
Cargo: Servente	47
Setor: GHE 11 - Betoneira.....	47
Cargo: Operador de Betoneira	49
Cargo: Servente	50
Setor: GHE 12 - Sinalização de Grua	50
Cargo: Servente	51
Cargo: Sinalheiro	52
Setor: GHE 13 - Operação de Grua.....	52
Cargo: Operador de Grua	53
Setor: GHE 14 - Operação com Cremalheira	53
Cargo: Operador de Cremalheira.....	54
Cargo: Servente	55
Setor: GHE 15 - Administração	55
Cargo: Estagiário (a)	56
Cargo: Jovem aprendiz	56
Setor: GHE 16 - Portaria	56
Cargo: Porteiro	56
Setor: GHE 17 - Pintura	56
Cargo: Meio Oficial de Pintor.....	58
Cargo: Pintor.....	59
Setor: GHE 18 - Administração 2.....	59
Cargo: Menor Aprendiz	60
Objetivo.....	60
OBSERVAÇÕES:	60

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	--	---

Identificação

Empresa INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA			
Endereço Rua 83, 643		Complemento QUADRA F20 LOTE 77	CNPJ 44.626.582/0001-91
CEP 74083-195	Cidade Goiânia	Bairro Setor Sul	UF GO
CNAE 4120-4/00	Grau de Risco 3	Descrição CNAE Construção de edifícios	

NORMA REGULAMENTADORA - NR7

O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) visa atender o disposto na Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, e Normas Regulamentadoras, especificamente a NR-7, de 08/06/1978, com modificações do texto através de portarias anteriores.

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. Estabelece, ainda, os parâmetros e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO.

OBJETIVO

Cumprir a Portaria nº 24 de 29/12/94 e alterada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, que estabelece novo texto da Norma Regulamentadora NR-7 promovendo o "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional" - PCMSO, com finalidade de promoção e manutenção da saúde do trabalhador.

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização (empresa).

O PCMSO visa o monitoramento biológico da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, contribuindo positivamente nos seguintes pontos:

- ✓ Diminuição do absenteísmo por motivos médicos ocupacionais;
- ✓ Melhoria na produtividade;
- ✓ Melhoria na qualidade de vida no trabalho;
- ✓ Melhoria das relações do trabalho;
- ✓ Aumento do comprometimento e satisfação dos colaboradores com a empresa.

O PCMSO pode ser alterado caso houver revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ou AET (Análise Ergonômica do Trabalho), ao detectar mudanças nos riscos ocupacionais passíveis de controle biológico, convenção coletiva do trabalho ou por determinação legal ou de órgão fiscalizador ou quando de sua revisão anual.

Alterações também podem surgir quando o médico detectar novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes; mudança de critérios de interpretação dos exames.

Deve haver a correlação do PCMSO com o ambiente de Trabalho, guardando a estreita relação com as características do ambiente e com os riscos inerentes à natureza e à organização do trabalho.

DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa harmonizado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR-1, NR-9, NR-17 e NR-18.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;

- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na empresa;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada os empregados, cujos estados de saúde possam ser especialmente afetados pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) monitorar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

Obs: A responsabilidade técnica- médica pelo PCMSO tem a vigência do período contratual com o Seconci-GO, em caso de não renovação do contrato ou cancelamento do mesmo a responsabilidade técnica cessa a partir da data desta rescisão.

PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

São considerados riscos ocupacionais para fins de monitoramento biológico e vigilância à saúde (e, portanto, constar em ASO), os agentes físicos, químicos e biológicos, reconhecido no PGR, que quantitativamente estão acima do nível de ação determinados na NR-09, ou o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Exceção aos riscos de poeiras, no qual, seguiremos conforme anexo III da NR-07. Assim também, para os agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR-07.

Os agentes que não possuem limites de tolerância, ou seja, que não possuem concentração ou intensidade máxima ou mínima identificada como segura, capaz de causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, devem determinar monitoramento biológico e vigilância à saúde sempre que reconhecidos.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A empresa deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;

- e) Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa;

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da empresa, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento PCMSO deverá incluir a realização de exames médicos ocupacionais que incluem a avaliação clínica constituída pela anamnese ocupacional, exame físico e mental, bem como a realização de exames complementares conforme o risco ocupacional a que o trabalhador estiver exposto.

RESPONSABILIDADES

1) Da empresa:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

2) Do Médico Responsável pelo PCMSO

- a) Elaborar e implementar o PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores;
- b) Planejar, analisar, controlar e acompanhar o desenvolvimento e execução do PCMSO e seus resultados;
- c) Elaborar o Relatório Analítico do PCMSO;
- d) Realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar a realização dos mesmos aos médicos examinadores;
- e) Gerenciar os casos que apresentem algum comprometimento da saúde relacionado ao trabalho ou não, decorrente dos exames médicos e/ou complementares;
- f) Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- g) Informar à empresa, constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR-07. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.
- h) Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO.
- i) Avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
- j) Prestar esclarecimentos, quando solicitado sobre os problemas de saúde ocupacional, respeitando o princípio ético do sigilo médico.
- k) Discutir conjuntamente com os profissionais da área de Segurança do Trabalho e/ ou Meio Ambiente, medidas preventivas quanto à melhoria do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa.

3) Do Médico Examinador

- a) Executar os exames médicos: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissionais, examinando os trabalhadores, avaliando os resultados dos exames complementares, informando aos mesmos os resultados dos exames;
- b) Comunicar o Médico Responsável pelo PCMSO e ao empregado, sempre que necessário, ao constatar uma ocorrência ou agravamento de doenças do trabalho ou ocupacionais, através de exames médicos, ou ao verificar as alterações que revelem qualquer tipo de disfunção;
- c) Indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho;
- d) Quando orientado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causais, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.

4) Do Empregado

- a) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- b) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- c) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela empresa;
- d) Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança, saúde e meio ambiente, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;
- e) Comunicar imediatamente, ao médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando acometido por problemas de saúde.

EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

1) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O médico examinador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias:

- 1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da Fiscalização do Trabalho;
- 2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via;
- 3. A terceira via do ASO ficará arquivada no SECONCI-GO, dentro do prontuário médico do paciente.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) Razão social e CNPJ da empresa;
- b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO;
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas (trabalho em altura e trabalho em espaço confinado), quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

2) Exames Médicos Ocupacionais

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, os quais compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma e de outras NR:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de Riscos Ocupacionais;
- e) Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- I - No Exame Admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
- II - No Exame Periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
- b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Os exames periódicos que apresentarem alguma alteração terão novas orientações com periodicidade, acréscimo ou repetições de exames complementares a critério do Médico Responsável pelo PCMSO.

III. No Exame de Retorno ao Trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

IV. O Exame de Mudança de Risco Ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

VI. No Exame Demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Observações:

- O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.
- Quando a empresa realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.
- Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
- Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
- Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.
- Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.
- A monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, a níveis de pressão sonora elevados e a substâncias cancerígenas e radiações ionizantes ficará a critério do PGR da empresa.
- No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:
 - Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
 - Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
 - Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
 - Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

- O empregado, em uma das situações previstas anteriormente, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

Por sua vez, o **Anexo II - Controle Médico Ocupacional da Exposição a Níveis de Pressão Sonora Elevados** versa sobre a periodicidade dos exames audiométricos:

O exame audiométrico deve ser realizado, no mínimo:

- a) na admissão;
- b) anualmente, tendo como referência o exame audiométrico admissional;
- c) na demissão.

3) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA

A meia-vida de uma substância ou de seu metabólito determina o momento em que deve ser realizada a coleta da amostra de material biológico para análise.

A meia-vida da maioria das substâncias do quadro I da NR-7 é curta ou muito curta e como existe a necessidade de um período entre o início da exposição ao agente químico e a possibilidade de se utilizar a dosagem biológica como indicador, o monitoramento da exposição a tais substâncias pode ser utilizada como indicador após 06 meses de exposição.

A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser realizada semestralmente (Exame Periódico).

Lista de Substâncias Quadro 1 – Anexo I NR-7

- Acetona
- Anilina
- Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e Arsenato de Gálio
- Benzeno
- 1,3 butadieno
- 2-butoxietanol
- Sulfeto de carbono
- Clorobenzeno
- Monóxido de carbono
- Chumbo tetraetila
- Cromo hexavalente (compostos solúveis)
- Cobalto e seus compostos inorgânicos (incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio)
- Ciclohexanona
- Diclorometano
- Dimetilacetamida
- Dimetilformamida
- Etoxietanol e Etoxietilacetato
- Óxido de etileno
- Etilbenzeno
- Furfural
- 1,6 diisocianato de hexametileno (HDI)
- n-hexano
- Mercúrio metálico
- Metanol
- Indutores de Metahemoglobina
- 2-metoxietanol e 2- metoxietilacetato
- Metil butil cetona
- 1,1,1 Tricloroetano
- Metiletilcetona (MEK)
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- N-metil-2- pirrolidona
- Nitrobenzeno
- Fenol
- 2-propanol
- Estireno
- Tetracloroetileno
- Tetrahidrofurano

- Tolueno
- 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos dois isômeros)
- Tricloroetileno
- Xilenos

4) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO

O monitoramento biológico das substâncias com meia-vida prolongada, deverá ser realizado no Exame Admissional e no Exame Periódico semestralmente, assim como no Exame Demissional.

Lista de Substâncias Quadro 2 – Anexo I NR-7

- Cádmio e seus compostos inorgânicos
- Inseticidas inibidores da Colinesterase
- Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos
- Chumbo e seus compostos inorgânicos

5) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA EXPOSIÇÃO À BENZENO

Os exames de Hemograma Completo e Contagem de Reticulócitos serão realizados no Exame Admissional, Exame Periódico semestral e no Exame Demissional para os colaboradores expostos a benzeno, precisamente, os que manipulam combustíveis (gasolina, diesel, etc.).

6) EXAMES PARA TRABALHO EM ALTURA NO EXAME MÉDICO DEMISSSIONAL

Para os colaboradores que trabalham em altura, o Exame Médico Demissional contemplará apenas o Exame Clínico e Audiometria, visto que os mesmos estão previstos no item 3.4 do Anexo I da NR-7.

7) AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

A Avaliação Psicossocial é obrigatória para os colaboradores que executam trabalho em espaço confinado, segundo a NR-33, e será realizada no Exame Admissional e Periódico anual.

DOCUMENTOS

1) PRONTUÁRIO MÉDICO

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que sejam atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

2) RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela empresa, referentes aos empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A empresa deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O Relatório Analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da empresa, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na empresa.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados, podem elaborar Relatório Analítico apenas com as seguintes informações: número de exames clínicos realizados; número e tipos de exames complementares realizados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	---	-------------------

Unidade: NATURIA

GHE 01 - Engenharia

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Administrativo de Obras		
Descrição detalhada: Abrangendo desde a gestão de documentos e finanças até o apoio à equipe e a organização do canteiro de obras.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NA ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Cargo: Analista de Engenharia		
Descrição detalhada: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão de obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Assistente de Engenharia			
Descrição detalhada: Auxiliar engenheiro, verifica e recebe frente de serviço			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NA ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Auxiliar de Engenharia			
Descrição detalhada: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão de obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Auxiliar de Escritório			
Descrição detalhada: Controle documentação, auxiliar a equipe da administração.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025																														
Cargo: Coordenador de Obras Descrição detalhada: Planejam, organizam e controlam atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos, negociações. <table><thead><tr><th>Perigo / Fator de Risco</th><th>Grupo</th><th>Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde</th></tr></thead><tbody><tr><td>Radiação não ionizante</td><td>Físico</td><td>Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.</td></tr><tr><td>Ruído</td><td>Físico</td><td>A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível</td></tr><tr><td>Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)</td><td>Químico</td><td>Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse</td></tr><tr><td>Sílica Livre</td><td>Químico</td><td>A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).</td></tr><tr><td>Postural</td><td>Ergonômicos</td><td>O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.</td></tr><tr><td>Arranjo físico inadequado (Perfuração)</td><td>Acidente</td><td>Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.</td></tr><tr><td>Piso irregular ou em desnível</td><td>Acidente</td><td>Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.</td></tr><tr><td>Queda de materiais</td><td>Acidente</td><td>Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.</td></tr><tr><td>Trabalho em Altura</td><td>Acidente</td><td>Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.</td></tr></tbody></table>				Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde																															
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.																															
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível																															
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse																															
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).																															
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.																															
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.																															
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.																															
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.																															
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.																															

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA				12/11/2025
Cargo: Engenheiro Civil					
Descrição detalhada: Gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento.					
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde			
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.			
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível			
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse			
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).			
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.			
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.			
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.			
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.			
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.			

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Estagiário de Engenharia					
Descrição detalhada: Auxilia engenheiro nas atividades de engenharia, medições de serviços terceirizados, conferência de serviços, preenchimento de folha de verificação de serviços.					
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde			
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.			

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 02 - Segurança do Trabalho

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Auxiliar de Segurança do Trabalho		
Descrição detalhada: Auxilia o técnico de segurança na realização dos treinamentos, inspeciona e conscientiza o uso de EPI/EPC.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA PROTEÇÃO DA CIDADANIA DO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Acidente	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Coordenador de Segurança do Trabalho e Ações Sustentáveis		
Descrição detalhada: Supervisiona as ações do SESMT, orienta sobre as demandas de segurança e sustentabilidade, inspeções de canteiros de obras.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse

Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Acidente	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Estagiário de Técnico de Segurança		
Descrição detalhada: Auxilia o técnico de segurança na realização dos treinamentos, inspeciona e conscientiza o uso de EPI/EPC.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).

Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Acidente	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho		
Descrição detalhada: Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Acidente	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 03 - Supervisão de Atividades em Obra

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Encarregado de Abastecimento		
Descrição detalhada: Planejam, organizam e controlam atividades, equipes de trabalho de acordo com projeto e prazo estabelecido.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	--	---

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Encarregado de Instalações		
Descrição detalhada: Coordenação equipe hidráulica e elétrica, verificação e recebimento de frente de serviço.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
--------------------	-----------------	--

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Encarregado Geral

Descrição detalhada: Planejam, organizam e controlam atividades, equipes de trabalho de acordo com projeto e prazo estabelecido

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA					12/11/2025
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO	
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X	
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X		
(0531) ECG	X		12 meses		X		
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X		
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X		
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X	

Cargo: Mestre de Obras		
Descrição detalhada: Planejam, organizam e controlam atividades, equipes de trabalho de acordo com projeto e prazo estabelecido		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 04 - Almoxarifado

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.

Cargo: Almoxarife		
Descrição detalhada: Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Auxiliar de Almoxarife		
Descrição detalhada: Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA			12/11/2025
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 05 - Limpeza

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais		
Descrição detalhada: Zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza das áreas, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Separar materiais recicláveis para descarte. Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho. Varrer, passar pano, tirar poeira, retirar o lixo das áreas demandadas.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Dodecilbenzenossulfonato de sódio	Químico	Nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor, inflamação e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis. A ingestão de grande quantidade pode provocar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vômito.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	---	-------------------

Hipoclorito de Sódio	Químico	A ingestão do produto pode causar lesões graves no esôfago e estômago, como queimaduras, dor intensa, dificuldade para engolir, vômito com sangue e perfurações. O contato com a pele provoca queimaduras severas, com bolhas, dor e possível necrose dos tecidos. A exposição ocular pode resultar em lesões graves, incluindo queimaduras, irritação intensa, danos à córnea e, em casos extremos, perda permanente da visão. O produto é um corrosivo alcalino altamente perigoso
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
laúril eter sulfato de sódio	Químico	Nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor, inflamação e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis. A ingestão de grande quantidade pode provocar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vômito.
Bronopol	Químico	Nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor, inflamação e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, dor, lacrimejamento e possibilidade de lesões irreversíveis. A ingestão de grande quantidade pode provocar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vômito.
Microorganismos (Bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Biológico	Infecções em geral
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 06 - Produção 01

O profissional realiza suas atividades em diversos locais do canteiro de obras, podendo estar exposto a intempéries.

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Auxilia os pedreiros nas diversas atividades de reboco, contra piso e alvenaria.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
bisfenol-A- (epicloridrina) e resinas epoxídicas	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Queroseno	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas.
Naftaleno	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas
Monômero de Estireno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. A exposição repetida pode provocar danos ao sistema nervoso central.
Cimento Portland	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0102) Ácido Fenil-Glioxílico		6 meses	6 meses			
(0113) Ácido Mandélico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Pedreiro			
Descrição detalhada: Executam Alvenaria, contra piso e demais atividade pertinentes a função.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
bisfenol-A- (epicloridrina) e resinas epoxídicas	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas.	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Queroseno	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas.	
Naftaleno	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas	
Monômero de Estireno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. A exposição repetida pode provocar danos ao sistema nervoso central.	
Cimento Portland	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NA ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA				12/11/2025	
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO	
(0102) Acido Fenil-Glioxílico		6 meses	6 meses				
(0113) Acido Mandélico		6 meses	6 meses				
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X	
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X	
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X		
(0531) ECG	X		12 meses		X		
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X		
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X	
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X	
(130) Acido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses				
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X	

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxiliam nos serviços gerais de pedreiros, Limpeza e organização da obra, Carregamento e descarregamento de materiais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
bisfenol-A- (epicloridrina) e resinas epoxídicas	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Queroseno	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas.
Naftaleno	Químico	Provoca irritação na pele e nos olhos, podendo causar reações alérgicas cutâneas
Monômero de Estireno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. A exposição repetida pode provocar danos ao sistema nervoso central.
Cimento Portland	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Sílica livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0102) Ácido Fenil-Glioxílico		6 meses	6 meses			
(0113) Ácido Mandélico			6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 07 - Carpintaria

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Carpinteiro		
Descrição detalhada: Cortar conforme projeto as peças a serem utilizadas, Instalar e posicionar formas e desformas, Reparar peças de madeira, montar e seguir projeto conforme especificações. Executar atividades de Forma e desforma: com formas pré-moldadas de madeira. Escoramento todo em estrutura metálica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Dióxido de Titânio	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.

Etanol	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Poeira de Madeira	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tolueno	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Éster etílico do ácido acético	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Princípios de incêndio	Acidente	Queimaduras, desidratação, exaustão
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Acido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Cargo: Meio Oficial de Carpinteiro		
Descrição detalhada: Auxilia os carpinteiros nas atividades de confecção de formas e montagem de lajes.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Dióxido de Titânio .	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Etanol	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Poeira de Madeira	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tolueno	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Éster etílico do ácido acético	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Princípios de incêndio	Acidente	Queimaduras, desidratação, exaustão
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Acido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxiliam nos serviços gerais de carpinteiros, Limpeza e organização da obra, Carregamento e descarregamento de materiais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Dióxido de Titânio .	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Etanol	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Poeira de Madeira	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tolueno	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Éster etílico do ácido acético	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Éter Monobutílico de Etilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	O produto pode causar irritações reversíveis na pele, olhos e sistema respiratório, provocando vermelhidão, dor, ressecamento, lacrimejamento, dores de cabeça e tontura.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Princípios de incêndio	Acidente	Queimaduras, desidratação, exaustão
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 08 - Armação
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Cargo: Armador		
Descrição detalhada: Dobrar, cortar e fazer amarração de vigas e pilares		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Poeiras Respiráveis/Metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e Equipamentos - Policorte	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Meio Oficial de Armador			
Descrição detalhada: Auxilia os armadores nas atividades de dobrar, cortar e fazer amarração de vigas e pilares.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Poeiras Respiráveis/Metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e Equipamentos - Policorte	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Servente			
Descrição detalhada: Auxiliam nos serviços gerais de armação, Limpeza e organização da obra, Carregamento e descarregamento de materiais			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Poeiras Respiráveis/Metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e Equipamentos - Policorte	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
GHE 09 - Instalações Hidrossanitárias			
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.			
Cargo: Encanador			
Descrição detalhada: Faz a ligação da tubulação á prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	
Acetato de etila	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.	
Acetona (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.	
Hidróxido de potássio	Químico	Irritação a pele. Lesões oculares, Sensibilização respiratória ou a pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.
--------------------	-----------------	---

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Encanador		
Descrição detalhada: Auxilia os encanadores nas diversas atividades: ligação da tubulação á prumada e chumbamento dos registros na parede, instalação dos tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Acetato de etila	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.
Acetona (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.
Hidróxido de potássio	Químico	Irritação a pele. Lesões oculares, Sensibilização respiratória ou a pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse

Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxiliam nos serviços gerais de pedreiros, Limpeza e organização da obra, Carregamento e descarregamento de materiais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	---	-------------------

Acetato de etila	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.
Acetona (Risco trivial no PGR)	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.
Hidróxido de potássio	Químico	Irritação a pele. Lesões oculares, Sensibilização respiratória ou a pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômem geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 10 - Elétrica

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. DESENERGIZADO

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, fixar as caixas octogonais, fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, preencher as caixas com serragem umedecida, montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilado e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Aguarrás	Químico	Irritação Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Poliacrilato de sódio	Químico	Irritação Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Polietilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	Irritação Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Polipropilenos glicóis	Químico	Irritação Gastrintestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Acido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Eletricista

Descrição detalhada: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, fixar as caixas octogonais, fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, preencher as caixas com serragem umedecida, montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilado e eletrocabla. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Aguarrás	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Poliacrilato de sódio	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Polietilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Polipropilenos glicóis	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).

Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxiliam nos serviços gerais de elétrica, Limpeza e organização da obra, Carregamento e descarregamento de materiais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Aguarrás	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse

Poliacrilato de sódio	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Polietilenoglicol (Risco trivial no PGR)	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Polipropilenos glicóis	Químico	Irritação Gastrointestinal: Sinais/sintomas podem incluir dor abdominal, indisposição estomacal, náusea, vômito e diarreia.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 11 - Betoneira

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Operador de Betoneira

Descrição detalhada: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados (areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Umidade	Físico	Doenças do aparelho respiratório, doenças de pele
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Argamassa cimento Portland	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Aluminato Tricálcico	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Carbonato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Ferro-aluminato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Portland	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Silicato Dicálcico	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse
Cimento Silicato Tricálcico	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Sulfato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Óxido de cálcio (livre)	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Óxido de magnésio (livre)	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	---	-------------------

Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxiliam nos serviços gerais de pedreiros, Limpeza e organização da obra, Carregamento e descarregamento de materiais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Umidade	Físico	Doenças do aparelho respiratório, doenças de pele
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Argamassa cimento Portland	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Aluminato Tricálcico	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Carbonato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Ferro-aluminato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	---	-------------------

Cimento Portland	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Silicato Dicalcico	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse
Cimento Silicato Tricalcico	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Sulfato de Cálcio	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Óxido de cálcio (livre)	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Cimento Óxido de magnésio (livre)	Químico	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, osso, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA			12/11/2025		
GHE 12 - Sinalização de Grua						
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.						
Cargo: Servente						
Descrição detalhada: Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio						
Perigo / Fator de Risco		Grupo		Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde		
Radiação não ionizante		Físico		Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.		
Ruído		Físico		A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível		
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)		Químico		Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse		
Sílica Livre		Químico		A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).		
Levantamento e transporte manual de cargas		Ergonômicos		Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.		
Postural		Ergonômicos		O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.		
Arranjo físico inadequado (Perfuração)		Acidente		Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.		
Piso irregular ou em desnível		Acidente		Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.		
Queda de materiais		Acidente		Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte.		
Trabalho em Altura		Acidente		Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.		
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA PROTEÇÃO DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025																																	
Cargo: Sinaleiro Descrição detalhada: Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio. <table><thead><tr><th>Perigo / Fator de Risco</th><th>Grupo</th><th>Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde</th></tr></thead><tbody><tr><td>Radiação não ionizante</td><td>Físico</td><td>Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.</td></tr><tr><td>Ruído</td><td>Físico</td><td>A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível</td></tr><tr><td>Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)</td><td>Químico</td><td>Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse</td></tr><tr><td>Sílica Livre</td><td>Químico</td><td>A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).</td></tr><tr><td>Levantamento e transporte manual de cargas</td><td>Ergonômicos</td><td>Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.</td></tr><tr><td>Postural</td><td>Ergonômicos</td><td>O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.</td></tr><tr><td>Arranjo físico inadequado (Perfuração)</td><td>Acidente</td><td>Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.</td></tr><tr><td>Piso irregular ou em desnível</td><td>Acidente</td><td>Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.</td></tr><tr><td>Queda de materiais</td><td>Acidente</td><td>Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte.</td></tr><tr><td>Trabalho em Altura</td><td>Acidente</td><td>Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.</td></tr></tbody></table>				Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte.	Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde																																		
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.																																		
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível																																		
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse																																		
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).																																		
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.																																		
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.																																		
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.																																		
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.																																		
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte.																																		
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.																																		

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 13 - Operação de Grua
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
Cargo: Operador de Grua			
Descrição detalhada: Opera a grua içando aço, viga, pilar e outros materiais pertinentes da construção civil.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Vibração de corpo inteiro	Físico	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros	
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	

GHE 14 - Operação com Cremalheira
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Operador de Cremalheira		
Descrição detalhada: Operar elevador cremalheira transportando pessoas e materiais (argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros). acompanhar as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível.



Vibração (corpo inteiro)	Físico	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Operar elevador cremalheira transportando pessoas e materiais (argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros). acompanhar as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível


 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA			12/11/2025
Vibração (corpo inteiro)	Físico	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros	
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Sílica Livre	Químico	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 15 - Administração

Os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial.

Cargo: Estagiário (a)		
Descrição detalhada: Auxiliar nas atividades operacionais do departamento.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA					12/11/2025	
	Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
	(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Jovem aprendiz (Maior ou igual a 18 anos)		
Descrição detalhada: Auxilia no recebimento de notas, materiais, auxilia departamentos. Auxilia no recebimento de notas fiscais, materiais e auxilia os departamentos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

GHE 16 - Portaria
O profissional desenvolve suas atividades em um ambiente com pé-direito de aproximadamente 3 metros, sendo a ventilação e iluminação proporcionadas tanto de forma natural quanto artificial.

Cargo: Porteiro		
Descrição detalhada: Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários. Abrir e fechar as dependências de prédios.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Violência Física	Acidente	Lesões superficiais, traumas e hemorragias.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	

GHE 17 - Pintura
O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Meio Oficial de Pintor		
Descrição detalhada: Auxilia no preparo, lixamento, pintura e acabamento de superfícies.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.

Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Acetato de etila	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras; causa lesões oculares graves e pode gerar reações alérgicas cutâneas, como coceira e dermatite. Não há expectativa de sensibilização respiratória.
Butano	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
Metil etil cetona	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
Mistura de 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona	Químico	O contato direto com a pele pode causar irritações.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tolueno	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras; causa lesões oculares graves e pode gerar reações alérgicas cutâneas, como coceira e dermatite. Não há expectativa de sensibilização respiratória.
Xileno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
propano	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
Alcool etílico	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras; causa lesões oculares graves e pode gerar reações alérgicas cutâneas, como coceira e dermatite. Não há expectativa de sensibilização respiratória.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .
--------------------	-----------------	---

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0116) Ácido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	X
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Pintor		
Descrição detalhada: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando amassando e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais, etc.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Vibrações localizadas (mão e braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Acetato de etila	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras; causa lesões oculares graves e pode gerar reações alérgicas cutâneas, como coceira e dermatite. Não há expectativa de sensibilização respiratória.
Butano	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
Metil etil cetona	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
Mistura de 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona	Químico	O contato direto com a pele pode causar irritações.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA	12/11/2025
---	---	-------------------

Tolueno	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras; causa lesões oculares graves e pode gerar reações alérgicas cutâneas, como coceira e dermatite. Não há expectativa de sensibilização respiratória.
Xileno	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
propano	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura
Alcool etílico	Químico	Provoca irritação na pele com vermelhidão, ressecamento e rachaduras; causa lesões oculares graves e pode gerar reações alérgicas cutâneas, como coceira e dermatite. Não há expectativa de sensibilização respiratória.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados .

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0116) Acido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA		12/11/2025
	GHE 18 - Administração 2 Os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial.		

Cargo: Menor Aprendiz (Desenvolverá atividades administrativas no escritório da construtora. Não atuará na obra) Descrição detalhada: Menor aprendiz auxilia nas tarefas de rotina, como receber e responder chamadas telefônicas, fazer e receber correspondências, organizar e arquivar, documentos, gerenciar agendas e agendamentos, coordenar reuniões e preparar a documentação necessária.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ausência de Fator/Agente de Risco	Inespecífico	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

OBSERVAÇÕES:

- Os exames complementares específicos para “trabalho em altura” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo e Glicemia de jejum. Algumas empresas optaram pela realização da Avaliação Psicossocial no Exame Admissional, sendo que a critério do médico examinador, esta avaliação pode ser solicitada durante o exame médico ocupacional, caso necessário.
- Os exames complementares específicos para “trabalho em espaço confinado” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo, Glicemia de jejum, Espirometria, Rx de tórax OIT, Avaliação Psicossocial (obrigatório no Exame Admissional e Exame Periódico).
- O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de baixo custo, integrar o conjunto de medidas preventivas dos Programas de Saúde Ocupacional a serem implantados, com diminuição do risco de absenteísmo.

Além disso, é um programa que assegura a prevenção de doenças que interferem na capacidade produtiva, evitando faltas, licenças temporárias por motivos de doenças e as aposentadorias precoces.

De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador.

Orienta-se também que a empresa mantenha junto ao ASO admissional, cópia do cartão de vacinação atualizado.

VACINAS RECOMENDADAS	DOSAGENS E INTERVALOS
Dupla Adulto	Três doses em não vacinados => 0, 60 e 120 dias (e reforço a cada 10 anos) Observação: esquema diferenciado para gestante
Influenza	Dose única anual
Covid-19	Conforme Programa Nacional de Imunizações - PNI
Febre Amarela	Dose única Observação: Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

A vacina é encontrada na rede pública de saúde, segue lista de postos de vacinação em Goiânia:

Funcionamento das salas de vacinas

SIM (SE ESTIVER FUNCIONANDO);
NÃO (CASO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO)

Unidade	Rotina (todas do Calendário Nacional de Vacinação)		Covid	
	Matutino	Vespertino	Matutino	Vespertino
Distrito Campinas-Centro				
1. Marinho Lemos	não	não	não	não
2. Cais Campinas	sim	sim	não	não
3. Canaa	não	não	sim	não
4. Crimeia leste	sim	sim	sim	sim
5. Leste Universitário	não	não	sim	sim
6. Norte Ferroviário	sim	sim	sim	sim
7. Cidade Jardim	sim	não	sim	não
8. Cais Vila Nova	sim	sim	sim	sim
9. CRASPI	Não faz	Não faz	sim	sim
10. Vila Morais	sim	não	sim	sim
11. Fama	sim	não	sim	sim
12. Santa Helena	sim	sim	sim	sim
13. Crimeia Oeste	não	não	sim	sim
14. Esplanada				
Distrito Leste				
15. CSF Santo Hilário	sim	sim	sim	sim
16. CSF Parque Atheneu	sim	sim	sim	sim
17. CSF Ville De France	não	sim	sim	sim
18. CS Água Branca	sim	não	sim	não
19. CSF Jd Dom Fernando	sim	sim	sim	sim
20. UPA Chácara do Governador	sim	sim	sim	sim
21. UPA Novo Mundo	sim	sim	sim	sim
22. CSF Aruanã 3	sim	sim	sim	sim
23. Cais Amendoeiras	não	sim	sim	sim
24. CSF Recanto das Minas Gerais	não	sim	sim	sim
Distrito Sudoeste				
25. Ciams Novo Horizonte	Não	Não	Sim	Sim
26. CSF Real Conquista	sim	sim	sim	sim
27. CS Pq Anhanguera	Não	Sim	Sim	Sim
28. CS Vila União	Sim	Sim	Sim	Sim
29. CSF Garavelo B	sim	sim	sim	sim
30. CSF Eli Forte	sim	sim	sim	sim
31. CSF Caravelas	sim	sim	sim	sim
32. CSF Andréia Cristina	sim	não	sim	sim
33. CSF Condomínio das Esmeraldas	Sim	Não	Sim	Sim
34. CSF Pq Santa Rita	Sim	Sim	Sim	Sim
35. CSF Madre Germana	sim	sim	sim	sim
36. CS Vila Mauá	não	não	sim	sim

37. CSF Residencial Itaipu	sim	não	sim	sim
38. CS Vila Boa	não	não	sim	sim
Distrito Sul				
39. Centro Municipal de Vacinação	Sim	Sim	Sim	Sim
40. CS Pq Amazônia	Não	Não	Sim	Sim
41. CS Vila Redenção	Não	Sim	Sim	Não
Distrito Noroeste				
42. CSF Alto do Vale	sim	sim	sim	sim
43. CSF Finsocial	sim	sim	sim	sim
44. CSF Estrela Dalva	sim	sim	sim	sim
45. Cais Cândida de Moraes	sim	não	sim	não
46. CSF Brisas da Mata	sim	sim	sim	sim
47. CSF Novo Planalto	sim	sim	sim	sim
48. CSF Boa Vista	sim	sim	sim	sim
49. CSF Curitiba	sim	sim	sim	sim
50. CSF São Carlos	sim	sim	sim	sim
51. CSF Jd Primavera	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.
52. CSF Vila Mutirão	não	não	sim	sim
Distrito Oeste				
53. Cais Bairro Goiá	sim	sim	sim	sim
54. CSF Jd Cerrado 4	sim	sim	sim	sim
55. CS Vila Regina	sim	sim	sim	sim
56. CSF Pq dos Buritis	sim	sim	nao	nao
57. CSF Buena Vista	sim	sim	nao	nao
58. CSF Eldorado Oeste	sim	sim	sim	sim
59. CSF São Francisco	sim	sim	sim	sim
60. CSF João Braz	sim	sim	sim	sim
61. CSF Goiânia Viva	sim	sim	sim	sim
62. CSF Vera Cruz I	sim	sim	não	não
63. CSF Vera Cruz II	sim	não	sim	sim
64. CSF Jd Cerrado 6	sim	não	não	não
Distrito Norte				
65. CS Itatiaia	sim	não	sim	sim
66. CS Balneário Meia Ponte	sim	não	sim	sim
67. CS São Judas Tadeu	sim	sim	sim	sim
68. CS Vila Clemente	sim	não	sim	sim
69. CSF Guanabara I	sim	sim	sim	sim
70. Ciams Urias Magalhães	sim	não	sim	sim
71. CSF Cachoeira Dourada	sim	sim	sim	sim
72. CSF Vale dos Sonhos	sim	sim	sim	sim
73. CS Perim	sim	não	sim	sim

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Este cronograma contempla a realização dos Exames Médicos de Saúde Ocupacional a serem feitos no SECONCI-GO, Visitas Orientativas da equipe do SECONCI-GO à empresa/obra, Palestras Educativas na empresa/obra. No caso das palestras educativas, o detalhamento da programação se encontra em planilha específica na página a seguir deste anexo.

PERÍODO:

**NOVEMBRO DE 2025 A
NOVEMBRO DE 2026**

AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)

EMPRESA: INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA

Local: NATURIA

MÊS ANO	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	OBSERVAÇÕES
1 – Exames Médicos Ocupacionais														Realizados no Seconci-GO, agendados pela empresa.
2 – Palestras					X					X				Terão carga horária de 1 hora e serão ministradas no canteiro de obras.
3 – Elaboração de Relatório Analítico													X	Médico Responsável Pelo PCMSO

Obs: Importante justificar com antecedência mínima de 10 dias úteis, qualquer impossibilidade de realização das palestras agendadas pelo SECONCI-GO. O cancelamento sem aviso prévio implicará em ressarcimento das despesas com o palestrante e o deslocamento.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

MÊS/ANO	TEMA	Carga Horária	Local:	Horário	Palestrante
MAR/26	Noções básicas sobre VACINAÇÃO	1 hora	Locais de Trabalho		
AGO/26	Noções básicas sobre DOENÇAS SILENCIOSAS	1 hora	Locais de Trabalho		

OBS: Todas as Palestras serão registradas em lista de presença assinada pelos participantes.
Os temas sugeridos poderão sofrer alterações conforme necessidade constatada.

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO

Data	Tema	Data da Remarcação	Horário	Motivo

A data da palestra remarcada não poderá sofrer mais alteração.

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
01 á 250 colaboradores		Quantidade
1	Bolsa de Resgate / Cx de acondimentos de PS	1 UNIDADE
2	Kit de prancha longa em polietileno completo	1 UNIDADE
3	Reanimador manual adulto (AMBU)	1 UNIDADE
4	Tesoura sem ponta (tamanho médio)	1 UNIDADE
5	Caixa de luvas (tamanho: M e G)	1 UNIDADE
6	Caixa de máscara descartáveis	
7	Máscara de RCP descartável	5 UNIDADES
8	Manta térmica	1 UNIDADE
9	Óculos de proteção	1 UNIDADE
10	Esparadrapo impermeável	2 UNIDADES
11	Caixa de curativo adesivo (band-aid) pequena	1 UNIDADE
12	Caixa de curativo adesivo (band-aid) grande	1 UNIDADE
13	Ataduras de crepe de 6 e 10 cm	3 UNIDADES DE CADA
14	Bandagens triangulares (Tecido de algodão cru -tamanhos P, M e G)	2 UNIDADES DE CADA
15	Colar cervical ajustável (Tamanho: P, M e G)	1 UNIDADES DE CADA
16	Kit de talas moldável aramada Eva para imobilização de membros	1 UNIDADE
17	Compressa de gazes estéril (7,5 x 7,5 cm)	10 UNIDADES
18	Antisséptico (Digliconato de Clorexidina)	2 UNIDADE EM SPRAY
19	Soro fisiológico 0,9% de 100 ML	10 UNIDADES
20	Saco plástico branco leitoso	20 UNIDADES
21	Termômetro infravermelho	1 UNIDADE
22	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço	1 UNIDADE

OBSERVAÇÕES:

Caso realize a abertura do **soro fisiológico** realizar o descarte do mesmo não fazer o reaproveitamento para outro atendimento.

Todo **descarte de material** utilizado em qualquer atendimento de emergência deve ser depositado no **saco branco leitoso** e fazer o descarte do mesmo em PS mais próximo juntamente com o lixo infectante.

Para a utilização de **AMBU** e **COLAR CERVICAL** só pode ser realizado com pessoas treinadas para a utilização do mesmo.

Caso a obra passe de 251 colaboradores, entrar em contato com pcmso@seconcigoias.com.br para (contemplar uma nova planilha de sugestão de suprimentos) Adendo ao PCMSO.

DECLARAÇÃO

Prezado(a), Senhor(a).

Declaramos que a empresa **INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA**, recebeu todas as orientações relacionadas ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

- ✓ Exames Médicos Ocupacionais;
- ✓ Exames Complementares;
- ✓ Periodicidade;
- ✓ E demais itens relacionados ao PCMSO

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Responsável pela empresa

Responsável pelo SECONCI

TERMO DE COMPROMISSO

Assumo, em nome da Empresa **INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA** o compromisso de seguir as orientações do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprir suas determinações, contribuindo para a realização de todas as medidas preventivas de saúde adotadas:

- 1) Encaminhar ao Seconci mensalmente o número de trabalhadores da empresa;
- 2) Controle de absenteísmo acompanhar as faltas e seus motivos, informando as anormalidades encontradas e em conjunto com o Seconci tentar encontrar medidas eficazes;
- 3) Controlar e encaminhar ao Seconci os trabalhadores para realização dos Exames Médicos Ocupacionais e possibilitar a realização dos Exames Complementares solicitados;
- 4) Controlar e acompanhar todo processo de vacinação;
- 5) Controlar e acompanhar o Planejamento de Ações.

Através desses procedimentos que serão de responsabilidade da empresa, com orientações do Seconci, será permitido realizar uma avaliação das medidas de saúde adotadas com o PCMSO, inclusive o custo / benefício de sua implantação.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Nome do Responsável na Empresa pelo Acompanhamento do Programa:

Assinatura do Responsável:

Quadro de Recomendação de Exames

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Administrativo de Obras	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Analista de Engenharia	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Assistente de Engenharia	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Auxiliar de Engenharia	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Auxiliar de Escritório	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Coordenador de Obras	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Engenheiro Civil	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 01 - Engenharia	Estagiário de Engenharia	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 02 - Segurança do Trabalho	Auxiliar de Segurança do Trabalho	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Bater contra ou ser atingido por (trânsito) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 02 - Segurança do Trabalho	Coordenador de Segurança do Trabalho e Ações Sustentáveis	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Bater contra ou ser atingido por (trânsito) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

NATURIA	GHE 02 - Segurança do Trabalho	Estagiário de Técnico de Segurança	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Bater contra ou ser atingido por (trânsito) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 02 - Segurança do Trabalho	Técnico de Segurança do Trabalho	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Bater contra ou ser atingido por (trânsito) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 03 - Supervisão de Atividades em Obra	Encarregado de Abastecimen to	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 03 - Supervisão de Atividades em Obra	Encarregado de Instalações	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 03 - Supervisão de Atividades em Obra	Encarregado Geral	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

NATURIA	GHE 03 - Supervisão de Atividades em Obra	Mestre de Obras	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 04 - Almoxarifad o	Almoxarife	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 04 - Almoxarifad o	Auxiliar de Almoxarife	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamen	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0295) Exame Clínico

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	leitor habilitado		leitor habilitado	leitor habilitado	leitor habilitado	
NATURIA	GHE 05 - Limpeza	Auxiliar de Serviços Gerais	Radiação não ionizante Ruído Dodecilbenzenossulfonato de sódio Hipoclorito de Sódio Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre lauril eter sulfato de sodio Microrganismos (Bactérias, vírus, fungos e protozoários)) Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 06 - Produção 01	Meio Oficial de Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Argamassa cimento Portland Cimento Aluminato Tricálcico Cimento Carbonato de Cálcio Cimento Ferro-alumínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem		(0102) Acido Fenil-Glioxílico (0113) Acido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			ato de Cálcio Cimento Portland Cimento Silicato Dicálcico Cimento Silicato Tricálcico Cimento Sulfato de Cálcio Cimento Oxido de cálcio (livre) Cimento Oxido de magnésio (livre) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans, Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	recente), com pelo menos um leitor habilitado	de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 06 - Produção 01	Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Argamassa cimento Portland Cimento Aluminato Tricálcico Cimento Carbonato de Cálcio Cimento Ferro-alumina to de Cálcio Cimento Portland	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia		(0102) Ácido Fenil-Glioxílico (0113) Ácido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia	(0295) Exame Clínico

			Cimento Silicato Dicálcico Cimento Silicato Tricálcico Cimento Sulfato de Cálcio Cimento Oxido de cálcio (livre) Cimento Oxido de magnésio (livre) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Acido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	habilitado	de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 06 - Produção 01	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Argamassa cimento Portland Cimento Aluminato Tricálcico Cimento Carbonato de Cálcio Cimento Ferro-alumin ato de Cálcio Cimento Portland Cimento Silicato Dicálcico Cimento	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente),		(0102) Acido Fenil-Glioxili co (0113) Acido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente),	(0295) Exame Clínico

			Silicato Tricálcico Cimento Sulfato de Cálcio Cimento Oxido de cálcio (livre) Cimento Oxido de magnésio (livre) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	com pelo menos um leitor habilitado		Reticulócitos (130) Acido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 07 - Carpintaria	Carpinteiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio Dióxido de Titânio . Etanol Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Poeira de Madeira Tolueno Ester etílico do ácido acético	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0951) O-cresol urinário (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Acido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			Eter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Princípios de incêndio Queda de materiais Trabalho em Altura			OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado			
NATURIA	GHE 07 - Carpintaria	Meio Oficial de Carpinteiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio Dióxido de Titânio . Etanol Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Poeira de Madeira Tolueno Ester etílico do ácido acético Eter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0951) O-cresol urinário (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos os Piso irregular ou em desnível Princípios de incêndio Queda de materiais Trabalho em Altura						
NATURIA	GHE 07 - Carpintaria	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio Dióxido de Titânio . Etanol Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Poeira de Madeira Tolueno Éster etílico do ácido acético Éter Monobutílico de Etilenoglicol Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos os Piso irregular ou em desnível Princípios de incêndio Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0951) O-cresol urinário (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico		

NATURIA	GHE 08 - Armação	Armador	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeiras Respiráveis/ Metálicas Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e Equipamentos - Policorte Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 08 - Armação	Meio Oficial de Armador	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeiras Respiráveis/ Metálicas Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e Equipamentos - Policorte Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 08 - Armação	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeiras Respiráveis/ Metálicas	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562)	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA						12/11/2025	
			Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e Equipamentos - Policorte Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		hemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 09 - Instalações Hidrossanitárias	Encanador	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Acetato de etila Acetona Hidróxido de potássio Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e Equipamentos - Policorte Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	

NATURIA	GHE 09 - Instalações Hidrossanitárias	Meio Oficial de Encanador	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Acetato de etila Acetona Hidróxido de potássio Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 09 - Instalações Hidrossanitárias	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Acetato de etila Acetona Hidróxido de potássio Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura						
NATURIA	GHE 10 - Elétrica	Eletricista	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Agarras Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Poliacrilato de sódio Polietilenoglicol Polipropileno s glicóis Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 10 - Elétrica	Meio Oficial de Eletricista	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Agarras Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0295) Exame Clínico

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA							12/11/2025
			não especificado s de outra maneira (PNOS) Poliacrilato de sódio Polietilenoglicol Polipropileno s glicóis Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 10 - Elétrica	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Agarras Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Poliacrilato de sódio Polietilenoglicol Polipropileno s glicóis Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			Queda de materiais Trabalho em Altura						
NATURIA	GHE 11 - Betoneira	Operador de Betoneira	Radiação não ionizante Ruído Umidade Vibração (mãos e braços) Argamassa cimento Portland Cimento Aluminato Tricálcico Cimento Carbonato de Cálcio Cimento Ferro-aluminato de Cálcio Cimento Portland Cimento Silicato Dicálcico Cimento Silicato Tricálcico Cimento Sulfato de Cálcio Cimento Óxido de cálcio (livre) Cimento Óxido de magnésio (livre) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

NATURIA	GHE 11 - Betoneira	Servente	Radiação não ionizante Ruído Umidade Vibração (mãos e braços) Argamassa cimento Portland Cimento Aluminato Tricálcico Cimento Carbonato de Cálcio Cimento Ferro-aluminato de Cálcio Cimento Portland Cimento Silicato Dicálcico Cimento Silicato Tricálcico Cimento Sulfato de Cálcio Cimento Óxido de cálcio (livre) Cimento Óxido de magnésio (livre) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
---------	--------------------	----------	---	---	---	---	-----------------------------

NATURIA	GHE 12 - Sinalização de Grua	Servente	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 12 - Sinalização de Grua	Sinaleiro	Radiação não ionizante Ruído Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

NATURIA	GHE 13 - Operação de Grua	Operador de Grua	Radiação não ionizante Ruído Vibração de corpo inteiro Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 14 - Operação com Cremalheira	Operador de Cremalheira	Radiação não ionizante Ruído Vibração (corpo inteiro) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 14 - Operação com Cremalheira	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração (corpo inteiro) Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente),	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0295) Exame Clínico

			s de outra maneira (PNOS) Sílica Livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	com pelo menos um leitor habilitado	jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
NATURIA	GHE 15 - Administração	Estagiário (a)	Postural Piso irregular ou em desnível	(0295) Exame Clínico		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 15 - Administração	Jovem aprendiz	Postural Piso irregular ou em desnível	(0295) Exame Clínico		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 16 - Portaria	Porteiro	Ruído Postural Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Violência Física	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico
NATURIA	GHE 17 - Pintura	Meio Oficial de Pintor	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Acetato de etila Butano Metil etil cetona Mistura de 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) Tolueno Xileno propano	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			Álcool etílico Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura			OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado			
NATURIA	GHE 17 - Pintura	Pintor	Radiação não ionizante Ruído Vibrações localizadas (mão e braço) Acetato de etila Butano Metil etil cetona Mistura de 5-cloro-2me til-2H-isotiaz ole-3-ona Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) Tolueno Xileno propano Álcool etílico Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Arranjo físico inadequado (Perfuração) Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico	

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional INCORPORAÇÃO R78 SPE LTDA						12/11/2025	
NATURIA	GHE 18 - Administração 2	Menor Aprendiz	Ausência de Fator/Agente de Risco	(0295) Exame Clínico		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

Carolini Miranda Polesso Lisita
 Médico responsável pelo PCMSO
 CRM: 14864/GO
 Especialidade:
 Medicina do Trabalho

