

# Fabogesic Niños

## Ibuprofeno 2%



Suspensión Oral 2%

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

### ¿Qué contiene FABOGESIC NIÑOS?

FABOGESIC NIÑOS contiene 2 gramos de ibuprofeno cada 100 ml de suspensión.

Otros componentes de la suspensión: tween 80; benzoato de sodio; aspartame; acesulfame potásico; goma xántica; sorbitol 70%; ácido cítrico; glicerina destilada; colorante rojo allura; esencia de cereza líquida; esencia de banana líquida; agua purificada.

### Acciones

Calma el dolor, alivia la fiebre y la inflamación.

### ¿Para qué se usa FABOGESIC NIÑOS?

FABOGESIC NIÑOS se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfrios y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

### ¿Qué personas NO pueden recibir FABOGESIC NIÑOS?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno o a alguno de los ingredientes de la fórmula. No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico:

Si el niño se encuentra recibiendo otra medicación, presentó problemas o efectos adversos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran, si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre erupción de la piel, náuseas y/o vómitos.

Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos; si en el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción, si aparecen síntomas nuevos.

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé.

Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos.

No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días par el dolor

No utilizar contra el dolor de estomago.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, como trastornos gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor de estómago), erupción en la piel con ronchas y/o picazón, alteraciones respiratorias, como dificultad para respirar, sensación de falta de aire, vértigo y dolor de cabeza. Raramente el tratamiento puede producir alteraciones de los análisis de laboratorio (aumento de enzimas hepáticas), retención de líquidos, y disminución de los glóbulos blancos.

SI EL DOLOR O LA FIEBRE PERSISTEN POR MAS DE 2 DÍAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO.

### ¿Cómo se usa FABOGESIC NIÑOS?

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

Utilizar el vaso dosificador que acompaña éste envase.

Peso en kilos	Edad (años)	Dosis (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml
16 a 21	4 a 5	7,5 ml
21 a 27	6 a 8	10 ml
27 a 32	9 a 10	12,5 ml
Más de 32	Más de 10	15 ml

En caso que sea necesario, repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

\*AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR\*

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

**Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**

**Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**Tel.: (011) 4961 8447**

### ¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

### Forma de Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos del calor y la luz solar directa.

### Presentación:

Envases conteniendo 1 frasco por 90 ml.

1004171

Emisión: 06/14

Revisión: 05/14

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.  
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204  
Córdoba, CP: X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico  
E.M.A.M.S. Certificado N° 51406  
Elaborado en Argentina

☎ 0810 - 444 - 32267  
🌐 [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

