# Rápida Acción Fabogesic



твирг

Ibuprofeno 400 mg

Cápsulas de gelatina blanda Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

## ¿Qué contiene FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN?:

FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN tiene 400 miligramos de Ibuprofeno por cada cápsula de gelatina blanda. Otros componentes de las cápsulas: polietilenglicol 400; agua purificada; glicerina bi-destilada; hidróxido de potasio; polivinilpirrolidona K 30; gelatina de cerdo 200 bloom; metilparabeno; propilparabeno; sorbitol polyol; colorante amarillo ocaso C.I. 15.985; colorante rojo allura C.I. 16.035.

#### Acciones:

Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación).

## ¿Para qué se usa FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN?

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, de dientes), dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

## ¿Qué personas NO pueden recibir FABOGESIC RÁPIDA ACCIÓN?

No use este medicamento si:

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- -Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 12 años.

#### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Debe ser tomada la menor dosis por el período de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si:

- Es mayor de 65 años.
- -Tiene asma o alergia.
- -Tiene presión arterial alta.
- -Tiene problemas circulatorios.
- -Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez).
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

## ¿Cómo se usa este medicamento?

Vía de administración oral. Adultos y mayores de 12 años: 1 cápsula de gelatina blanda cada 8 horas. Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 cápsulas de gelatina blanda de 400 mg (1200 mg/día). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 / 72 horas consulte a su médico. No usar en niños menores de 12 años.

## ¿Qué cuidados tener mientras toma este medicamento?

Suspenda su uso v consulte a su médico inmediatamente si:

Reemplazar x código

- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de su asma.
- Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.

## ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

eemplazar x código Interno

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

Conservar a temperatura entre 15° C y 30° C, lejos del calor y la luz solar directa.

## MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

## ¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

Presentación: Envases conteniendo 10, 20, 60 y 90 cápsulas de gelatina blanda.

1004106 Emisión: 05/14 Revisión: 08/13

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.
Complejo Industrial RN N°19, Km 204
Córdoba, CP X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico
E.M.A.M.S. Certificado N°51406
Elaborado en Argentina

**▶** 0810 · 444 · 32267

www.savant.com.ar

