

תרגיל 1 - IML - מאי ביבי

ראינו בתרגול שההטלה של וקטור v על w היא

$$p = \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} w$$

שאלה 1:

$$p = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|^2} w = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}^2} w = \frac{0 - 2 + 3 + 8}{0 + 1 + 1 + 4} w = \frac{9}{6} w$$

שאלה 2:

$$p = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|^2} w = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}^2} w = \frac{1 + 0 + 3 - 4}{1 + 0 + 1 + 1} w = \frac{0}{3} w = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

שאלה 3:

נרצה להראות שעבור שני וקטורים $v, w \in \mathbb{R}^m$ שונים מאפס מתקיים שהזווית ביניהם שווה $\pm 90^\circ$ אם ורק אם $v^T w = 0$. הוכחה:
 \Leftarrow : נתון שהזווית θ בין v ל- w היא $\pm 90^\circ$. בתרגול הוכחנו:

$$\langle v, w \rangle = \|v\| \|w\| \cos \theta$$

במקרה שלנו, $\theta = \pm 90^\circ$, כלומר $\cos \theta = 0$ וכן המכפלה הפנימית היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית, כלומר $\langle v, w \rangle = v^T w$ ולכן מתקיים:

$$v^T w = \langle v, w \rangle = \|v\| \|w\| \cos \theta = \|v\| \|w\| \cdot 0 = 0$$

$$\implies v^T w = 0$$

\Rightarrow : נתון $v^T w = 0$ אז כמו קודם:

$$\langle v, w \rangle = v^T w = 0 = \|v\| \|w\| \cos \theta$$

$$\Rightarrow 0 = \cos \theta \Rightarrow \theta = \pm 90$$

שאלה 4:

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית ו- A המטריצה המתאימה להעתקה. נוכיח כי אם A אורתוגונלית אז מתקיים $\forall x \in V \|Ax\| = \|x\|$. הוכחה:
נתון A אורתוגונלית ולכן $A^T A = A A^T = I$. יהי $x \in V$.

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x^T x}$$

$$\|Ax\| = \sqrt{Ax \cdot Ax} = \sqrt{(Ax)^T (Ax)} = \sqrt{x^T A^T (Ax)} = \sqrt{x^T (A^T A) x} = \sqrt{x^T I x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$$

כדורש.

שאלה 5:

$A = U \Sigma V^T$ פירוק SVD של A מטריצה הפיכה. כיוון ש- U, V הן אורתוגונליות, $U^T = U^{-1}$ וכן $V^T = V^{-1}$. נשים לב שעבור $B = V \Sigma^{-1} U^T$ מתקיים

$$AB = (U \Sigma V^T) (V \Sigma^{-1} U^T) = (U \Sigma) (V^T V) (\Sigma^{-1} U^T) = (U \Sigma) I (\Sigma^{-1} U^T)$$

$$= U (\Sigma \Sigma^{-1}) U^T = U I U^T = U U^T = I$$

ולכן $A^{-1} = B = V \Sigma^{-1} U^T$. כיוון ש- Σ אלכסונית קל לחשב את ההופכית שלה:

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_{11}^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \Sigma_{dd}^{-1} \end{bmatrix}$$

כיוון שאנו יודעים את SVD של A זה יעיל יותר לחשב את A^{-1} (?)

שאלה 6:

נמצא SVD של המטריצה

$$A = U \Sigma V^T = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$$

נשתמש בשתי המשוואות:

$$A^T A = (U \Sigma V^T)^T U \Sigma V^T = V \Sigma^T U^T U \Sigma V^T = V \Sigma^T \Sigma V^T$$

$$AV = U \Sigma$$

$V \Sigma^T \Sigma V^T$ זה לכסון של $A^T A$ ולכן אם נמצא את הוקטורים העצמיים של $A^T A$, נוכל למצוא את V , כי הם העמודות שלה.

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$B = A^T A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 74 \end{bmatrix}$$

נמצא את הערכים העצמיים של $A^T A$:

$$0 = \det(XI - B) = \det\left(\begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & X \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 74 \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} X-26 & -18 \\ -18 & X-74 \end{bmatrix}\right)$$

$$= (X-26)(X-74) - 18^2 = X^2 - 100X + 1600 = (X-80)(X-20)$$

$$\implies X = 80, 20$$

נמצא ו"ע עבור ע"ע 20:

$$Bx = 20x \implies (B - 20I)x = 0$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 18 \\ 18 & 54 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

נדרג:

$$\begin{bmatrix} 6 & 18 \\ 18 & 54 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 18 & 54 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + 3x_2 = 0 \xrightarrow{x_1=t} x_2 = -\frac{1}{3}t \implies t \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

לכן עבור למשל $t = -3$, הוא וקטור עצמי לע"ע 20. נרצה וקטור יחידה לכן נחלק בנורמה ונקבל את הוקטור העצמי

$$v_1 = \begin{bmatrix} \frac{-3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$$

נמצא וקטור עצמי שמתאים לערך עצמי 80:

$$Bx = 80x \implies (B - 80I)x = 0$$

$$\begin{bmatrix} -54 & 18 \\ 18 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

נדרג:

$$\begin{bmatrix} -54 & 18 \\ 18 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -54 & 18 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 - \frac{1}{3}x_2 = 0 \xrightarrow{x_1=t} x_2 = 3t \implies t \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

לכן עבור למשל $t = 3$, הוא וקטור עצמי לע"ע 80. נרצה וקטור יחידה לכן נחלק בנורמה ונקבל את הוקטור העצמי

$$v_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \text{ נקבל}$$

$$V = [v_1 \ v_2] = \begin{bmatrix} \frac{-3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} = \sqrt{10} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma^2 = \begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 80 \end{bmatrix} \implies \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{20} & 0 \\ 0 & \sqrt{80} \end{bmatrix}$$

כעת נמצא את U :

$$AV = U\Sigma$$

$$AV = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} -10 & 20 \\ 10 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{20}x_1 & \sqrt{80}x_2 \\ \sqrt{20}x_3 & \sqrt{80}x_4 \end{bmatrix} = U\Sigma$$

$$\begin{cases} \sqrt{2}\sqrt{10}x_1 = -10\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \sqrt{8}\sqrt{10}x_2 = 20\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \sqrt{2}\sqrt{10}x_3 = 10\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \sqrt{8}\sqrt{10}x_4 = 20\frac{1}{\sqrt{10}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow U = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

שאלה 7:

נמצ

שאלה 8:

נתונה $f(\sigma) = U \text{diag}(\sigma) U^T x$. נכתוב

$$f(\sigma) = \sum_{i=1}^n u_i \sigma_i u_i^T x$$

מתקיים

$$f(\sigma) = (f_1(\sigma) \quad \dots \quad f_n(\sigma))^T = \left(\left[\sum_{i=1}^n \sigma_i u_i u_i^T x \right]_1 \quad \dots \quad \left[\sum_{i=1}^n \sigma_i u_i u_i^T x \right]_n \right)^T$$

לכן הנגזרת החלקית של $\left[\sum_{i=1}^n \sigma_i u_i u_i^T x \right]_j$ לפי σ_k היא $\left[u_k u_k^T x \right]_j$ (כי עבור $i \neq k$ הנגזרת היא אפס וכאשר $i = k$ הנגזרת היא $\left[u_k u_k^T x \right]_j$).
אז עבור $i, j \in [n]$

$$\frac{\partial f_j(\sigma)}{\partial \sigma_i} = \left[u_i u_i^T x \right]_j$$

ולכן

$$J_\sigma(f) = \begin{bmatrix} \left[u_1 u_1^T x \right]_1 & \dots & \left[u_n u_n^T x \right]_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \left[u_1 u_1^T x \right]_n & \dots & \left[u_n u_n^T x \right]_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left| u_1 u_1^T x \right| & \dots & \left| u_n u_n^T x \right| \\ u_1 u_1^T x & \dots & u_n u_n^T x \\ \left| \right| & & \left| \right| \end{bmatrix} = U \text{diag}(U^T x)$$

המעבר האחרון נובע מכך שכפל במטריצה אלכסונית מכפיל את העמודה ה- i בערך ה- i באלכסון. במקרה שלנו, העמודה ה- i מוכפלת בערך $u_i^T x$.

שאלה 9:

נחשב את הגרדיאנט של הפונקציה $h(\sigma) = \frac{1}{2} \|f(\sigma) - y\|^2$. נסמן $g(x) = \|x\|^2$. ראינו בתרגול $\nabla g(x) = 2x$. נשתמש בכלל השרשרת

$$\nabla h(\sigma) = \frac{1}{2} 2(f(\sigma) - y) \cdot \nabla f(\sigma) = (f(\sigma) - y) \cdot \nabla f(\sigma)$$


$$\begin{aligned} \nabla h(\sigma) &= \frac{d}{d\sigma} \frac{1}{2} \|f(\sigma) - y\|^2 = \frac{d}{d\sigma} \frac{1}{2} \langle f(\sigma) - y | f(\sigma) - y \rangle = \frac{d}{d\sigma} (\langle f(\sigma) | f(\sigma) \rangle - \langle y | f(\sigma) \rangle - \langle f(\sigma) | y \rangle + \langle y | y \rangle) = \\ &= \frac{d}{d\sigma} (\|f(\sigma)\|^2 - 2\langle y | f(\sigma) \rangle + \langle y | y \rangle) = \frac{d}{d\sigma} \|f(\sigma)\|^2 - \frac{d}{d\sigma} 2\langle y | f(\sigma) \rangle + \frac{d}{d\sigma} \langle y | y \rangle = \\ &= \nabla (\|f(\sigma)\|^2) - \nabla (2y^T f(\sigma)) = 2f(\sigma) - \nabla (2y^T f(\sigma)) \end{aligned}$$

שאלה 10:

נמצ


שאלה 11:

גרף המציג דגימות של הוקטור המקרי (X, Y, Z) אשר מטריצת השונות המשותפת שלו היא I_3



שאלה 12:

נכפיל את דגימות הוקטור הקודם במטריצת ה-scaling ונציג:

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$


מטריצת השונות המשותפת היא כעת (ע"פ חישוב אמצעות numpy.cov)

$$\begin{bmatrix} 0.00995 & 0.00021 & -0.00096 \\ 0.00021 & 0.25009 & 0.00158 \\ -0.000967 & 0.00158 & 4.00283 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2^2 \end{bmatrix}$$

קיבלנו בערך את ערכי מטריצת ה-scaling בריבוע וזה הגיוני, נראה זו בעזרת הנוסחה הבאה:

$$\text{cov}(AX) = A \text{cov}(X) A^T$$

כאשר A מטריצה כלשהי ו- X וקטור מקרי. במקרה שלנו A זו מטריצת ה-scaling ו- X זה הוקטור המקרי (x, y, z) . בתרגיל 11 הנחנו כי

$$\text{cov}(X) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


נרצה לחשב את $\text{cov}(AX)$. A מטריצה אלכסונית ולכן נקבל

$$\text{cov}(AX) = A \text{cov}(X) A^T = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0.1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2^2 \end{bmatrix}$$

כמו שראינו שקיבלנו באמצעות numpy.cov

שאלה 13:

כעת נכפיל את הנונים במטריצה אורתוגונלית כלשהי. נקבל את גרף הדגימות הבא:




קיבלנו "סיבוב" של הערכים. המטריצה בה הכפלנו ומטריצת השונות של המשותפת של הנתונים החדשים:

```
rand orthogonal matrix
[[-0.13902653  0.8487744 -0.51015061]
 [-0.96349463  0.00308801  0.26770983]
 [ 0.2288006  0.52874615  0.81736026]]
cov of 13
[[ 1.2205587 -0.54494605 -1.55624757]
 [-0.54494605  0.2966262  0.87491506]
 [-1.55624757  0.87491506  2.74570118]]
```


שאלה 14:

נטיל את הנתונים של שאלה 13 על המישור xy . (כלומר נציג את נתוני x, y בלבד, $z = 0$, הטלה אורתוגונלית)



שאלה 15:

נטיל את כל הערכים בהם $-0.4 < z < 0.1$ על מישור ה- xy .




שאלה 16:

סעיף a:

כיוון ש- $\bar{X}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$ הוא אומדן חסר הטייה עבור התוחלת, נצפה לראות שככל ש- m עולה כך התוחלת תתקרב לתוחלת של

X אשר מתפלג $\text{Ber}(0.25)$, ולכן נצפה שהערכים יתקרבו ל-0.25. ואכן כך:

The mean as function of m for $X \sim \text{Ber}(0.25)$



סעיף b:

בסעיף זה נחשב את הדיוק של אומד חסר ההטייה עבור התוחלת. נבדוק עבור מספר ספים: $\varepsilon = 0.5, 0.25, 0.1, 0.01, 0.001$. בחישוב בעזרת א"ש צ'בישב השתמשתי בכך ש-

$$\text{Var}(X) = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

ולכן לפי מסקנה 1.3.9 בספר א"ש צ'בישב נתן את החסם



$$\mathbb{P}(|\bar{X}_m - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{m\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4m\varepsilon^2}$$

ועבור א"ש הופדינג, לפי מסקנה 1.3.12 ועם החסמים $a = 0, b = 1$ עבור X_i (כי הערכים שלהם הם 0 או 1) נקבל את החסם:



$$\mathbb{P}(|\bar{X}_m - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq 2 \exp\left(\frac{-2m\varepsilon^2}{(b-a)^2}\right) = 2 \exp(-2m\varepsilon^2)$$

נציג את הגרפים:



epsilon: 0.001





epsilon: 0.01




epsilon: 0.1



epsilon: 0.25



epsilon: 0.5



מסקנות:



1. עבור $\varepsilon = 0.001, 0.01$ החסמים לא עוזרים לנו כי אנו יודעים שהסתברות תמיד קטנה או שווה ל-1.
2. עבור $\varepsilon = 0.1, 0.25, 0.5$, נשים לב שככל ש- ε גדול יותר, כך ההסתברות שהאומד סוטה ביותר מ- ε שואפת לאפס מהר יותר וכן צריך פחות דגימות כדי שזה יקרה.
3. החסם העליון מא"ש הופדינג שואף מהר יותר לאפס מאשר החסם של א"ש צ'בישב - הוא נותן חסם הדוק יותר.

סעיף c:



גילוי נאות: הרצתי רק על 10000 דגימות (שגם לקחו זמן) כי להריץ על 100000 דגימות לקח המון זמן (חישוב ה-mean לקח זמן).

בהנתן התוצאות של סעיף b, מה שמצופה לראות בגרפים זה שעבור $\varepsilon = 0.1, 0.25, 0.5$, ככל שמספר הדגימות (m) יעלה כך האחוזים יצנחו, כיוון שראינו שההסתברות של האומד לסטות מ- ε שואפת לאפס ככל שמספר הדגימות עולה, ולכן גם אחוז הדגימות עבורן האומד חורג מ- ε צפוי להתנהג כך. לגבי $\varepsilon = 0.001, 0.01$ כי לא הסקנו לגביהם מידע בסעיף הקודם.



epsilon: 0.001





epsilon: 0.01




epsilon: 0.1



epsilon: 0.25



epsilon: 0.5



מסקנות:

1. צדקנו לגבי $\epsilon = 0.1, 0.25, 0.5$
2. עבור $\epsilon = 0.001, 0.01$, בסעיף הקודם לא הצלחנו לקבל הערכה לאומד עבור ערכים אלו. כאן, ניתן לראות שעבור $\epsilon = 0.001$ האחוזים נשארים גבוהים - האומד חורג ברוב הדגימות. עבור $\epsilon = 0.01$, רואים דווקא שהאחוזים יורדים כאשר מספר הדגימות המחושב עולה. הסקנו כאן מידע שלא הצלחנו להסיק בסעיף הקודם.