Feuille d'exercices n. 6 : Formule de Cauchy et intégration.

Exercice 1 Parmi les ouverts suivants, déterminer lesquels sont étoilés :

- (a) $\mathbb{C} \setminus 0$;
- (b) $\{z = x + iy : x > 0 \text{ et } xy > 1\};$
- (c) $\{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\} \ (R > r > 0);$
- (d) $\mathbb{C} \setminus D$ où D est une demi-droite;
- (b) $\{z = x + iy : (x/a)^2 + (y/b)^2 < 1\} \ (a, b > 0).$

Exercice 2 Calculer $\int_{\gamma} \bar{z}dz$, où γ est le chemin allant du point 1+i au point 2+4i le long de la parabole d'équation $y=x^2$.

Exercice 3 Donner une paramétrisation de l'ellipse E d'équation $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$ (a, b > 0). Déterminer une homotopie entre l'ellipse E et le cercle centré à l'origine de rayon a. En déduire la valeur de $ind_E(0)$.

Exercice 4 Soit C le cercle unité, D le disque unité fermé et f une fonction holomorphe sur un ouvert U contenant D. Calculer, en fonction des valeurs de f et f', l'intégrale :

$$\int_C (2+z+\frac{1}{z})\frac{f(z)}{z}dz.$$

En déduire la valeur de

$$\int_0^{2\pi} f(e^{it})\cos^2(t/2)dt.$$

Exercice 5 Soit E l'ellipse d'équation $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$ (a, b > 0). En calculant de deux manière différentes $\int_E \frac{dz}{z}$ déterminer la valeur des intégrales

- (a) $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t}$;
- (b) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos t \sin t dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t}$

Exercice 6 Soit Γ_R le contour défini par le segment [-R,R] et le demi-cercle situé dans le demiplan supérieur de diamètre le segment [-R,R], avec R>1.

- (a) Calculer $\int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz$;
- (b) En déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$.

Exercice 7 Soit 0 < a < b sur l'axe réel positif et soit C le cercle de rayon r > 0 centré à l'origine. Déterminer la valeur de

$$\int_C \frac{1}{(z-a)(z-b)} dz$$

en fonction de a, b et r.