

Parcial 2
Daniel Mauricio Mejía Hoyos

$$x(t) = |A \sin(2\pi F_0 t)|^2 \quad t \in \left[-\frac{1}{2F_0}, \frac{1}{2F_0}\right] \quad A, F_0 \in \mathbb{R}^+$$

$$T = \frac{1}{2F_0} - \left(-\frac{1}{2F_0}\right) = \frac{2}{2F_0} = \frac{1}{F_0} \Rightarrow T = T_0$$

$$t \in \left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$$

$$x(t) = A^2 \sin^2(2\pi F_0 t) = A^2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\pi 2F_0 t) \right]$$

$$x(t) = \frac{A^2}{2} - \frac{A^2}{2} \cos[4\pi F_0 t]$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$x(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{jn\omega_0 t} \quad c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

$$\frac{A^2}{2} - \frac{A^2}{2} \cos(2\omega_0 t) = a_0 + a_2 \cos(2\omega_0 t)$$

$$\omega_0 = 2\pi F_0$$

$$\omega_n = n\omega_0$$

$$\omega_n = 2\omega_0$$

$$n\omega_0 = 2\omega_0$$

$$n=2$$

$$a_0 = c_0 = \frac{A^2}{2}$$


$$a_2 = -\frac{A^2}{2}$$

$$c_2 = c_{-2} = -\frac{A^2}{4}$$

$$c_n = 0 \quad \forall n \neq \{0, -2, 2\}$$

$$a_n = 0 \quad \forall n \neq \{0, 2\}$$

$$b_n = 0$$



Señal par $x(t) = -x(-t) = x(t)$
 $b_n = 0$

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$= \frac{4}{T_0} \int_0^{T_0/2} A^2 \sin^2(2\pi F_0 t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$= \frac{4A^2}{T_0} \left[\frac{1}{2} \int_0^{T_0/2} \cos(n\omega_0 t) dt - \frac{1}{2} \int_0^{T_0/2} \cos(2\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) dt \right]$$

$$\cos(2\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) = \frac{1}{2} [\cos(2\omega_0 t + n\omega_0 t) + \cos(2\omega_0 t - n\omega_0 t)]$$

$$a_n = \frac{2A^2}{T_0} \sin(n\omega_0 t) n\omega_0 - \frac{2A^2}{2T_0} \sin((2+n)\omega_0 t) (2+n)\omega_0$$

$$\left[-\frac{2A^2}{2T_0} \sin((2-n)\omega_0 t) (2-n)\omega_0 \right]_{0}^{T_0/2}$$

$$a_n = \frac{2A^2}{T_0} \sin\left(n \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) n \frac{2\pi}{T_0} - \frac{2A^2}{2T_0} \sin\left((2+n) \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) (2+n) \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\sin(n\pi) = \sin((2+n)\pi) = \sin((2-n)\pi) = 0$$

$$a_n = 0 \quad \text{for } n \neq 0, 2$$

$$n=2 \quad a_2 = \frac{4A^2}{T_0} \left[-\frac{1}{2} \int_0^{T_0/2} \cos^2(2\omega_0 t) dt \right] = \frac{4A^2}{T_0} \left[-\frac{1}{2} \frac{T_0}{4} \right] = -\frac{A^2}{2}$$

$$n=0 \quad a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \sin^2(\omega_0 t) dt = \frac{A^2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sin^2(\omega_0 t) dt$$

$$a_0 = \frac{A^2}{T_0} \frac{T_0}{2} = \frac{A^2}{2}$$

$$P_r = 1 - \frac{\sum_{n=-N}^N |c_n|^2 P_n}{P_x}$$

$$P_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |y_n(t)|^2 dt = 1$$

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} (A^2 \sin^2(\omega_0 t))^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) \right)^2 dt$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) \right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) + \frac{1}{4} \cos^2(2\omega_0 t)$$

$$P_x = \frac{1}{T_0} \left[\frac{1}{4} T_0 - \frac{1}{2} \sin(2\omega_0 t) (2\omega_0) + \frac{1}{4} \frac{T_0}{2} \right]_{-T_0/2}^{T_0/2}$$

$$P_x = \frac{1}{T_0} \left[\frac{1}{4} T_0 + \frac{1}{8} T_0 - \frac{2\pi}{T_0} \sin\left(\frac{4\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) + \frac{2\pi}{T_0} \sin\left(\frac{4\pi}{T_0} \left(-\frac{T_0}{2}\right)\right) \right]$$

$$P_x = \frac{1}{T_0} \left[\frac{1}{4} T_0 + \frac{1}{8} T_0 \right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$P_r = 1 - \frac{8}{3} \sum_{n=-N}^N |c_n|^2$$

$$y(t) = \left(1 + \frac{m(t)}{A_c}\right) c(t)$$

$$Y(\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\left\{\left(1 + \frac{m(t)}{A_c}\right) c(t)\right\} = \mathcal{F}\{c(t)\} + \frac{1}{A_c} \mathcal{F}\{m(t)c(t)\}$$

$$\mathcal{F}\{c(t)\} = C(\omega) = \mathcal{F}\{A_c \sin(2\pi F_c t)\} = A_c \mathcal{F}\left\{\frac{e^{j2\pi F_c t} - e^{-j2\pi F_c t}}{2j}\right\}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{X(\omega \pm \omega_0)\} = x(t) e^{\mp j\omega_0 t}$$

$$\mathcal{F}\{x(t \pm t_0)\} = X(\omega) e^{\pm j\omega t_0}$$

$$\rightarrow \mathcal{F}\{x(t) e^{\mp j\omega_0 t}\} = X(\omega \pm \omega_0)$$

$$\mathcal{F}\{1 \cdot e^{\pm j\omega_0 t}\}$$

$$x(t) = 1$$

$$X(\omega) = 2\pi \delta(\omega)$$

$$\delta(t)$$

$$D(t) = 1$$

$$C(\omega) = \frac{A_c}{2j} [2\pi \delta(\omega - 2\pi F_c) - 2\pi \delta(\omega + 2\pi F_c)]$$


$$m(t)c(t) = m(t) A_c \sin(2\pi F_c t)$$

$$\mathcal{F}\{m(t)c(t)\} = \frac{A_c}{2j} [\mathcal{F}\{m(t) e^{j2\pi F_c t}\} - \mathcal{F}\{m(t) e^{-j2\pi F_c t}\}]$$

$$= \frac{A_c}{2j} [M(\omega - 2\pi F_c) - M(\omega + 2\pi F_c)]$$

$$Y(\omega) = \frac{A_c \pi}{j} [\delta(\omega - 2\pi F_c) - \delta(\omega + 2\pi F_c)] + \frac{1}{2j} [M(\omega - 2\pi F_c) - M(\omega + 2\pi F_c)]$$

1. Carga resistiva




$$i(t) = i_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

$$V_i(t) = V_o(t)$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = 1$$

Carga RC Serie



$$V_i(t) = V_R(t) + V_C(t); \quad V_C(t) = V_o(t)$$

$$V_R(t) = R i_R(t) \quad i_R(t) = i_C(t)$$

$$V_i(s) = V_R(s) + V_C(s) \quad i(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$V_i(s) = R(s) V_C(s) + V_C(s)$$

$$\frac{V_C(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{R(s) + 1}$$