Лабораторная работа №6

Выполнил студент Абушек Дмитрий Олегович

1032203018

Цель лабораторной работы

• Изучить и построить модель эпидемии

Теоретическое введение. Построение математической модели (1)

Рассмотрим простейшую модель эпидемии. Предположим, что некая популяция, состоящая из \$N\$ особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через S(t). Вторая группа — это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их I(t). А третья группа, обозначающаяся через R(t) — это здоровые особи с иммунитетом к болезни.

До того, как число заболевших не превышает критического значения I^{s} , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда I^{s} , тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Теоретическое введение. Построение математической модели (2)

Таким образом, скорость изменения числа \$S(t)\$ меняется по следующему закону:

Теоретическое введение. Построение математической модели (3)

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится, то есть:

Теоретическое введение. Построение математической модели (4)

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни):

 $\frac{dR}{dt} = \beta I$

Постоянные пропорциональности α heta - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени t=0 нет особей с иммунитетом к болезни R(0)=0, а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей I(0) и I(0) соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая: $I(0) \le I^{s}$ и $I(0) > I^{s}$

Задание лабораторной работы. Вариант 1

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове (N=20000) в момент начала эпидемии (t=0) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) I(0)=99, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни R(0)=5. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени I(0)=N-I(0)-R(0). Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

- 1. \$I(0)\leq I^*\$
- 2. \$I(0)>I^*\$

Задачи:

Построить графики изменения числа особей в каждой из трех групп \$S\$, \$I\$, \$R\$. Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в случаях:

- 1. \$I(0)\leq I^*\$
- 2. \$I(0)>I^*\$

Ход выполнения лабораторной работы

Математическая модель

По представленному выше теоретическому материалу были составлены модели на обоих языках программирования.

Решение с помощью программ

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для случая I^* leq I^*

(графики численности особей трех групп \$S\$, \$I\$, \$R\$, когда больные изолированы)

{#fig:001}

Результаты работы кода на Julia и Open Modelica для случая I^* I^*

(графики численности особей трех групп \$S\$, \$I\$, \$R\$, когда больные могут заражать особей группы \$S\$)

Анализ полученных результатов. Сравнение языков.

- В итоге проделанной работы мы построили графики зависимости численности особей трех групп S, I, R для случаев, когда больные изолированы и когда они могут заражать особей группы S.
- Построение модели эпидемии на языке OpenModelica занимает значительно меньше строк, чем аналогичное построение на Julia. Кроме того, построения на языке OpenModelica проводятся относительно значения времени t по умолчанию, что упрощает нашу работу.

Вывод

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эпидемии и построена модель на языках Julia и Open Modelica.

Список литературы. Библиография

- [1] Документация по Julia: https://docs.julialang.org/en/v1/
- [2] Документация по OpenModelica: https://openmodelica.org/
- [3] Решение дифференциальных уравнений: https://www.wolframalpha.com/
- [4] Конструирование эпидемиологических моделей: https://habr.com/ru/post/551682/