В. Л. Рвачев

# Теория $R$-функций и некоторые ее приложения

Решения упражнений

# Оглавление

**Глава 1. Элементы дискретной математики** **3**
§ 1. Множества и логические операции над ними . . . . . 3
§ 2. Диаграммы Эйлера . . . . . 11
§ 3. Принцип двойственности . . . . . 18
§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций . . . . . 35

**A Замечания** **41**

# Глава 1. Элементы дискретной математики

## § 1. Множества и логические операции над ними

### Условия

1. Доказать тождества

$$
\begin{gathered}
A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B); \\
A \cup B \equiv (A \triangle B) \triangle (A \cap B); \qquad A \setminus B \equiv A \triangle (A \cap B); \\
(A \cap B) \cup B \equiv B; \qquad (A \cup B) \cap B \equiv B; \\
(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv A; \qquad (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \equiv A; \\
(\overline{A} \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}).
\end{gathered}
\tag{1.4}
$$

(Для доказательства использовать формулы (1.1), (1.2) и свойства 1°–19°.)

2. Показать, что симметрическая разность — это коммутативная и ассоциативная операции.

Решение. В соответствии с формулой (1.2) и свойствами 1°–19°

получаем

$$A \triangle (B \triangle C) \equiv [A \cap (\overline{B \triangle C})] \cup [\overline{A} \cap (B \triangle C)] \equiv$$
$$\equiv \{A \cap \overline{[(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]}\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv$$
$$\equiv \{A \cap [\overline{(B \cap \overline{C})} \cap \overline{(\overline{B} \cap C)}]\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv$$
$$\equiv \{A \cap [(\overline{B} \cup C) \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup \{(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)\} \equiv$$
$$\equiv \{[A \cap (\overline{B} \cup C)] \cap [A \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C)] \cap [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{C})]\} \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup$$
$$\cup [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C})] \cup [(A \cap C) \cap (A \cap B)] \cup [(A \cap C) \cap$$
$$\cap (A \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv \{[(A \cap A) \cap (B \cap \overline{B})] \cup [(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})] \cup [(A \cap A) \cap$$
$$\cap (C \cap B)] \cup [(A \cap A) \cap (C \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv (A \cap \varnothing) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \varnothing) \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \varnothing \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup$$
$$\cup (A \cap B \cap C) \cup \varnothing \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C).$$

Поскольку последнее выражение инвариантно относительно циклической перестановки букв (т. е. при замене $A$, $B$, $C$ на $C$, $A$, $B$ соответственно), то оно равно также $C \triangle (A \triangle B)$. Таким образом, ассоциативность операции $A \triangle B$ доказана. Ее коммутативность очевидна.[1]

3. Пусть $I = \mathbb{R}$. Показать, что равенство $(A \cap B) \cup C = C \cup (B \cap C)$ справедливо, если $A = [a, b]$, $B = [c, d]$, $C = [e, f]$ и $e \leq \max(a, c)$; $f \geq \min(b, d)$, но оно не является тождеством.

4. Показать, что правила де Моргана 10° и 11° верны для $n$ ($n \geq 2$) компонент, т. е.

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}; \qquad \overline{\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcap_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}. \tag{1.5}$$

[1] *Исправлено:* в оригинале в восьмой строке выкладки стоит скобка «([$A \cap A$)» вместо «[($A \cap A$)».

## Решения

### Решение упражнения 1 (§ 1)

Нужно вывести восемь тождеств (1.4), пользуясь только определениями разности (1.1), симметрической разности (1.2) и свойствами 1°–19°. Тождество — это равенство, верное при *любых* множествах $A$, $B$, поэтому проверка на одном примере его не доказывает. Но пример полезен, чтобы увидеть, что именно утверждается. Возьмем $I = \{1,2,3,4\}$, $A = \{1,2\}$, $B = \{2,3\}$. Тогда $\overline{A} = \{3,4\}$, $\overline{B} = \{1,4\}$, $A \cup B = \{1,2,3\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A \triangle B = \{1,3\}$, $A \setminus B = \{1\}$, и для каждого из тождеств (1.4) обе части дают одно и то же множество:

| | левая часть | правая часть |
|---|---|---|
| 1-е | $A \triangle B = \{1,3\}$ | $\{1,2,3\} \setminus \{2\} = \{1,3\}$ |
| 2-е | $A \cup B = \{1,2,3\}$ | $\{1,3\} \triangle \{2\} = \{1,2,3\}$ |
| 3-е | $A \setminus B = \{1\}$ | $\{1,2\} \triangle \{2\} = \{1\}$ |
| 4-е | $\{2\} \cup \{2,3\} = \{2,3\}$ | $B = \{2,3\}$ |
| 5-е | $\{1,2,3\} \cap \{2,3\} = \{2,3\}$ | $B = \{2,3\}$ |
| 6-е | $\{2\} \cup \{1\} = \{1,2\}$ | $A = \{1,2\}$ |
| 7-е | $\{1,2,3\} \cap \{1,2,4\} = \{1,2\}$ | $A = \{1,2\}$ |
| 8-е | $\{3\} \cup \{1\} = \{1,3\}$ | $\{1,2,3\} \cap \{1,3,4\} = \{1,3\}$ |

Пример выбран не случайно: каждая из четырех «областей» $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$ здесь состоит ровно из одной точки (2, 1, 3, 4). В решении упражнения 1 §2 объяснено, почему совпадение обеих частей на таком примере уже гарантирует тождество. Здесь же требуется вывод из свойств 1°–19°, и мы его проведем, начиная с самых простых тождеств — четвертого—седьмого: они понадобятся для остальных.

*Поглощение* (4-е и 5-е тождества). Смысл: присоединить к $B$ его часть $A \cap B$ — значит ничего не присоединить; пересечь $B$ с множеством $A \cup B$, которое содержит $B$, — значит получить $B$. Чтобы вывести первое из свойств, запишем $B$ как $I \cap B$ и вынесем общий множитель:

$$(A \cap B) \cup B \overset{14°}{\equiv} (A \cap B) \cup (I \cap B) \overset{1°}{\equiv} (B \cap A) \cup (B \cap I) \overset{5°}{\equiv}$$
$$\equiv B \cap (A \cup I) \overset{2°,\,15°}{\equiv} B \cap I \overset{1°,\,14°}{\equiv} B.$$

Второе выводится теми же шагами, только роль $I$ играет $\varnothing$:

$$(A\cup B)\cap B \overset{17^\circ}{\equiv} (A\cup B)\cap(\varnothing\cup B) \overset{2^\circ}{\equiv} (B\cup A)\cap(B\cup\varnothing) \overset{6^\circ}{\equiv}$$
$$\equiv B\cup(A\cap\varnothing) \overset{1^\circ,\,16^\circ}{\equiv} B\cup\varnothing \overset{2^\circ,\,17^\circ}{\equiv} B.$$

*Склеивание* (6-е и 7-е тождества). Смысл: каждая точка $A$ либо лежит в $B$, либо не лежит. Вывод:

$$(A\cap B)\cup(A\cap\overline{B}) \overset{5^\circ}{\equiv} A\cap(B\cup\overline{B}) \overset{13^\circ}{\equiv} A\cap I \overset{1^\circ,\,14^\circ}{\equiv} A,$$
$$(A\cup B)\cap(A\cup\overline{B}) \overset{6^\circ}{\equiv} A\cup(B\cap\overline{B}) \overset{12^\circ}{\equiv} A\cup\varnothing \overset{2^\circ,\,17^\circ}{\equiv} A.$$

*Восьмое тождество.* Обе его части описывают точки, лежащие ровно в одном из множеств $A$, $B$: левая — прямо по определению, правая — как точки, лежащие хотя бы в одном из них $(A\cup B)$ и не лежащие хотя бы в одном $(\overline{A}\cup\overline{B})$. Чтобы получить левую часть из правой, раскроем скобки. По $5^\circ$ (с общим множителем $A\cup B$)

$$(A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}) \equiv [(A\cup B)\cap\overline{A}]\cup[(A\cup B)\cap\overline{B}],$$

а каждую из квадратных скобок снова раскроем по $1^\circ$ и $5^\circ$: $(A\cup B)\cap\overline{A}\equiv(\overline{A}\cap A)\cup(\overline{A}\cap B)$ и $(A\cup B)\cap\overline{B}\equiv(\overline{B}\cap A)\cup(\overline{B}\cap B)$. По $1^\circ$ и $12^\circ$ члены $\overline{A}\cap A$ и $\overline{B}\cap B$ пусты, и по $17^\circ$, $2^\circ$, $4^\circ$ остается $(\overline{A}\cap B)\cup(\overline{B}\cap A)$, т. е. (с перестановкой множителей по $1^\circ$) левая часть восьмого тождества. Она отличается от выражения (1.2) для $A\triangle B$ только порядком членов и множителей ($2^\circ$, $1^\circ$), так что попутно получено полезное представление

$$A\triangle B\equiv(A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}). \qquad (*)$$

*Первое тождество.* Смысл: точки, лежащие хотя бы в одном из множеств, но не в обоих, — это точки, лежащие ровно в одном. Вывод:

$$(A\cup B)\setminus(A\cap B) \overset{(1.1)}{\equiv} (A\cup B)\cap\overline{A\cap B} \overset{10^\circ}{\equiv} (A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}) \overset{(*)}{\equiv} A\triangle B.$$

*Третье тождество.* Смысл: симметрическая разность $A$ и $A\cap B$ состоит из точек $A$, не лежащих в $A\cap B$ (т. е. не лежащих в $B$), и точек $A\cap B$, не лежащих в $A$, — а таких нет. По (1.2)

$$A\triangle(A\cap B)\equiv\bigl[A\cap\overline{A\cap B}\bigr]\cup\bigl[(A\cap B)\cap\overline{A}\bigr].$$

Первый член: $A \cap \overline{A \cap B} \overset{10^\circ}{\equiv} A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \overset{5^\circ}{\equiv} (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \overset{12^\circ, 17^\circ}{\equiv} A \cap \overline{B}$. Второй член: по 3° и 1° переставим множители, $(A \cap B) \cap \overline{A} \equiv (A \cap \overline{A}) \cap B$, и по 12°, 16° он пуст. Остается $(A \cap \overline{B}) \cup \varnothing \equiv A \cap \overline{B} \overset{(1.1)}{\equiv} A \setminus B$ (2°, 17°).

*Второе тождество.* Смысл: $A \cup B$ складывается из двух непересекающихся частей — точек, лежащих ровно в одном из множеств ($A \triangle B$), и точек, лежащих в обоих ($A \cap B$), — а симметрическая разность непересекающихся множеств есть их объединение. Проведем это рассуждение в виде вывода; обозначим $D = A \triangle B$, $P = A \cap B$.

(а) $D \cap P \equiv \varnothing$. По (1.2) и 5° (с 1°) $D \cap P \equiv [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup [(\overline{A} \cap B) \cap (A \cap B)]$. Переставив множители (1°, 3°), получаем в первой скобке $(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap B)$, во второй $(\overline{A} \cap A) \cap (B \cap B)$; по 1°, 12°, 16° обе пусты, и $D \cap P \equiv \varnothing$ (17°).

(б) Если $X \cap Y \equiv \varnothing$, то $X \triangle Y \equiv X \cup Y$. Действительно, по склеиванию (6-е тождество для множеств $X$, $Y$) $X \equiv (X \cap Y) \cup (X \cap \overline{Y}) \equiv \varnothing \cup (X \cap \overline{Y}) \equiv X \cap \overline{Y}$, и точно так же $Y \equiv (Y \cap X) \cup (Y \cap \overline{X}) \equiv Y \cap \overline{X}$ (здесь $Y \cap X \equiv X \cap Y \equiv \varnothing$ по 1°). Поэтому $X \triangle Y \equiv (X \cap \overline{Y}) \cup (Y \cap \overline{X}) \equiv X \cup Y$.

(в) Из (а) и (б): $(A \triangle B) \triangle (A \cap B) \equiv D \cup P \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B)$. Повторим член $A \cap B$ дважды (8°) и сгруппируем члены (2°, 4°):

$$D \cup P \equiv [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] \cup [(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)].$$

Первая скобка по склеиванию равна $A$, вторая — тоже по склеиванию, с переставленными буквами: $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B) \overset{1^\circ}{\equiv} (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) \equiv B$. Получаем $A \cup B$.

**Ответ.** Все восемь тождеств (1.4) выводятся из (1.1), (1.2) и свойств 1°–19°, как показано выше. Попутно получено представление $A \triangle B \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$.

### Решение упражнения 2 (§ 1): дополнение к решению в книге

В книге выражение $A \triangle (B \triangle C)$ приведено к виду

$$E(A, B, C) = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \\ \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C),$$

затем сказано, что $E$ не меняется при циклической перестановке букв, и отсюда выведена ассоциативность. Разберем этот послед-

ний шаг подробнее — в нем есть тонкость.
Сначала проверим саму инвариантность. При замене $A \to C$, $B \to A$, $C \to B$ четыре члена переходят в

$$C \cap \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad C \cap A \cap B, \qquad \overline{C} \cap A \cap \overline{B}, \qquad \overline{C} \cap \overline{A} \cap B,$$

т. е. (после перестановки множителей по 1°, 3°) в четвертый, второй, первый и третий члены $E$; объединение от порядка членов не зависит (2°, 4°). Значит, $E(C, A, B) \equiv E(A, B, C)$.
Что из этого следует? Так как $E(A, B, C) \equiv A \triangle (B \triangle C)$ при любых множествах, то, подставив $C, A, B$ вместо $A, B, C$, получаем $E(C, A, B) \equiv C \triangle (A \triangle B)$. Итак, $A \triangle (B \triangle C) \equiv C \triangle (A \triangle B)$. Чтобы прийти к $(A \triangle B) \triangle C$, нужно еще поменять местами $C$ и $A \triangle B$, т. е. воспользоваться *коммутативностью*. Поэтому ее надо установить первой. Она прямо следует из (1.2): $A \triangle B \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$, а $B \triangle A \equiv (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B})$ — то же объединение, записанное в другом порядке (2°).
Смысл результата. Четыре члена $E$ — это ровно те области диаграммы Эйлера трех множеств, точки которых лежат в *нечетном* числе множеств: в одном ($A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ и еще два) или во всех трех ($A \cap B \cap C$). Это наблюдение дает второе, короткое доказательство обоих свойств. Сопоставим точке $x$ числа $a, b, c \in \{0, 1\}$: $a = 1$, если $x \in A$, и $a = 0$ иначе; так же $b$ для $B$ и $c$ для $C$. По (1.2) точка лежит в $X \triangle Y$ тогда и только тогда, когда она лежит ровно в одном из множеств $X$, $Y$. На языке чисел это значит: признак принадлежности к $X \triangle Y$ равен сумме признаков принадлежности к $X$ и к $Y$ по модулю 2 ($0 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$). Поэтому

$$x \in A \triangle (B \triangle C) \iff a \oplus (b \oplus c) = 1,$$
$$x \in (A \triangle B) \triangle C \iff (a \oplus b) \oplus c = 1,$$

и обе суммы равны остатку от деления $a + b + c$ на 2. Значит, оба множества состоят из одних и тех же точек — лежащих в нечетном числе множеств $A$, $B$, $C$ — при любых $A$, $B$, $C$. Коммутативность точно так же следует из равенства $a \oplus b = b \oplus a$.

**Ответ.** Симметрическая разность коммутативна (это прямо видно из (1.2) и 2°) и ассоциативна; в рассуждении книги коммутативность используется на последнем шаге, при переходе от $C \triangle (A \triangle B)$ к $(A \triangle B) \triangle C$. Множество $A \triangle (B \triangle C) \equiv (A \triangle B) \triangle C$ состоит из точек, лежащих в нечетном числе множеств $A$, $B$, $C$.

**Решение упражнения 3 (§ 1)**

Сначала упростим правую часть. По поглощению (4-е тождество (1.4), выведенное в решении упражнения 1: $(X\cap Y)\cup Y \equiv Y$) и по 2° имеем $C\cup(B\cap C) \equiv (B\cap C)\cup C \equiv C$. Значит, проверяемое равенство $(A\cap B)\cup C = C\cup(B\cap C)$ равносильно равенству $(A\cap B)\cup C = C$, т. е. включению

$$A\cap B \subset C$$

(если $A\cap B\subset C$, то присоединение $A\cap B$ к $C$ ничего не добавляет; обратно, $A\cap B \subset (A\cap B)\cup C = C$). Итак, вопрос в том, когда пересечение двух отрезков лежит в третьем. Будем считать, что $a\le b$, $c\le d$, $e\le f$.

Посмотрим на примеры.

(1) $A=[0,2]$, $B=[1,3]$, $C=[\frac12,\frac52]$. Здесь $e=\frac12\le\max(a,c)=1$ и $f=\frac52\ge\min(b,d)=2$; пересечение $A\cap B=[1,2]$ лежит в $C$, и обе части равенства равны $[\frac12,\frac52]$.

(2) $A=B=[0,1]$, $C=[2,3]$. Условие нарушено: $e=2>\max(a,c)=0$. Левая часть равна $[0,1]\cup[2,3]$, правая — $[2,3]$; равенство неверно.

Теперь общий случай. Точка $x$ лежит в $A\cap B$, если $a\le x\le b$ и $c\le x\le d$, т. е. если $\max(a,c)\le x\le\min(b,d)$. Поэтому $A\cap B=[\max(a,c),\min(b,d)]$ при $\max(a,c)\le\min(b,d)$, а иначе $A\cap B=\varnothing$. Пусть выполнены условия задачи: $e\le\max(a,c)$, $f\ge\min(b,d)$. Тогда для любой точки $x\in A\cap B$

$$e\le\max(a,c)\le x\le\min(b,d)\le f,$$

т. е. $x\in C$. Значит, $A\cap B\subset C$, и равенство выполнено (если $A\cap B=\varnothing$, оно верно тем более).

Тождеством равенство не является: пример (2) показывает, что при других отрезках оно нарушается.

Заметим еще, что при $A\cap B\ne\varnothing$ условия задачи не только достаточны, но и необходимы: концы $\max(a,c)$ и $\min(b,d)$ отрезка $A\cap B$ сами принадлежат $A\cap B$, и если $A\cap B\subset C$, то $e\le\max(a,c)$ и $\min(b,d)\le f$.

**Ответ.** При $e\le\max(a,c)$, $f\ge\min(b,d)$ пересечение $A\cap B$ лежит в $C$, поэтому $(A\cap B)\cup C = C = C\cup(B\cap C)$. Тождеством это равенство не является: например, при $A=B=[0,1]$, $C=[2,3]$ левая часть равна $[0,1]\cup[2,3]$, а правая — $[2,3]$.

**Решение упражнения 4 (§ 1)**

Смысл первого тождества: точка не лежит в пересечении $A_1 \cap \dots \cap A_n$ тогда и только тогда, когда она не лежит хотя бы в одном из $A_i$, т. е. лежит хотя бы в одном из $\overline{A_i}$. Выведем его из $10^\circ$ — сначала для трех множеств, чтобы увидеть, как устроен шаг. По соглашению (1.3) запись $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ означает $(A_1 \cap A_2) \cap A_3$ (скобки можно опускать в силу $3^\circ$). Применим $10^\circ$ к множествам $A_1 \cap A_2$ и $A_3$, а затем еще раз — к $A_1$ и $A_2$:

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap A_3} \equiv \overline{(A_1 \cap A_2) \cap A_3} \overset{10^\circ}{\equiv} \overline{A_1 \cap A_2} \cup \overline{A_3} \overset{10^\circ}{\equiv}$$
$$\equiv (\overline{A_1} \cup \overline{A_2}) \cup \overline{A_3} \overset{4^\circ}{\equiv} \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}.$$

Тот же шаг — отделить последнее множество и применить $10^\circ$ — годится при любом числе множеств. Оформим это как индукцию по числу множеств $n \geq 2$. Обозначим через $P(n)$ утверждение

> *для любых множеств* $A_1, \dots, A_n$ *выполнено* $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$.

*База*, $n = 2$: это свойство $10^\circ$.
*Шаг.* Пусть $P(n)$ верно; докажем $P(n+1)$. Возьмем множества $A_1, \dots, A_{n+1}$ и обозначим $X = \bigcap_{i=1}^n A_i$; тогда $\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i \equiv X \cap A_{n+1}$ (это и есть смысл записи (1.3)). По $10^\circ$, примененному к $X$ и $A_{n+1}$, и по предположению $P(n)$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i} \equiv \overline{X \cap A_{n+1}} \overset{10^\circ}{\equiv} \overline{X} \cup \overline{A_{n+1}} \overset{P(n)}{\equiv}$$
$$\equiv \Big(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}\Big) \cup \overline{A_{n+1}} \overset{4^\circ}{\equiv} \bigcup_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}.$$

Тем самым $P(n+1)$ доказано, и по принципу математической индукции $P(n)$ верно при всех $n \geq 2$. (Здесь достаточно обычной индукции: шаг использует только $P(n)$.)
Второе тождество не нужно доказывать заново — оно следует из первого. Применим первое тождество к множествам $\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}$:

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}} \equiv \bigcup_{i=1}^{n} \overline{\overline{A_i}} \overset{9^\circ}{\equiv} \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Возьмем дополнения обеих частей (дополнения равных множеств равны): слева по 9° получится $\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$, справа $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$. Это и есть второе тождество (1.5).

**Ответ.** Оба правила де Моргана (1.5) верны для любого числа $n \geq 2$ множеств: первое доказано индукцией по $n$ с базой 10°, второе получено из первого заменой $A_i$ на $\overline{A_i}$ и переходом к дополнениям.

# § 2. Диаграммы Эйлера

## Условия

1. Используя диаграммы Эйлера, доказать тождества[2]

$$(A \cup C) \cap B \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B \cap C);$$
$$[A \cap (B \cup C)] \cup (\overline{A} \cap C) \equiv C \cup (A \cap B);$$
$$(A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \setminus A) \equiv C; \qquad A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B);$$
$$[A \cap (B \triangle C)] \cup (B \triangle C) \equiv B \triangle C;$$
$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle C.$$

2. Выпуклые области $A, B, C \subset \mathbb{R}^2$ разбивают плоскость на восемь частей, различающихся состояниями принадлежности их точек множествам $A$, $B$ и $C$. Может ли добавление выпуклой области $D$ привести к разбиению $\mathbb{R}^2$ на 16 подобластей указанного типа? Какое максимальное число таких подобластей могут образовать $n$ выпуклых областей в $\mathbb{R}^2$?

3. Существуют ли (для всякого $n$) конгруэнтные (т. е. получающиеся одна из другой переносом и поворотом) области $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{R}^2$, разбивающие плоскость на максимально возможное ($2^n$) число частей, которые различаются между собой состояниями принадлежности их точек областям $A_1, \ldots, A_n$. (Заметим, что для $n \leq 3$ такими областями, например, являются круги одинакового радиуса.)

[2] *Примечание:* последнее равенство в напечатанном виде тождеством не является (при $A = I$, $B = C = \varnothing$ его левая часть равна $I$, а правая — $\varnothing$); по-видимому, в нем опечатка. Возможные исправления разобраны в решении ниже.

## Решения

### Решение упражнения 1 (§ 2)

Сначала поясним, почему диаграмма Эйлера вообще годится для доказательства тождеств: на рисунке изображены три конкретных круга, а тождество должно выполняться для любых множеств.
Три круга на рис. 3, *б* делят плоскость на восемь областей. Каждая область — это множество точек с одинаковыми ответами на три вопроса: «лежит ли точка в $A$? в $B$? в $C$?». Запишем ответы тройкой цифр (1 — да, 0 — нет). Тогда номерам областей на рис. 3, *б* соответствуют тройки

$$1 = 111, \quad 2 = 110, \quad 3 = 011, \quad 4 = 101,$$
$$5 = 010, \quad 6 = 001, \quad 7 = 100, \quad 8 = 000;$$

например, точки области 2 лежат в $A$ и в $B$, но не в $C$. Все восемь возможных троек здесь встречаются: круги расположены «в общем положении».
Принадлежность точки множеству, заданному формулой через $A$, $B$, $C$ и операции $\cap$, $\cup$, $\overline{\ }$, $\setminus$, $\triangle$, зависит только от ее тройки: каждая из этих операций решает, принадлежит ли точка результату, по тому, принадлежит ли она операндам (это определение логической операции в § 1), и формула выполняет такие решения шаг за шагом. Поэтому каждой формуле соответствует *список троек*: точка входит в задаваемое множество тогда и только тогда, когда ее тройка есть в списке, — при любых $A$, $B$, $C$. Если у двух формул списки одинаковы, то эти формулы задают одно и то же множество при любых $A$, $B$, $C$, т. е. тождественно равны. А список троек формулы можно прочитать на рис. 3, *б*: это номера областей, из которых состоит соответствующее множество на рисунке. Итак, если левая и правая части состоят из одних и тех же областей рисунка, тождество доказано.
Вычисления удобно вести прямо с номерами областей:

$$A = \{1, 2, 4, 7\}, \quad B = \{1, 2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 3, 4, 6\}, \quad \overline{A} = \{3, 5, 6, 8\},$$

и операции над множествами превращаются в операции над наборами номеров.
1) Слева $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 7\}$, $(A \cup C) \cap B = \{1, 2, 3\}$. Справа $A \cap B = \{1, 2\}$, $\overline{A} \cap B \cap C = \{3\}$, объединение $\{1, 2, 3\}$. Совпало.
2) Слева $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 4\}$, $\overline{A} \cap C = \{3, 6\}$, объединение $\{1, 2, 3, 4, 6\}$. Справа $C \cup (A \cap B) = \{1, 3, 4, 6\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Совпало.

3) $A \cap C = \{1,4\}$, $B \cap C = \{1,3\}$, $C \setminus A = \{3,6\}$; их объединение $\{1,3,4,6\} = C$. Совпало.
4) Слева $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{4,7\} \cup \{3,5\} = \{3,4,5,7\}$. Справа $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1,2,3,4,5,7\} \setminus \{1,2\} = \{3,4,5,7\}$. Совпало.
5) $B \triangle C = \{2,5\} \cup \{4,6\} = \{2,4,5,6\}$, $A \cap (B \triangle C) = \{2,4\}$; объединение с $B \triangle C$ снова дает $\{2,4,5,6\} = B \triangle C$. Совпало.
6) Здесь $B \setminus \overline{A}$ — точки $B$, не лежащие вне $A$, т. е. $B \setminus \overline{A} = A \cap B = \{1,2\}$. Тогда $(B \setminus \overline{A}) \triangle C = \{1,2\} \triangle \{1,3,4,6\} = \{2,3,4,6\}$, и левая часть $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] = \{1,2,3,4,6,7\}$. Правая часть $(A \cap B) \triangle C = \{2,3,4,6\}$. Части различаются областями 1 и 7, так что в напечатанном виде равенство тождеством *не является*. Его нарушение видно и на простом примере, отвечающем области 7 (точки, лежащие только в $A$): при $A = I$, $B = C = \varnothing$ левая часть равна $I$, а правая — $\varnothing$.
Что могло иметься в виду, из текста не видно; укажем два естественных верных варианта. Если сохранить левую часть, то она, как мы только что вычислили, состоит из областей $\{1,2,3,4,6,7\} = A \cup C$, т. е.

$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv A \cup C.$$

Если же сохранить строение правой части, то верно

$$A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C) :$$

слева $\{1,2,4,7\} \cap \{2,3,4,6\} = \{2,4\}$, справа $\{1,2\} \triangle \{1,4\} = \{2,4\}$.

**Ответ.** Первые пять тождеств верны: в каждом обе части состоят из одних и тех же областей рис. 3, *б* (соответственно $\{1,2,3\}$, $\{1,2,3,4,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{3,4,5,7\}$, $\{2,4,5,6\}$). Шестое в напечатанном виде тождеством не является: его части различаются областями 1 и 7 (например, при $A = I$, $B = C = \varnothing$ слева $I$, справа $\varnothing$). Верны, например, исправленные варианты $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv A \cup C$ и $A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.

### Решение упражнения 2 (§ 2)

Уточним, что считается. «Части, различающиеся состояниями принадлежности» — это множества точек с одинаковыми ответами на вопросы «лежит ли точка в $A_1$? … в $A_n$?», т. е. непустые конституенты $A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}$ ($A^1 = A$, $A^0 = \overline{A}$), по одной на каж-


дый набор ответов $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in \{0, 1\}$. Наборов всего $2^n$, поэтому больше $2^n$ частей быть не может; вопрос в том, достигается ли эта граница выпуклыми областями. (Часть может оказаться несвязной; она все равно считается одной частью, раз все ее точки имеют одно и то же состояние.)

Небольшие $n$. При $n = 1$ один круг дает 2 части; при $n = 2$ два пересекающихся круга дают 4; при $n = 3$ три круга рис. 3, *б* дают 8. Для $n = 4$ кругов уже недостаточно: $m$ окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ частей (это доказано ниже, в решении упражнения 3), а $4^2 - 4 + 2 = 14 < 16$. Значит, четвертая область должна иметь другую форму; рис. 4 показывает, что ее граница должна «извиваться», проходя через все восемь частей.

Идея. Вместо того чтобы рисовать области, а потом искать в каждой части точку, поступим наоборот: сначала выберем по одной точке $q_\alpha$ на каждый набор $\alpha$, а затем построим области так, чтобы каждая точка $q_\alpha$ получила нужные ответы. Для этого область $A_i$ должна содержать точки $q_\alpha$ с $\alpha_i = 1$ и не содержать точек $q_\alpha$ с $\alpha_i = 0$. Выпуклая область, содержащая несколько точек, содержит и выпуклый многоугольник с вершинами в них (наименьшее выпуклое множество, содержащее эти точки). Поэтому единственная опасность — что многоугольник, натянутый на точки с $\alpha_i = 1$, захватит какую-нибудь точку с $\alpha_i = 0$. Эта опасность исчезает, если все точки поставить на одну окружность: отрезок, соединяющий две точки окружности, лежит внутри круга и касается окружности только концами, поэтому многоугольник с вершинами на окружности встречает окружность только в своих вершинах и никакой другой ее точки не содержит.

Построение. Поставим на окружность $2^n$ различных точек $q_\alpha$ и обозначим через $P_i$ выпуклый многоугольник с вершинами в точках $q_\alpha$, у которых $\alpha_i = 1$. В качестве $A_i$ возьмем множество точек, удаленных от $P_i$ не более чем на $\varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ меньше половины расстояния от любой точки $q_\beta$ с $\beta_i = 0$ до $P_i$ (таких расстояний конечное число, и все они положительны по сказанному выше). Утолщение нужно для того, чтобы получились настоящие области, а не многоугольники без внутренних точек (при $n \leq 2$ многоугольник $P_i$ вырождается в точку или отрезок). Множество $A_i$ выпукло: если точки $p$ и $p'$ удалены не более чем на $\varepsilon$ от точек $c$ и $c'$ многоугольника $P_i$, то каждая точка отрезка $pp'$ удалена не более чем на $\varepsilon$ от соответствующей точки отрезка $cc'$ (той, что делит его в том же отношении), а эта точка лежит в выпуклом многоугольнике $P_i$.

Проверка. Если $\alpha_i = 1$, то $q_\alpha$ — вершина $P_i$, и весь круг радиуса $\varepsilon$ с центром $q_\alpha$ лежит в $A_i$. Если $\alpha_i = 0$, то $q_\alpha$ удалена от $P_i$ больше чем на $2\varepsilon$, и круг радиуса $\varepsilon$ с центром $q_\alpha$ лежит вне $A_i$. Значит, весь этот круг состоит из точек с одним и тем же набором ответов $\alpha$: все $2^n$ частей непусты и даже содержат по кругу.
Пример $n = 3$. Занумеруем восемь точек на окружности тройками в двоичном порядке $000, 001, \ldots, 111$, как на рисунке. Многоугольник $P_1$ натянут на точки, у которых первая цифра 1 (100, 101, 110, 111), $P_2$ — на точки со второй цифрой 1 (010, 011, 110, 111), $P_3$ — на точки с третьей цифрой 1 (001, 011, 101, 111). Например, точка 101 — вершина $P_1$ и $P_3$, но не $P_2$, и ее ответы $1, 0, 1$; точка 000 не принадлежит ни одному многоугольнику.




$P_1$ — сплошная линия, $P_2$ — штриховая, $P_3$ — пунктирная.

(Численная проверка построения при $n \le 8$ — в файле `artifacts/checks/venn_constructions.py`.)

**Ответ.** Да: добавление выпуклой области $D$ может привести к разбиению плоскости на 16 частей — например, если $A$, $B$, $C$, $D$ построены, как выше, при $n = 4$ (16 точек на окружности); три первые области при этом сами дают 8 частей. Вообще $n$ выпуклых областей могут разбить плоскость на максимально возможное число $2^n$ частей, различающихся состояниями принадлежности; больше быть не может, так как различных состояний всего $2^n$.

### Решение упражнения 3 (§ 2)

Как и в упражнении 2, считаются части с различными наборами ответов на вопросы «лежит ли точка в $A_1$? … в $A_n$?»; максимально возможное их число $2^n$. Теперь требуется, чтобы все $A_i$ были

конгруэнтны.

Начнем с равных кругов, о которых говорится в условии. Для $n \le 3$ они годятся (рис. 3, *б*). Для $n \ge 4$ — уже нет, и вообще никакие окружности не дают $2^n$ частей. Докажем, что $m$ различных окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ связных частей. Тогда и частей с различными наборами ответов не больше $m^2 - m + 2$: такая часть — область, в ней есть круг, а в круге — точка, не лежащая ни на одной окружности; связная часть плоскости без окружностей, содержащая эту точку, целиком лежит в нашей части, потому что внутри нее ответы не меняются.

Индукция по числу окружностей $m \ge 1$. Обозначим через $Q(m)$ утверждение «любые $m$ различных окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ частей».

*База*, $m = 1$: одна окружность делит плоскость на две части (внутренность и внешность), и $1^2 - 1 + 2 = 2$.

*Шаг.* Пусть $Q(m)$ верно; добавим $(m+1)$-ю окружность. С каждой из прежних она имеет не больше двух общих точек (две различные окружности пересекаются не более чем в двух точках), так что на ней не больше $2m$ точек пересечения, и они разбивают ее не более чем на $2m$ дуг. Каждая дуга проходит внутри одной из прежних частей и разрезает ее не более чем на две, так что число частей увеличивается не больше чем на $2m$. (Если точек пересечения нет, новая окружность целиком лежит в одной части и делит ее на две; прибавляется одна часть, а $1 \le 2m$.) Получаем не больше $m^2 - m + 2 + 2m = (m+1)^2 - (m+1) + 2$ частей, т. е. $Q(m+1)$.

Теперь сравним $m^2 - m + 2$ с $2^m$. При $m = 4$: $14 < 16$. Если же $2^m > m^2 - m + 2$ при некотором $m \ge 4$, то

$$2^{m+1} > 2(m^2 - m + 2) \ge (m+1)^2 - (m+1) + 2,$$

поскольку разность $2(m^2 - m + 2) - \big((m+1)^2 - (m+1) + 2\big) = m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2)$ неотрицательна. По индукции $2^m > m^2 - m + 2$ при всех $m \ge 4$, и окружностями при $n \ge 4$ не обойтись. Нужны конгруэнтные области другой формы.

Идея — та же, что в упражнении 2: сначала выбрать точки, потом построить области. Самый простой способ получить конгруэнтные области — сдвигать одну и ту же область $S$: $A_i = S + v_i$ (параллельный перенос на вектор $v_i$). Пусть $x_\alpha$ — точка, выбранная для набора $\alpha$. Условие «$x_\alpha$ лежит в $A_i$ тогда и только тогда, когда $\alpha_i = 1$» переписывается так:

$$x_\alpha - v_i \in S \iff \alpha_i = 1.$$

Значит, $S$ должна содержать все точки множества $P_+ = \{x_\alpha - v_i : \alpha_i = 1\}$ и не содержать ни одной точки множества $P_- = \{x_\alpha - v_i : \alpha_i = 0\}$. Это возможно, если у $P_+$ и $P_-$ нет общих точек; для этого достаточно, чтобы все $n \cdot 2^n$ точек $x_\alpha - v_i$ были различны.

Выбор точек. Возьмем различные точки $x_\alpha$ внутри круга радиуса $R$ с центром в начале координат и векторы $v_i = (3Ri, 0)$, $i = 1, \ldots, n$. Если $x_\alpha - v_i = x_\beta - v_j$ и $i \neq j$, то $|x_\alpha - x_\beta| = |v_i - v_j| \geq 3R$, что невозможно: обе точки лежат в круге радиуса $R$, и $|x_\alpha - x_\beta| < 2R$. Если же $i = j$, то $x_\alpha = x_\beta$, т. е. $\alpha = \beta$. Итак, все точки $x_\alpha - v_i$ различны.

Построение $S$. Пусть $r$ меньше половины наименьшего расстояния между различными точками множества $P_+ \cup P_-$. Возьмем открытые круги радиуса $r$ с центрами в точках $P_+$ и соединим их тонкими «коридорами» — ломаными, обходящими круги радиуса $r$ вокруг точек $P_-$ и утолщенными настолько мало, чтобы этих кругов не задеть. (Обойти конечное число малых кругов всегда можно: плоскость без них остается связной.) Получится связная область $S$, которая содержит круги радиуса $r$ вокруг точек $P_+$ и не пересекается с кругами радиуса $r$ вокруг точек $P_-$.

Проверка. Положим $A_i = S + v_i$; эти области конгруэнтны. Если $\alpha_i = 1$, то круг радиуса $r$ с центром $x_\alpha - v_i$ лежит в $S$, т. е. круг радиуса $r$ с центром $x_\alpha$ лежит в $A_i$. Если $\alpha_i = 0$, то такой круг не пересекается с $A_i$. Значит, круг радиуса $r$ с центром $x_\alpha$ состоит из точек с набором ответов $\alpha$, и все $2^n$ частей непусты.

Пример $n = 2$, $R = 1$. Возьмем $x_{00} = (0, 0)$, $x_{01} = (0, \frac{1}{2})$, $x_{10} = (\frac{1}{2}, 0)$, $x_{11} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $v_1 = (3, 0)$, $v_2 = (6, 0)$. Тогда

$$\begin{aligned} P_+ &= \{x_{10} - v_1,\ x_{11} - v_1,\ x_{01} - v_2,\ x_{11} - v_2\} = \\ &= \{(-\tfrac{5}{2}, 0),\ (-\tfrac{5}{2}, \tfrac{1}{2}),\ (-6, \tfrac{1}{2}),\ (-\tfrac{11}{2}, \tfrac{1}{2})\}, \\ P_- &= \{x_{00} - v_1,\ x_{01} - v_1,\ x_{00} - v_2,\ x_{10} - v_2\} = \\ &= \{(-3, 0),\ (-3, \tfrac{1}{2}),\ (-6, 0),\ (-\tfrac{11}{2}, 0)\}. \end{aligned}$$

Все восемь точек различны, и область $S$ — четыре малых круга вокруг точек $P_+$, соединенные коридорами, — дает две конгруэнтные области $S + v_1$, $S + v_2$ с четырьмя частями. (Численная проверка построения при $n \leq 6$ — в файле `artifacts/checks/venn_constructions.py`.)

**Ответ.** Да, при любом $n$. Например, подходят области $A_i = S + v_i$, полученные параллельными переносами одной области $S$, построенной выше. Равные круги годятся только при $n \leq 3$: $n \geq 4$ окружностей дают не больше $n^2 - n + 2 < 2^n$ частей.

# § 3. Принцип двойственности

## Условия

1. Существует ли самодвойственная двухместная операция $F(A, B)$, не равная тождественно $A$ или $B$?

2. Описать множество всех самодвойственных формул вида $F(A_1, \ldots, A_n)$ при любом $n \geq 2$.

3. Описать множество всех логических формул, для которых $F \cap F^* = \varnothing$. Будет ли при этом $F \cup F^* = I$?

4.[3] Будем предполагать, что $F(A_1, \ldots, A_n)$ — *строго $n$-местная* логическая операция, если не существует таких целых чисел $k_1, \ldots, k_s \in [1, n]$ $(s < n)$, что $F(A_1, \ldots, A_n) = \Phi(A_{k_1}, \ldots, A_{k_s})$, где $\Phi$ — $s$-местная логическая формула. Для каких $n$ существуют строго $n$-местные самодвойственные логические формулы? Простой перебор показывает, что для $n = 2$ таких формул нет. Для $n = 3$ примером самодвойственной строго трехместной формулы является (1.6).

5. Пусть $\mu(n)$ — количество самодвойственных $n$-местных логических формул. Показать, что $\mu(n)$ — неубывающая функция.

6. Пусть $\tau(n)$ — количество самодвойственных строго $n$-местных логических формул. Показать, что $\tau(2) = 0$. Для каких еще $n$ $\tau(n) = 0$?

7. Пусть $\lambda\{F(A_1, \ldots, A_n)\} = \lambda(F)$ — количество конституентных областей в диаграмме Эйлера для логической формулы $F(A_1, \ldots, A_n)$, а $\lambda(F^*)$ — количество таких же областей для двойственной формулы. Описать класс функций, для которых $\lambda(F) = \lambda(F^*)$.

## Решения

Во всех упражнениях этого параграфа формулы рассматриваются с точностью до тождественного равенства: две тождественно равные формулы задают одну и ту же операцию над множествами и считаются одной формулой. Двойственная формула $F^*$ получается из $F$ заменой $\cap \leftrightarrow \cup$, $\varnothing \leftrightarrow I$; черты дополнения и буквы $A_i$ при этом не меняются.

**Решение упражнения 1 (§ 3)**

**Пробы.** Переберем несколько двухместных операций и для каждой сравним $F$ и $F^*$.
$F = A \cap B$: $F^* = A \cup B$. При $A = \varnothing$, $B = I$ получаем $F = \varnothing$, $F^* = I$ — не самодвойственна. Так же и $A \cup B$.

[3] *Исправлено:* в оригинале номер упражнения «4.» пропущен.

$F = A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$: $F^* = (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$. Раскрыв скобки (как в решении упражнения 1 § 1), получим $F^* \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ — точки, лежащие в обоих множествах или ни в одном, т. е. как раз дополнение $A \triangle B$. Не самодвойственна.
$F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$ (пример из текста § 3): $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* = (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \varnothing) \equiv \overline{A} \cap B$. Не самодвойственна.
$F = \overline{A}$: замена символов ничего не меняет, $F^* = \overline{A} = F$. Эта формула самодвойственна и не равна тождественно ни $A$, ни $B$. Так же $\overline{B}$.
Итак, буквально на вопрос можно ответить сразу: да, например $\overline{A}$ и $\overline{B}$. Но обе эти операции по существу одноместны: $\overline{A}$ не зависит от $B$. Содержательный вопрос — есть ли самодвойственная операция, по-настоящему зависящая от обоих аргументов? Наши пробы таких не дали, но проб было мало. Чтобы перебрать *все* двухместные операции, нужны два инструмента: способ вычислять $F^*$ без замены символов и способ записать любую формулу конечной таблицей.
**Лемма (L).** *Для любой формулы* $F(A_1, \ldots, A_n)$

$$F^*(A_1, \ldots, A_n) \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}. \qquad \text{(L)}$$

Откуда это берется: по правилам де Моргана 10°, 11° дополнение «переворачивает» $\cap$ и $\cup$. Если протолкнуть черту дополнения внутрь формулы до самых букв, то каждое $\cap$ станет $\cup$ и наоборот, $\varnothing$ станет $I$ и наоборот (18°, 19°), а над буквами появятся черты; убрав их (подставив $\overline{A_i}$ вместо $A_i$), получим ровно $F^*$. Проведем это рассуждение строго.
Для доказательства утверждения обо всех формулах нужен натуральный параметр, по которому вести индукцию. Возьмем $k(F)$ — число символов операций $\cap$, $\cup$, $\overline{\ }$ в записи $F$ (например, $k(A_1) = 0$, $k(\overline{A_1}) = 1$, $k((A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)) = 4$). Каждая формула с $k(F) \geq 1$ получена последней (внешней) операцией из более коротких формул: $F = \overline{G}$ с $k(G) = k(F) - 1$, либо $F = G \cap H$ или $F = G \cup H$ с $k(G) + k(H) = k(F) - 1$. В двух последних случаях подформулы $G$, $H$ могут быть короче $F$ не на одну операцию, а намного. Поэтому предположение индукции понадобится не для одного значения $k$, а для всех меньших: это *полная* индукция (если верно $P(0)$ и из того, что верны $P(0), \ldots, P(k)$, следует $P(k+1)$, то $P(k)$ верно при всех $k$). Она равносильна обычной: достаточно применить обычную индукцию к утверждению «$P(m)$ верно при всех $m \leq k$».

Обозначим $\widehat{F} = \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}$ и докажем индукцией по $k$ утверждение

$$P(k)\text{: } \textit{для всякой формулы } F \textit{ с } k(F) = k \textit{ выполнено } F^* \equiv \widehat{F}.$$

*База*, $k = 0$. Формула без операций — одна буква или одна константа. Если $F = A_i$, то $F^* = A_i$ (менять нечего), а $\widehat{F} = \overline{\overline{A_i}} = A_i$ по 9°. Если $F = \varnothing$, то $F^* = I$ и $\widehat{F} = \overline{\varnothing} = I$ (18°). Если $F = I$, то $F^* = \varnothing$ и $\widehat{F} = \overline{I} = \varnothing$ (19°).

*Шаг.* Пусть $P(0), \ldots, P(k)$ верны и $k(F) = k + 1$. Сокращенно будем писать $F(\overline{A})$ вместо $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})$. Рассмотрим внешнюю операцию $F$.

(а) $F = \overline{G}$, $k(G) = k$. Замена символов черту не трогает, поэтому $F^* = \overline{G^*}$, и по $P(k)$ и 9° $F^* \equiv \overline{\overline{G(\overline{A})}} = G(\overline{A})$. С другой стороны, $\widehat{F} = \overline{F(\overline{A})} = \overline{\overline{G(\overline{A})}} = G(\overline{A})$. Совпало.

(б) $F = G \cap H$, $k(G), k(H) \leq k$. Внешнее $\cap$ при замене становится $\cup$, а внутри $G$ и $H$ замена дает $G^*$ и $H^*$: $F^* = G^* \cup H^*$. По предположениям $P(k(G))$, $P(k(H))$ и правилу де Моргана 10°

$$F^* \equiv \overline{G(\overline{A})} \cup \overline{H(\overline{A})} \equiv \overline{G(\overline{A}) \cap H(\overline{A})} = \overline{F(\overline{A})} = \widehat{F}.$$

(в) $F = G \cup H$: так же, с 11° вместо 10°: $F^* = G^* \cap H^* \equiv \overline{G(\overline{A})} \cap \overline{H(\overline{A})} \equiv \overline{G(\overline{A}) \cup H(\overline{A})} = \widehat{F}$.

Тем самым $P(k+1)$ доказано, и (L) верно для всех формул.

Проверим (L) на формуле $F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$, для которой мы нашли $F^* \equiv \overline{A} \cap B$. Подставляем $\overline{A}$, $\overline{B}$ вместо $A$, $B$; черта над $A$ в формуле дает $\overline{\overline{A}} = A$ (дополняются буквы, а не то, что над ними написано): $F(\overline{A}, \overline{B}) = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cup (A \cap I) \equiv A \cup \overline{B}$ (по 14°, 6°, 13°), и $\overline{F(\overline{A}, \overline{B})} \equiv \overline{A} \cap B$ (по 11°, 9°). Совпало.

**Коды точек и таблица формулы.** Точке $x \in I$ сопоставим ее *код* $\alpha(x) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, где $\alpha_i = 1$, если $x \in A_i$, и $\alpha_i = 0$ иначе. Точки с одним и тем же кодом $\alpha$ образуют конституенту $K_\alpha = A_1^{\alpha_1} \cap \cdots \cap A_n^{\alpha_n}$ ($A^1 = A$, $A^0 = \overline{A}$) — одну из $2^n$ областей диаграммы Эйлера.

*Принадлежность точки множеству $F(A_1, \ldots, A_n)$ зависит только от ее кода*, т. е. существует функция $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ (таблица формулы) такая, что

$$x \in F(A_1, \ldots, A_n) \iff f(\alpha(x)) = 1 \qquad \text{при любых } A_1, \ldots, A_n, \tag{D}$$

т. е. $F = \bigcup_{\alpha:\, f(\alpha)=1} K_\alpha$. Доказывается это той же полной индукцией по $k(F)$. База: для $F = A_i$ годится $f(\alpha) = \alpha_i$, для $F = \varnothing$ — $f \equiv 0$, для $F = I$ — $f \equiv 1$. Шаг: если $G$, $H$ имеют таблицы $g$, $h$, то $x \in \overline{G} \iff g(\alpha(x)) = 0$, $x \in G \cap H \iff g(\alpha(x)) = 1$ и $h(\alpha(x)) = 1$, $x \in G \cup H \iff g(\alpha(x)) = 1$ или $h(\alpha(x)) = 1$; таблицами служат $1 - g$, $\min(g, h)$, $\max(g, h)$. Тем самым таблица вычисляется по формуле заменой $\cap \to \min$, $\cup \to \max$, черты — на $1 - \cdot$, $\varnothing \to 0$, $I \to 1$.

(i) *Две формулы тождественно равны тогда и только тогда, когда их таблицы совпадают.* Если $f = g$, то по (D) при любых $A_i$ каждая точка лежит в $F$ тогда и только тогда, когда лежит в $G$. Обратно, пусть $f(\beta) \neq g(\beta)$ для некоторого набора $\beta$. Возьмем универсальное множество $U = \{0, 1\}^n$ (все наборы из нулей и единиц; обозначаем его $U$, чтобы не путать с константой $I$, которая в формулах обозначает тогда все $U$) и $A_i = \{\alpha \in U : \ \alpha_i = 1\}$. Код точки $\alpha \in U$ равен самому $\alpha$, поэтому точка $\beta$ лежит ровно в одном из множеств $F$, $G$, и $F \not\equiv G$. (В этом примере каждая конституента $K_\alpha = \{\alpha\}$ непуста; любая другая конфигурация с непустыми конституентами — например, три круга на рис. 3, *б* — годится точно так же.)

(ii) *Таблица двойственной формулы:* $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar\alpha)$, где $\bar\alpha = (1 - \alpha_1, \ldots, 1 - \alpha_n)$. Действительно, по отношению к множествам $\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}$ код точки $x$ равен $\bar\alpha(x)$, поэтому $x \in F(\overline{A}) \iff f(\bar\alpha(x)) = 1$, а по (L) $x \in F^*(A) \iff x \notin F(\overline{A}) \iff f(\bar\alpha(x)) = 0$. Из (i) и (ii) получаем критерий:

$$F \text{ самодвойственна} \iff f(\bar\alpha) = 1 - f(\alpha) \quad \text{для всех } \alpha. \qquad \text{(C)}$$

Словами: при дополнении всех аргументов результат дополняется, $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$. На языке таблицы: наборы разбиваются на пары противоположных $\{\alpha, \bar\alpha\}$ (набор не совпадает со своим противоположным), и на каждой паре значения $f$ должны быть разными.

**Полный перебор при $n = 2$.** Наборов четыре: 00, 01, 10, 11 (первая цифра — принадлежность $A$, вторая — $B$); пары противоположных: $\{00, 11\}$ и $\{01, 10\}$. Значения $a = f(00)$ и $b = f(01)$ можно выбрать произвольно, остальные определены условием (C): $f(11) = 1 - a$, $f(10) = 1 - b$. Получаем четыре таблицы:

| $a$ | $b$ | $f(00), f(01), f(10), f(11)$ | $f(\alpha)$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 0, 1, 1 | $\alpha_1$ | $A$ |
| 0 | 1 | 0, 1, 0, 1 | $\alpha_2$ | $B$ |
| 1 | 0 | 1, 0, 1, 0 | $1-\alpha_2$ | $\overline{B}$ |
| 1 | 1 | 1, 1, 0, 0 | $1-\alpha_1$ | $\overline{A}$ |

Каждая строка проверяется по (C): например, в третьей строке $f(00)=1$, $f(11)=0$, $f(01)=0$, $f(10)=1$ — на обеих парах значения разные; единица стоит в наборах 00 и 10, т. е. там, где вторая цифра равна нулю, а это таблица формулы $\overline{B}$. По (i) других самодвойственных двухместных операций нет. Ни одна из четырех не зависит от обоих аргументов: $A$ и $\overline{A}$ не зависят от $B$, а $B$ и $\overline{B}$ — от $A$.

**Ответ.** Буквально — да: $\overline{A}$ и $\overline{B}$ самодвойственны и не равны тождественно ни $A$, ни $B$. Но всего самодвойственных двухместных операций четыре — $A$, $B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, и ни одна из них не зависит от обоих аргументов; самодвойственной операции, существенно зависящей и от $A$, и от $B$, не существует.

## Решение упражнения 2 (§ 3)

**Что известно.** В решении упражнения 1 доказаны (L) и (C). Напомним их. По (L) двойственную формулу можно вычислить, подставив дополнения вместо всех аргументов и взяв дополнение результата: $F^* \equiv \overline{F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n})}$ (протолкнуть черту внутрь до букв по правилам де Моргана). Каждой формуле соответствует таблица $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$: точка $x$ лежит в $F$ тогда и только тогда, когда $f(\alpha(x))=1$, где $\alpha(x)$ — код точки (набор признаков $x \in A_i$). Формулы тождественно равны ровно тогда, когда равны их таблицы. Дополнение всех аргументов заменяет код $\alpha$ противоположным $\bar{\alpha}$, поэтому

$$F \text{ самодвойственна} \iff F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1,\dots,A_n)} \iff \iff f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha) \quad \forall \alpha. \tag{C}$$

**Пробы.** При $n=2$ в решении упражнения 1 найдены все самодвойственные формулы: $A$, $B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$. При $n=3$ проверим по (C) несколько формул.

Формула (1.6) $(A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C)$ — «точка лежит хотя бы в двух из трех множеств». Если заменить все три множества

их дополнениями, получится «точка лежит хотя бы в двух дополнениях», т. е. «не лежит хотя бы в двух множествах», т. е. «лежит не более чем в одном» — а это дополнение исходного множества. Самодвойственна (в книге то же проверено длинной выкладкой).
Формула $A \triangle B \triangle C$ — «точка лежит в нечетном числе множеств» (решение упражнения 2 § 1). При дополнении всех трех множеств число множеств, содержащих точку, заменяется на $3 - $ это число, т. е. меняет четность, потому что 3 нечетно. Самодвойственна.
Формула $A \cap B \cap C$: $F^* = A \cup B \cup C$; при $A = B = C = I$ получаем $I$ и $I$, а при $A = I$, $B = C = \varnothing$ — $\varnothing$ и $I$. Не самодвойственна.
Посмотрим на таблицу (1.6): единицы стоят на наборах 110, 101, 011, 111 (не меньше двух единиц), нули — на противоположных им 001, 010, 100, 000. Из каждой пары противоположных наборов взят ровно один. Это и есть общая закономерность.
**Описание через конституенты.** Наборы $\{0,1\}^n$ разбиваются на $2^{n-1}$ пар $\{\alpha, \bar\alpha\}$. По (С) на каждой паре таблица самодвойственной формулы принимает разные значения, т. е. множество $S = \{\alpha : f(\alpha) = 1\}$ содержит ровно один набор из каждой пары; и обратно, если $S$ таково, то $f(\alpha) = 1 \iff \alpha \in S \iff \bar\alpha \notin S \iff f(\bar\alpha) = 0$, т. е. выполнено (С). Так как $F = \bigcup_{\alpha\in S} K_\alpha$, получаем:

> *$F$ самодвойственна тогда и только тогда, когда $F \equiv \bigcup_{\alpha\in S} A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}$, где $S$ содержит ровно один набор из каждой пары $\{\alpha, \bar\alpha\}$; разным $S$ отвечают разные формулы.*

На каждой паре выбор делается двумя способами, независимо от других пар, поэтому самодвойственных формул от $n$ аргументов $\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$; каждая занимает ровно половину диаграммы Эйлера.
**Конструктивная форма.** Описание через конституенты полное, но громоздкое: формула из $2^{n-1}$ слагаемых. Найдем способ получать самодвойственные формулы из произвольных формул меньшего числа аргументов.
Для любой формулы

$$\begin{gathered} F(A_1, \dots, A_n) \equiv \big(A_1 \cap F_1\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap F_0\big), \\ F_1 = F(I, A_2, \dots, A_n), \quad F_0 = F(\varnothing, A_2, \dots, A_n). \end{gathered} \tag{Ш}$$

Почему: точка $x \in A_1$ ведет себя в $F$ так же, как если бы $A_1$ было всем $I$ (ее код тот же: первая цифра 1, остальные те же), а точка $x \notin A_1$ — так же, как если бы $A_1$ было пустым. Формулы $F_0$, $F_1$ от $A_1$ не зависят.

Подставим (Ш) в (С). Обозначим $A' = (A_2, \ldots, A_n)$. Дополнение всех аргументов дает $F(\overline{A}) \equiv \big(\overline{A_1} \cap F_1(\overline{A'})\big) \cup \big(A_1 \cap F_0(\overline{A'})\big)$. Дополнение результата: точки $A_1$ не лежат в $F$ ровно тогда, когда не лежат в $F_1$, точки $\overline{A_1}$ — когда не лежат в $F_0$, поэтому $\overline{F(A)} \equiv \big(A_1 \cap \overline{F_1}\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap \overline{F_0}\big)$. Оба выражения имеют вид $(A_1 \cap X) \cup (\overline{A_1} \cap Y)$ с $X, Y$, не зависящими от $A_1$, а такое множество однозначно определяет $X$ и $Y$: при $A_1 = I$ оно равно $X$, при $A_1 = \varnothing$ — $Y$. Поэтому (С) равносильно равенству $F_1(\overline{A'}) \equiv \overline{F_0(A')}$ (сравниваем множители при $\overline{A_1}$; сравнение при $A_1$ дает то же равенство для дополнений), т. е. $F_0 \equiv \overline{F_1(\overline{A'})}$, а по (L) это $F_1^*$. Итак:

> *$F$ самодвойственна тогда и только тогда, когда $F \equiv \big(A_1 \cap G(A_2, \ldots, A_n)\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap G^*(A_2, \ldots, A_n)\big)$ для некоторой формулы $G$ от $n-1$ аргументов. Формула $G$ произвольна, и разным $G$ отвечают разные $F$.*

Последнее: если $F$ построена по $G$, то $F(I, A_2, \ldots, A_n) \equiv G$, так что $G$ восстанавливается по $F$. Обратно, всякая $F$ такого вида самодвойственна: $F_1 = G$, $F_0 = G^* \equiv \overline{G(\overline{A'})}$, а это и есть найденное условие. Неформально: самодвойственная формула — это произвольная формула $G$ и ее «зеркальное отражение» $G^*$, склеенные вдоль $A_1$. Отсюда еще раз $\mu(n)$ равно числу всех формул от $n-1$ аргумента, $2^{2^{n-1}}$.

**Полный перебор при $n = 3$.** Переберем все 16 формул $G(B, C)$ и построим $F = (A \cap G) \cup (\overline{A} \cap G^*)$. Здесь $b, c \in \{0, 1\}$, $B^1 = B$, $B^0 = \overline{B}$, и $\mathrm{maj}(X, Y, Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \cup (Y \cap Z)$ — «большинство».

| $G$ | $G^*$ | $F$ |
|---|---|---|
| $\varnothing$ | $I$ | $\overline{A}$ |
| $I$ | $\varnothing$ | $A$ |
| $B$, $\overline{B}$, $C$, $\overline{C}$ | те же | $B$, $\overline{B}$, $C$, $\overline{C}$ |
| $B^b \cap C^c$ (4 формулы) | $B^b \cup C^c$ | $\mathrm{maj}(\overline{A}, B^b, C^c)$ |
| $B^b \cup C^c$ (4 формулы) | $B^b \cap C^c$ | $\mathrm{maj}(A, B^b, C^c)$ |
| $B \triangle C$ | $\overline{B \triangle C}$ | $\overline{A \triangle B \triangle C}$ |
| $\overline{B \triangle C}$ | $B \triangle C$ | $A \triangle B \triangle C$ |

Проверим одну строку в духе книги, раскрытием скобок. При $G = B \cap \overline{C}$: $F = (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap (B \cup \overline{C})) \equiv (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{C})$. С другой стороны, $\mathrm{maj}(\overline{A}, B, \overline{C}) = (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{C}) \cup (B \cap \overline{C})$, и по склеиванию $B \cap \overline{C} \equiv (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C})$, причем второй член содержится в $\overline{A} \cap B$ и поглощается. Совпало. Строки с $B \triangle C$: точка лежит в $A \cap (B \triangle C)$, если она в $A$ и ровно в одном из $B$,

$C$, т. е. ровно в двух множествах; в $\overline{A} \cap \overline{B \triangle C}$ — если она вне $A$ и в обоих или ни в одном из $B$, $C$, т. е. в двух или ни в одном. Вместе — в четном числе, это $\overline{A \triangle B \triangle C}$.
Итого 16 формул трех типов: 6 вырожденных ($A$, $\overline{A}$, $B$, $\overline{B}$, $C$, $\overline{C}$), 8 «большинств» $\mathrm{maj}(A^a, B^b, C^c)$ (среди них (1.6)) и 2 «четности» $A \triangle B \triangle C$, $\overline{A \triangle B \triangle C}$. (Перебор всех 256 таблиц при $n = 3$ в файле `artifacts/checks/boolean_tables.py` подтверждает это разбиение.)

**Ответ.** Самодвойственные формулы $F(A_1, \ldots, A_n)$ — это в точности формулы, у которых при дополнении всех аргументов дополняется результат: $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$. Их можно выписать двумя равносильными способами: (1) как объединение конституент $A_1^{\alpha_1} \cap \cdots \cap A_n^{\alpha_n}$, взятых по одной из каждой пары противоположных наборов $\{\alpha, \bar{\alpha}\}$; (2) как $(A_1 \cap G) \cup (\overline{A_1} \cap G^*)$, где $G$ — произвольная формула от $A_2, \ldots, A_n$. Их число $2^{2^{n-1}}$; каждая занимает ровно половину диаграммы Эйлера. При $n = 2$ это $A$, $B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$; при $n = 3$ — шесть формул $A_i$, $\overline{A_i}$, восемь «большинств» и две «четности».

## Решение упражнения 3 (§ 3)

**Что известно.** Из решения упражнения 1: каждой формуле соответствует таблица $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ — точка $x$ лежит в $F$ тогда и только тогда, когда $f(\alpha(x)) = 1$, где $\alpha(x)$ — код точки ($\alpha_i = 1$ при $x \in A_i$); формулы тождественно равны ровно тогда, когда равны их таблицы (в конфигурации, где все $2^n$ конституент непусты, разные таблицы дают разные множества). Там же доказана лемма (L): $F^* \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}$, и ее следствие

$$f^*(\alpha) = 1 - f(\bar{\alpha}), \qquad \bar{\alpha} = (1 - \alpha_1, \ldots, 1 - \alpha_n), \tag{ii}$$

потому что дополнение всех аргументов заменяет код точки противоположным. Пересечению и объединению формул соответствуют min и max таблиц.
**Пробы.** $n = 1$. $F = A$: $F^* = A$, $F \cap F^* = A$ — не пусто (при $A \neq \varnothing$). $F = \varnothing$: $F^* = I$, $F \cap F^* = \varnothing$, и $F \cup F^* = I$. $F = I$: то же самое.
$n = 2$. $F = A \cap B$: $F^* = A \cup B$, $F \cap F^* = A \cap B$ — не пусто. $F = A \triangle B$: в решении упражнения 1 найдено $F^* \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ — точки, лежащие в обоих множествах или ни в одном, т. е. дополнение $A \triangle B$. Поэтому $F \cap F^* = \varnothing$ и $F \cup F^* = I$.

В обоих удачных случаях не только $F \cap F^* = \varnothing$, но и $F \cup F^* = I$: оказалось, что $F^* \equiv \overline{F}$. Проверим, всегда ли так.

**Перевод условия на язык таблиц.** Тождество $F \cap F^* \equiv \varnothing$ означает, что таблица формулы $F \cap F^*$ тождественно равна нулю: $\min\big(f(\alpha), f^*(\alpha)\big) = 0$ при всех $\alpha$. По (ii) это $\min\big(f(\alpha), 1-f(\bar\alpha)\big) = 0$, т. е.

$$\text{если } f(\alpha) = 1, \text{ то } f(\bar\alpha) = 1 \qquad \text{для всех } \alpha. \tag{1}$$

Условие (1) выглядит односторонним, но оно должно выполняться для всех наборов, в том числе для $\bar\alpha$ вместо $\alpha$; так как $\bar{\bar\alpha} = \alpha$, получаем: если $f(\bar\alpha) = 1$, то $f(\alpha) = 1$. Вместе с (1) это дает

$$f(\bar\alpha) = f(\alpha) \qquad \text{для всех } \alpha, \tag{2}$$

а (1) следует из (2) сразу: если $f(\alpha) = 1$, то $f(\bar\alpha) = f(\alpha) = 1$. Итак, (1) равносильно (2). На языке множеств (2) означает

$$F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n) :$$

*формула не меняется при дополнении всех аргументов.* Назовем такие формулы *четными* (по аналогии с четными функциями $\varphi(-x) = \varphi(x)$).

То же можно увидеть прямо на множествах: $F \cap F^* = \varnothing$ значит $F^* \subset \overline{F}$; по (L) $F^* \equiv \overline{F(\overline{A})}$, так что $\overline{F(\overline{A})} \subset \overline{F(A)}$, т. е. $F(A) \subset F(\overline{A})$ при любых множествах $A_i$. Подставив $\overline{A_i}$ вместо $A_i$, получаем и $F(\overline{A}) \subset F(A)$.

**Описание четных формул.** Наборы $\{0,1\}^n$ разбиваются на $2^{n-1}$ пар противоположных $\{\alpha, \bar\alpha\}$. Условие (2) говорит, что таблица постоянна на каждой паре, а на разных парах значения независимы. Значит, множество $\{\alpha :\ f(\alpha) = 1\}$ состоит из целых пар, и

> *$F \cap F^* \equiv \varnothing$ тогда и только тогда, когда $F$ — объединение целых пар противоположных конституент $K_\alpha \cup K_{\bar\alpha}$ (каких угодно и сколько угодно пар). Таких формул $2^{2^{n-1}}$.*

Удобнее другая запись. При $n \geq 2$ четные формулы — это в точности формулы вида

$$F \equiv H\big(A_1 \triangle A_2,\ A_1 \triangle A_3,\ \dots,\ A_1 \triangle A_n\big),$$

где $H$ — произвольная формула от $n-1$ аргументов. Во-первых, всякая такая формула четна: $\overline{A_1} \triangle \overline{A_i} \equiv A_1 \triangle A_i$ (точка лежит ровно в одном из двух множеств тогда и только тогда, когда она

лежит ровно в одном из их дополнений), так что дополнение всех $A_i$ не меняет ни одного аргумента $H$. Во-вторых, всякая четная $F$ так записывается. Положим $H(B_2,\dots,B_n) = F(\varnothing, B_2,\dots,B_n)$ и проверим равенство поточечно. Пусть код точки $x$ равен $\alpha$. Если $\alpha_1 = 0$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \in A_i$, т. е. относительно набора $(\varnothing, A_1 \triangle A_2,\dots, A_1 \triangle A_n)$ код точки $x$ равен $(0,\alpha_2,\dots,\alpha_n) = \alpha$, и правая часть содержит $x$ ровно тогда, когда $f(\alpha) = 1$. Если $\alpha_1 = 1$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \notin A_i$, код равен $(0, 1-\alpha_2,\dots,1-\alpha_n) = \bar\alpha$, и правая часть содержит $x$ ровно тогда, когда $f(\bar\alpha) = 1$, а по (2) это то же, что $f(\alpha) = 1$. Неформально: четная формула «не видит» самих множеств, только то, совпадают или различаются состояния точки по отношению к разным множествам.

**Второй вопрос.** Если $F$ четна, то по (ii) и (2) $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar\alpha) = 1 - f(\alpha)$, т. е. $F^* \equiv \overline{F}$. Поэтому $F \cup F^* = F \cup \overline{F} = I$ (13°). Значит, ответ на второй вопрос — да.

Более того, условие $F \cup F^* \equiv I$ выделяет тот же класс. Оно означает $\max\bigl(f(\alpha), 1-f(\bar\alpha)\bigr) = 1$, т. е. «если $f(\bar\alpha) = 1$, то $f(\alpha) = 1$» при всех $\alpha$, и тем же приемом (подставить $\bar\alpha$ вместо $\alpha$) получаем (2). Итак, для любой формулы равносильны четыре условия:

$$F \cap F^* \equiv \varnothing; \qquad F \cup F^* \equiv I; \qquad F^* \equiv \overline{F};$$
$$F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n}) \equiv F(A_1,\dots,A_n).$$

(Третье влечет первые два по 12°, 13°; каждое из первых двух, как показано, влечет четвертое; четвертое влечет третье.)

**Перебор при $n = 2$.** Пары: $\{00, 11\}$ и $\{01, 10\}$; четных формул четыре.

| взятые пары | $F$ | $F^*$ |
|---|---|---|
| ни одной | $\varnothing$ | $I$ |
| $\{01, 10\}$ | $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ | $(A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$ |
| $\{00, 11\}$ | $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ | $(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$ |
| обе | $I$ | $\varnothing$ |

Вторая строка — это $F = A \triangle B$ и $F^* \equiv \overline{A \triangle B}$ (раскрытие скобок, как в решении упражнения 1 § 1), третья — $F = \overline{A \triangle B}$ и $F^* \equiv A \triangle B$. Во всех строках $F^* \equiv \overline{F}$, так что $F \cap F^* = \varnothing$ и $F \cup F^* = I$. В записи $H(A \triangle B)$ им отвечают $H = \varnothing$, $B_2$, $\overline{B_2}$, $I$. Остальные двухместные формулы (их двенадцать) не четны; например, у $A \cap B$ значения на паре $\{00, 11\}$ разные: 0 и 1.

Пример при $n = 3$: $H = B_2 \cap B_3$ дает $F = (A \triangle B) \cap (A \triangle C)$ — «и $B$, и $C$ отличаются от $A$ в точке $x$», т. е. $F = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap$

$B \cap C) = K_{100} \cup K_{011}$, одна пара противоположных конституент. Ее двойственная $(A \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \cap (\overline{A} \cup B \cup C)$ по правилам де Моргана есть $\overline{K_{100}} \cap \overline{K_{011}} = \overline{F}$.

**Ответ.** $F \cap F^* \equiv \varnothing$ тогда и только тогда, когда $F$ не меняется при дополнении всех аргументов: $F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n)$. Такие формулы — объединения целых пар противоположных конституент $K_\alpha \cup K_{\bar\alpha}$; равносильно (при $n \geq 2$), формулы вида $H(A_1 \triangle A_2, \dots, A_1 \triangle A_n)$ с произвольной $H$. Их $2^{2^{n-1}}$. Для них $F^* \equiv \overline{F}$, поэтому да, всегда $F \cup F^* = I$; более того, условие $F \cup F^* \equiv I$ выделяет ровно тот же класс формул.

## Решение упражнения 4 (§ 3)

**Как проверять строгую $n$-местность.** Определение говорит о несуществовании формулы Φ от меньшего числа аргументов; проверять его напрямую неудобно. Будем говорить, что $F$ *существенно зависит* от $A_j$, если изменение одного $A_j$ может изменить результат: найдутся множества $A_1, \dots, A_n$ и $A'_j$ такие, что $F(\dots, A_j, \dots) \neq F(\dots, A'_j, \dots)$.

> *$F$ строго $n$-местна тогда и только тогда, когда она существенно зависит от каждого $A_j$.*

Действительно, если $F \equiv \Phi(A_{k_1}, \dots, A_{k_s})$ с $s < n$, то какой-то аргумент $A_j$ не входит в список $k_1, \dots, k_s$; его изменение не меняет правую часть, а значит, и $F$. Обратно, если изменение $A_j$ никогда не меняет $F$, то, в частности, $A_j$ можно заменить на $\varnothing$: $F \equiv F(A_1, \dots, \varnothing, \dots, A_n)$, а справа стоит формула от $n-1$ аргументов. Существенную зависимость проверить легко: достаточно предъявить один набор множеств, на котором замена $A_j$ меняет результат; обычно удобно придать остальным аргументам значения $\varnothing$ или $I$.

**Что известно о самодвойственности** (решения упражнений 1 и 2): $F$ самодвойственна тогда и только тогда, когда $F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \dots, A_n)}$; на языке таблиц $f(\bar\alpha) = 1 - f(\alpha)$: на каждой паре противоположных наборов значения разные. Самодвойственные формулы от $n$ аргументов — в точности формулы $(A_1 \cap G) \cup (\overline{A_1} \cap G^*)$, где $G$ — произвольная формула от $A_2, \dots, A_n$.

$n = 1$**.** Формула $A$ самодвойственна ($A^* = A$) и строго одноместна: она не равна тождественно ни $\varnothing$, ни $I$ (единственным формулам от нуля аргументов).

$n = 2$**.** В решении упражнения 1 найдены все самодвойственные двухместные формулы: $A$, $B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$. Каждая зависит лишь от одного аргумента; строго двухместных нет. Это и есть «простой перебор» из условия. Причина видна при подсчете: самодвойственных формул от двух аргументов $2^{2^1} = 4$, и ровно столько же одноместных самодвойственных формул от $A$ или от $B$ ($A$, $\overline{A}$, $B$, $\overline{B}$) — все места заняты.

$n = 3$**.** Формула (1.6) $M = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$ самодвойственна (решение упражнения 2: «хотя бы в двух из трех» после дополнения всех множеств превращается в «не более чем в одном»). При $B = I$, $C = \varnothing$ она равна $(A \cap I) \cup (A \cap \varnothing) \cup (I \cap \varnothing) = A$, так что от $A$ она зависит существенно; по симметрии — и от $B$, и от $C$. Значит, $M$ строго трехместна.

**Общий случай** $n \geq 3$**.** Обобщить «большинство» на любое $n$ не удается: при четном $n$ голоса могут разделиться поровну. Возьмем вместо этого конструкцию из решения упражнения 2 с самой простой формулой $G$, зависящей от всех $A_2, \ldots, A_n$: $G = A_2 \cap \cdots \cap A_n$, тогда $G^* = A_2 \cup \cdots \cup A_n$ и

$$F_n = (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \cdots \cup A_n)\big) \qquad (4)$$

— «точка лежит в $A_1$ и во всех остальных множествах, либо не лежит в $A_1$, но лежит хотя бы в одном из остальных». При $n = 3$ это $\mathrm{maj}(\overline{A}, B, C)$.

Самодвойственность (4) обеспечена конструкцией; проверим ее и прямым вычислением, как в книге. Обозначим $P = A_2 \cap \cdots \cap A_n$, $U = A_2 \cup \cdots \cup A_n$; заметим, что $P \subset U$. Формальная замена символов дает $F_n^* = (A_1 \cup U) \cap (\overline{A_1} \cup P)$. Раскроем скобки:

$$F_n^* \equiv (A_1 \cap \overline{A_1}) \cup (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) \cup (U \cap P).$$

Первое слагаемое пусто, последнее равно $P$ (так как $P \subset U$). Но $P \equiv (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap P)$ (склеивание), а $\overline{A_1} \cap P \subset \overline{A_1} \cap U$; значит, слагаемое $P$ целиком содержится в двух средних и его можно отбросить: $F_n^* \equiv (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) = F_n$.

Существенная зависимость. От $A_1$: положим $A_2 = I$, $A_3 = \cdots = A_n = \varnothing$ (это возможно, потому что при $n \geq 3$ есть аргумент $A_3$); тогда $P = \varnothing$, $U = I$ и $F_n = \overline{A_1}$. От $A_j$, $j \geq 2$: положим $A_1 = I$ и все остальные аргументы, кроме $A_j$, равными $I$; тогда $\overline{A_1} = \varnothing$, $P = A_j$ и $F_n = A_j$. При $n = 2$ подставить $A_3 = \varnothing$ нельзя, и формула (4) вырождается: $(A_1 \cap A_2) \cup (\overline{A_1} \cap A_2) \equiv A_2$ — в согласии со сказанным выше.

При нечетном $n = 2m + 1$ годится и «большинство»: множество точек, лежащих не менее чем в $m+1$ из множеств $A_1, \ldots, A_n$. Оно самодвойственно: после дополнения всех множеств условие становится «лежит не менее чем в $m + 1$ дополнениях», т. е. «лежит не более чем в $m$ множествах» — дополнение исходного. И оно зависит от каждого $A_j$: если $m$ из остальных множеств положить равными $I$, а оставшиеся $m$ — равными $\varnothing$, то «большинство» превращается в $A_j$.

**Проверка подсчетом.** Самодвойственная формула, не зависящая существенно от некоторого $A_j$, тождественно равна формуле $\Phi$ от остальных $n - 1$ аргументов, и $\Phi$ тоже самодвойственна (дополнить все аргументы $\Phi$ — то же, что дополнить все аргументы $F$: от $A_j$ результат не зависит). Поэтому нестрогих самодвойственных формул не больше $n\,\mu(n-1)$, где $\mu(m) = 2^{2^{m-1}}$ — число самодвойственных формул от $m$ аргументов (решение упражнения 2). А $\mu(n) = \mu(n-1)^2$. При $n = 3$: $\mu(3) = 16 > 3\mu(2) = 12$; при $n = 4$: $256 > 4 \cdot 16 = 64$; вообще $\mu(n) > n\,\mu(n-1)$ равносильно $\mu(n-1) = 2^{2^{n-2}} > n$, что верно при всех $n \geq 3$ (так как $2^{n-2} \geq n - 1$ и $2^{n-1} > n$ при $n \geq 3$). Так что при $n \geq 3$ строго $n$-местные самодвойственные формулы обязаны существовать. При $n = 2$ оценка дает $2\mu(1) = 4 = \mu(2)$ — запаса нет, и перебор подтверждает, что их действительно нет.

**Ответ.** Строго $n$-местные самодвойственные формулы существуют при $n = 1$ и при всех $n \geq 3$; единственное исключение — $n = 2$. Пример при $n \geq 3$: $F_n = (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \cdots \cup A_n)\big)$; при нечетном $n$ также «большинство» из $n$ множеств, обобщающее (1.6); при $n = 1$ — $A$.

## Решение упражнения 5 (§ 3)

**Что считается.** Формул, записанных через $A_1, \ldots, A_n$, бесконечно много: $A_1$, $A_1 \cap A_1$, $A_1 \cap A_1 \cap A_1$, … — но это записи одного и того же множества. Считаются формулы с точностью до тождественного равенства. Таких конечное число: по решению упражнения 1 формула определяется своей таблицей $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ (точка лежит в $F$ тогда и только тогда, когда $f$ от ее кода равна 1), и две формулы тождественно равны ровно тогда, когда их таблицы совпадают. Таблиц $2^{2^n}$, а самодвойственные среди них — те, у которых $f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha)$ при всех $\alpha$. Заметим еще, что «$n$-местная» формула не обязана зависеть от всех своих аргументов: $A_1$, запи-

санная среди букв $A_1, \ldots, A_n$, — законная $n$-местная формула.

**Пробы.** $\mu(1) = 2$ ($A$ и $\overline{A}$), $\mu(2) = 4$ ($A$, $B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$ — решение упражнения 1), $\mu(3) = 16$ (решение упражнения 2). Видно, что $\mu$ быстро растет.

**Монотонность без вычислений.** Пусть $F(A_1, \ldots, A_n)$ самодвойственна. Будем рассматривать ее как формулу от $n+1$ аргументов $A_1, \ldots, A_n, A_{n+1}$, не содержащую последнего. Она остается самодвойственной: условие $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$ от $A_{n+1}$ не зависит, и дополнение лишнего аргумента ни на что не влияет. Разные $n$-местные формулы остаются разными: если $F \neq G$ при некотором выборе $A_1, \ldots, A_n$, то при том же выборе и любом $A_{n+1}$ они по-прежнему различны. Значит, самодвойственные $n$-местные формулы вкладываются в самодвойственные $(n+1)$-местные, и $\mu(n) \leq \mu(n+1)$.

**Точное значение.** Условие $f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha)$ связывает значения таблицы на наборах $\alpha$ и $\bar{\alpha}$. Ни один набор не противоположен самому себе ($\alpha = \bar{\alpha}$ потребовало бы $\alpha_1 = 1 - \alpha_1$), поэтому $2^n$ наборов разбиваются на $2^{n-1}$ пар, и в каждой паре нужно выбрать, на каком из двух наборов стоит 1 — два варианта, независимо от других пар. Всего

$\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$ :

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mu(n)$ | 2 | 4 | 16 | 256 | 65 536 | 4 294 967 296 |

Поскольку $2^n = 2 \cdot 2^{n-1}$, имеем $\mu(n+1) = 2^{2^n} = \left(2^{2^{n-1}}\right)^2 = \mu(n)^2$: при переходе к следующему $n$ число самодвойственных формул возводится в квадрат (вдвое больше пар — вдвое больше независимых двоичных выборов). Для сравнения: всех $n$-местных формул $2^{2^n} = \mu(n)^2$, т. е. самодвойственных формул от $n$ аргументов столько же, сколько всех формул от $n-1$ аргумента.

**Ответ.** $\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$, поэтому $\mu(n+1) = \mu(n)^2 > \mu(n)$: функция $\mu$ не убывает и даже строго возрастает. Само неравенство $\mu(n) \leq \mu(n+1)$ видно и без подсчета: самодвойственная формула от $n$ аргументов остается самодвойственной, если считать ее формулой от $n+1$ аргументов.

### Решение упражнения 6 (§ 3)

**Что известно.** Строго $n$-местная формула — это формула, существенно зависящая от каждого аргумента (решение упражнения 4: если $F$ не зависит от $A_j$, ее можно записать без $A_j$, подставив

$A_j = \varnothing$, и наоборот). Самодвойственность равносильна условию $f(\bar{\alpha}) = 1 - f(\alpha)$ на таблицу (решение упражнения 1), и самодвойственных формул от $m$ аргументов $\mu(m) = 2^{2^{m-1}}$ (решение упражнения 5).

**Почему $\tau(2) = 0$.** При $n = 2$ свободно выбираются лишь $a = f(00)$ и $b = f(01)$, а $f(11) = 1 - a$, $f(10) = 1 - b$. Четыре варианта дают таблицы формул $A$ ($a = b = 0$: значения $0, 0, 1, 1$ в порядке $00, 01, 10, 11$, т. е. $f = \alpha_1$), $B$ ($a = 0$, $b = 1$), $\overline{B}$ ($a = 1$, $b = 0$), $\overline{A}$ ($a = b = 1$). Каждая зависит от одного аргумента, поэтому $\tau(2) = 0$.

**При остальных $n$ нуля нет.** $\tau(1) \geq 1$: формула $A$ самодвойственна и не является константой. $\tau(n) \geq 1$ при $n \geq 3$: формула $F_n = (A_1 \cap \dots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \dots \cup A_n)\big)$ самодвойственна и зависит от каждого аргумента (решение упражнения 4: при $A_2 = I$, $A_3 = \dots = A_n = \varnothing$ она равна $\overline{A_1}$, а при $A_1 = I$ и всех остальных, кроме $A_j$, равных $I$, — равна $A_j$). Значит, среди $n \geq 1$ равенство $\tau(n) = 0$ выполняется только при $n = 2$. Найдем $\tau(n)$ точно — тогда станет видно, сколько таких формул.

**Точная формула.** Пересчитаем самодвойственные $n$-местные формулы по множеству их существенных аргументов. У каждой формулы $F$ есть вполне определенное множество $S \subset \{1, \dots, n\}$ аргументов, от которых она существенно зависит. Подставив $\varnothing$ вместо всех остальных аргументов (по одному; после каждой подстановки формула тождественно равна прежней и по-прежнему не зависит от оставшихся несущественных аргументов), получим формулу $\Phi$ от аргументов $A_i$, $i \in S$, тождественно равную $F$. Она зависит от каждого своего аргумента (потому что $F$ зависит), т. е. строго $|S|$-местна, и самодвойственна: дополнить все аргументы $\Phi$ — то же, что дополнить все аргументы $F$, а это дополняет результат. Обратно, пара «подмножество $S$ из $k$ элементов + строго $k$-местная самодвойственная формула $\Phi$ от $A_i$, $i \in S$» дает самодвойственную $n$-местную формулу с множеством существенных аргументов $S$; разные пары дают разные формулы (разные множества существенных аргументов или разные таблицы). Поэтому

$$\mu(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \tau(k), \qquad \text{т. е.} \qquad \tau(n) = \mu(n) - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \tau(k).$$

Здесь $\tau(0) = 0$: формулы от нуля аргументов — $\varnothing$ и $I$, и ни одна не самодвойственна ($\varnothing^* = I$). Вычисляем:

$$\begin{aligned}
\tau(1) &= 2 - 0 = 2,\\
\tau(2) &= 4 - \tbinom{2}{1}\cdot 2 - 0 = 0,\\
\tau(3) &= 16 - \tbinom{3}{2}\cdot 0 - \tbinom{3}{1}\cdot 2 = 10,\\
\tau(4) &= 256 - \tbinom{4}{3}\cdot 10 - \tbinom{4}{2}\cdot 0 - \tbinom{4}{1}\cdot 2 = 208,\\
\tau(5) &= 65\,536 - 5\cdot 208 - 10\cdot 10 - 10\cdot 0 - 5\cdot 2 = 64\,386.
\end{aligned}$$

При $n = 3$ десять формул — восемь «большинств» и две «четности» (решение упражнения 2). Все пять значений подтверждены полным перебором (файл `artifacts/checks/boolean_tables.py`). **Почему исключение именно $n = 2$.** Нестрогих самодвойственных формул не больше $n\,\mu(n{-}1)$ (решение упражнения 4), а $\mu(n) = \mu(n-1)^2$. Отношение $\mu(n)/\bigl(n\,\mu(n-1)\bigr) = \mu(n-1)/n = 2^{2^{n-2}}/n$ при $n \geq 3$ больше единицы и быстро растет — строго $n$-местные формулы неизбежны и составляют почти все самодвойственные ($\tau(4)/\mu(4) = 208/256$, $\tau(5)/\mu(5) \approx 0{,}98$). При $n = 2$ это отношение равно $\mu(1)/2 = 1$: запаса нет, и все четыре места заняты одноместными формулами.

**Ответ.** $\tau(2) = 0$, так как все четыре самодвойственные двухместные формулы $A$, $\overline{A}$, $B$, $\overline{B}$ одноместны. Ни при каком другом $n \geq 1$ $\tau(n)$ не обращается в нуль: $\tau(1) = 2$, а при $n \geq 3$ пример дает $F_n$. Точные значения: $\tau(n) = \mu(n) - \sum_{k<n} \binom{n}{k}\tau(k)$, т. е. $\tau = 2,\ 0,\ 10,\ 208,\ 64\,386,\ldots$ при $n = 1,\ldots,5$.

## Решение упражнения 7 (§ 3)

**Что измеряет $\lambda$.** Множества $A_1,\ldots,A_n$ делят $I$ на $2^n$ конституент $K_\alpha = A_1^{\alpha_1}\cap\cdots\cap A_n^{\alpha_n}$, по одной на каждый набор ответов «лежит ли точка в $A_i$». Любая формула — объединение некоторых из них: $F = \bigcup_{\alpha:\, f(\alpha)=1} K_\alpha$, где $f$ — таблица формулы (решение упражнения 1). Число $\lambda(F)$ — количество областей, из которых состоит $F$, т. е. число единиц в таблице. Считаем области на полной диаграмме Эйлера, где все $2^n$ областей присутствуют: $\lambda$ — характеристика формулы, а не конкретного чертежа.
**Пробы.** При $n = 2$ (области $K_{00}, K_{01}, K_{10}, K_{11}$): $\lambda(A \cap B) = 1$, а $\lambda(A \cup B) = 3$; $\lambda(A) = 2 = \lambda(A^*)$; $\lambda(\varnothing) = 0$, а $\lambda(I) = 4$. Каждый раз $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 4 = 2^2$. Выпишем все 16 двухместных формул

(таблица — значения $f(00), f(01), f(10), f(11)$; двойственная найдена по правилу $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar{\alpha})$, см. ниже):

| $f$ | $F$ | $F^*$ | $\lambda$ | $\lambda^*$ | $f$ | $F$ | $F^*$ | $\lambda$ | $\lambda^*$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | $\varnothing$ | $I$ | 0 | 4 | 1000 | $\overline{A} \cap \overline{B}$ | $\overline{A} \cup \overline{B}$ | 1 | 3 |
| 0001 | $A \cap B$ | $A \cup B$ | 1 | 3 | 1001 | $\overline{A \triangle B}$ | $A \triangle B$ | 2 | 2 |
| 0010 | $A \cap \overline{B}$ | $A \cup \overline{B}$ | 1 | 3 | 1010 | $\overline{B}$ | $\overline{B}$ | 2 | 2 |
| 0011 | $A$ | $A$ | 2 | 2 | 1011 | $A \cup \overline{B}$ | $A \cap \overline{B}$ | 3 | 1 |
| 0100 | $\overline{A} \cap B$ | $\overline{A} \cup B$ | 1 | 3 | 1100 | $\overline{A}$ | $\overline{A}$ | 2 | 2 |
| 0101 | $B$ | $B$ | 2 | 2 | 1101 | $\overline{A} \cup B$ | $\overline{A} \cap B$ | 3 | 1 |
| 0110 | $A \triangle B$ | $\overline{A \triangle B}$ | 2 | 2 | 1110 | $\overline{A} \cup \overline{B}$ | $\overline{A} \cap \overline{B}$ | 3 | 1 |
| 0111 | $A \cup B$ | $A \cap B$ | 3 | 1 | 1111 | $I$ | $\varnothing$ | 4 | 0 |

Сумма $\lambda + \lambda^*$ во всех строках равна 4, а равенство $\lambda = \lambda^*$ выполняется ровно в шести строках, где $\lambda = 2$.

**Почему всегда $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n$.** По лемме (L) из решения упражнения 1 $F^* \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}$, а дополнение всех аргументов заменяет код каждой точки противоположным; поэтому $f^*(\alpha) = 1 - f(\bar{\alpha})$. Значит, $f^*(\alpha) = 1$ ровно тогда, когда $f(\bar{\alpha}) = 0$: области формулы $F^*$ — это наборы, противоположные наборам, не вошедшим в $F$. Отображение $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ — взаимно однозначная перестановка всех $2^n$ наборов, оно не меняет количества:

$$\lambda(F^*) = \#\{\alpha : \ f(\bar{\alpha}) = 0\} = \#\{\beta : \ f(\beta) = 0\} = 2^n - \lambda(F).$$

Геометрически: $F^*$ — центрально-симметричное (на кубе наборов) отражение дополнения $\overline{F}$; у дополнения областей $2^n - \lambda(F)$.

**Описание класса.** Из $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n$ следует, что $\lambda(F) = \lambda(F^*)$ равносильно $\lambda(F) = 2^{n-1}$: формула занимает ровно половину диаграммы Эйлера. Назовем такие формулы *уравновешенными*. Равносильно, $\lambda(F) = \lambda(\overline{F})$ — формула и ее дополнение состоят из одинакового числа областей. Любое множество из $2^{n-1}$ наборов задает уравновешенную формулу, и разные множества — разные формулы, так что уравновешенных формул $\binom{2^n}{2^{n-1}}$: при $n = 1 — 2$, при $n = 2 — 6$ ($A$, $B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \triangle B$, $\overline{A \triangle B}$), при $n = 3 — 70$, при $n = 4 — 12\,870$.

Как этот класс соотносится с классами из упражнений 2 и 3? Самодвойственная формула берет ровно одну область из каждой из $2^{n-1}$ пар $\{K_\alpha, K_{\bar{\alpha}}\}$, поэтому *все самодвойственные формулы уравновешены*. Четная формула ($F \cap F^* = \varnothing$) берет пары целиком, но каких угодно пар сколько угодно: $m$ пар дают $\lambda = 2m$, где

$0 \le m \le 2^{n-1}$; крайние случаи — $\varnothing$ и $I$. Поэтому *из четных формул уравновешены только составленные ровно из половины пар*, $m = 2^{n-2}$ (при $n \ge 2$): при $n = 2$ — $A \triangle B$ и $\overline{A \triangle B}$, но не $\varnothing$ и $I$. Наконец, уравновешенная формула может не быть ни той, ни другой. При $n = 3$ возьмем области 000, 111, 001, 010:

$$F = K_{000} \cup K_{111} \cup K_{001} \cup K_{010} = \overline{A \triangle (B \cap C)}$$

(точки, у которых признак принадлежности к $A$ совпадает с признаком принадлежности к $B \cap C$). Пара $\{000, 111\}$ взята целиком — не самодвойственна; пара $\{001, 110\}$ взята наполовину — не четна; но $\lambda(F) = 4 = \lambda(F^*)$. При $n = 3$ уравновешенных формул 70, из них самодвойственных 16, четных 6 и 48 — прочих (перебор в файле `artifacts/checks/boolean_tables.py`).

**Ответ.** Для любой формулы $\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n$. Поэтому $\lambda(F) = \lambda(F^*)$ в точности для формул, составленных из половины конституентных областей, $\lambda(F) = 2^{n-1}$ (равносильно, $\lambda(F) = \lambda(\overline{F})$). Таких формул $\binom{2^n}{2^{n-1}}$. В этот класс входят все самодвойственные формулы, из четных — только составленные ровно из половины пар противоположных областей, и, кроме того, много формул, не принадлежащих ни к тем, ни к другим.

# § 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций

## Условия

1. Пусть $x * y \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — некоторая ассоциативная операция, $h(x) \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — строго монотонная функция, $h^{-1}(x)$ — функция, обратная $h(x)$. Показать, что двухместная операция $\varphi(x, y) \equiv h^{-1}[h(x) * h(y)]$ ассоциативна.

2. Построить ассоциативную, но не коммутативную двухместную операцию $x * y \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

3. Пусть $h_t(x) = (1 - t)e^x + tx$, $h_t^{-1}(x)$ — обратная функция $h_t(x)$. Показать, что функция $\varphi_t(x, y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ коммутативна и ассоциативна при $0 \le t \le 1$, а $\varphi_0(x, y) \equiv x + y$, $\varphi_1(x, y) \equiv xy$.

4. Пусть $A$ — функциональное множество, $Q(A)$ — наименьшее замкнутое множество, такое, что $A \subset Q(A)$ ($Q(A)$ — замкнутая оболочка $A$). Показать, что $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$, где $H$ — полная по отношению к $A$ система функций из $A$. Показать, что при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ будет

$Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$.[4] Привести примеры.

5. Пусть $A_i$ $(i = 1, \ldots, m)$ — функциональные множества, $H_i \subset A_i$ — соответствующие им полные системы. Показать, что

$$\bigcup_{i=1}^{i=m} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{i=m} \mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}\Big(\bigcup_{i=1}^{i=m} H_i\Big).$$

6. Функция $\varphi(x_1, x_2)$ определяет ассоциативную двухместную операцию, если $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3)) \equiv \varphi(\varphi(x_1, x_2), x_3)$. Аналогично функция $\psi(x_1, x_2, x_3)$ определяет ассоциативную трехместную операцию, если

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)).$$

Привести пример трехместной ассоциативной операции, не прибегая к конструкции $\psi(x_1, x_2, x_3) \equiv \varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$, где $\varphi(x_1, x_2)$ — двухместная ассоциативная операция. Обобщить эти рассуждения для $n$-местных операций $(n > 3)$.

7. Построить базисы для множеств целых рациональных функций с целыми, рациональными и действительными коэффициентами.

## Решения

**Решение упражнения 1 (§ 4)**

Чтобы выражение $h^{-1}[h(x) * h(y)]$ имело смысл, нужно, чтобы $h(x) * h(y)$ лежало в области значений $h$; будем считать, что множество $h(\mathbb{R})$ замкнуто относительно $*$ (например, $h$ — биекция $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$). Строгая монотонность обеспечивает существование $h^{-1}$ на $h(\mathbb{R})$ и тождество $h(h^{-1}(u)) = u$. Тогда

$$\begin{aligned} \varphi(\varphi(x, y), z) &= h^{-1}\big[h\big(h^{-1}[h(x) * h(y)]\big) * h(z)\big] = \\ &= h^{-1}\big[(h(x) * h(y)) * h(z)\big], \\ \varphi(x, \varphi(y, z)) &= h^{-1}\big[h(x) * h\big(h^{-1}[h(y) * h(z)]\big)\big] = \\ &= h^{-1}\big[h(x) * (h(y) * h(z))\big], \end{aligned}$$

и правые части совпадают по ассоциативности $*$. (Это «перенос структуры»: $h$ — изоморфизм операции $\varphi$ на операцию $*$; так же переносится и коммутативность.)

*Замечание.* Все ассоциативные операции $\varphi_0$–$\varphi_3$ из текста парагра-

[4] *Исправлено:* в оригинале «при $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$ $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$» (пропущено связующее слово).

фа имеют такой вид:

- $\varphi_0$: $h(x) = \operatorname{arth}(x/c)$, $* = +$ (сложение «быстрот»; $\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th} a + \operatorname{th} b}{1+\operatorname{th} a \operatorname{th} b}$);
- $\varphi_1$ ($\alpha \neq 0$): $h(x) = 1 + \alpha x$, $* = \times$, так как $(1+\alpha x)(1+\alpha y) = 1 + \alpha(x + y + \alpha xy)$;
- $\varphi_2$ (на $x \geq 0$): $h(x) = x^2 + a^2$, $* = +$;
- $\varphi_3$: $h(x) = 1/x - \alpha$, $* = +$, так как $1/\varphi_3 = 1/x_1 + 1/x_2 - \alpha$.

**Решение упражнения 2 (§ 4)**

Простейший пример — левая проекция $x * y = x$: $(x * y) * z = x = x * (y * z)$, но $1 * 2 = 1 \neq 2 = 2 * 1$.
Менее тривиальный пример: $x * y = x\,|y|$. Ассоциативность: $(x * y) * z = x|y|\,|z|$, $x * (y * z) = x\,\big|y|z|\big| = x|y||z|$. Некоммутативность: $1*(-1) = 1$, $(-1)*1 = -1$. По упр. 1 из него получается целое семейство ассоциативных некоммутативных операций $h^{-1}[h(x)\,|h(y)|]$.

**Решение упражнения 3 (§ 4)**

При $0 \leq t \leq 1$ имеем $h_t'(x) = (1-t)e^x + t > 0$, так что $h_t$ строго возрастает. Область значений: при $t = 0$ это $(0, \infty)$, при $0 < t \leq 1$ — все $\mathbb{R}$ (при $x \to -\infty$ $h_t \sim tx \to -\infty$, при $x \to +\infty$ $h_t \to +\infty$). В обоих случаях она замкнута относительно умножения, поэтому по упр. 1 (с $* = \times$) операция $\varphi_t(x, y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ ассоциативна, а коммутативна, так как коммутативно умножение.
Крайние значения: $h_0 = e^x$, $h_0^{-1} = \ln$, $\varphi_0 = \ln(e^x e^y) = x + y$; $h_1(x) = x$, $\varphi_1 = xy$. Таким образом, семейство $\varphi_t$ непрерывно деформирует сложение в умножение, оставаясь в классе коммутативных ассоциативных операций.
При $0 < t < 1$ обратная функция выражается через функцию Ламберта $W$ ($we^w = s$): из $y = (1-t)e^x + tx$, полагая $x = y/t - w$, получаем $we^w = \frac{1-t}{t} e^{y/t}$, т. е.

$$h_t^{-1}(y) = \frac{y}{t} - W\Big(\frac{1-t}{t}\, e^{y/t}\Big).$$

**Решение упражнения 4 (§ 4)**

*Существование* $Q(A)$. Множество всех правильных отображений $\mathfrak{F}(\mathfrak{X})$ замкнуто и содержит $A$, а пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто (доказательство теоремы 1 дословно переносится на любое число множеств). Поэтому $Q(A)$ — пересече-

ние всех замкнутых множеств, содержащих $A$.
$\mathfrak{M}(H)$ *замкнуто.* Суперпозиции суперпозиций функций из $H$ сами являются суперпозициями функций из $H$: $\mathfrak{M}(\mathfrak{M}(H)) = \mathfrak{M}(H)$ (пункты а)–г) определения применяются к уже построенным суперпозициям).
*Равенство* $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$ *при* $H \subset A$, $A \subset \mathfrak{M}(H)$. (1) $\mathfrak{M}(H)$ замкнуто и содержит $A$, значит, $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$. (2) $H \subset A \subset Q(A)$ и $Q(A)$ замкнуто, значит, $\mathfrak{M}(H) \subset Q(A)$.
*Случай* $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$ (система полна по отношению к $A$, но содержит функции не из $A$). Рассуждение (1) остается в силе: $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$; рассуждение (2) — нет, и включение может быть строгим.
*Примеры.* $A = C^R$ (полиномы), $H = H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a\}$: $H \subset A$, $Q(C^R) = \mathfrak{M}(H_0) = C^R$ (множество $C^R$ само замкнуто). $A = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2\} \cup \mathbb{R}$ (константы): $Q(A) = C^R$ — замкнутая оболочка конечного набора операций может быть гораздо шире самого набора. $A = C^R$, $H = H_0 \cup \{\sin x\}$: $H \cap \overline{A} = \{\sin x\}$, и $Q(A) = C^R \subsetneq \mathfrak{M}(H) \ni \sin x$.

## Решение упражнения 5 (§ 4)

Первое включение — определение полноты: $A_i \subset \mathfrak{M}(H_i)$ для каждого $i$. Второе следует из монотонности операции $\mathfrak{M}$: если $H' \subset H''$, то всякая суперпозиция функций из $H'$ есть суперпозиция функций из $H''$, т. е. $\mathfrak{M}(H') \subset \mathfrak{M}(H'')$; применяем это к $H_i \subset \bigcup_j H_j$.
Включения, вообще, строгие: при $H_1 = \{x_1 + x_2\}$, $H_2 = \{x_1x_2\}$ функция $x_1x_2 + x_3$ принадлежит $\mathfrak{M}(H_1 \cup H_2)$, но не принадлежит $\mathfrak{M}(H_1) \cup \mathfrak{M}(H_2)$.

## Решение упражнения 6 (§ 4)

*Пример.* $\psi(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 + x_3$ на $\mathbb{R}$. Все три способа расстановки дают одно и то же:

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) = \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) = \\ = \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)) = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5.$$

(В любой группе аналогично $\psi = x_1x_2^{-1}x_3$; это «груда» Прюфера и Бэра.)
*Эта операция не имеет вида* $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$ *с ассоциативной* $\varphi$. Допустим противное: $\varphi(x, \varphi(y, z)) = \varphi(\varphi(x, y), z) = x - y + z$. Пусть

$R$ — множество значений $\varphi$. Если $u = \varphi(y, z) \in R$, то $\varphi(x, u) = x+(z-y)$ при всех $x$; значит, $\varphi(x, u) = x+k(u)$ для $u \in R$ (величина $k(u) = z-y$ определена однозначно). Аналогично $\varphi(v, z) = z+m(v)$ для $v \in R$. При $u, v \in R$ отсюда $v + k(u) = \varphi(v, u) = u + m(v)$, т. е. $u - k(u) = v - m(v) = c$ — постоянная, и $\varphi(x, u) = x + u - c$ при $u \in R$. Тогда $x - y + z = \varphi(x, \varphi(y, z)) = x + \varphi(y, z) - c$, т. е. $\varphi(y, z) = z - y + c$ при всех $y, z$; следовательно, $R = \mathbb{R}$ и одновременно $\varphi(x, u) = x + u - c$ и $\varphi(x, u) = u - x + c$ при всех $x, u$, что невозможно. Противоречие.

*Обобщение на $n$-местные операции.* Операция $\psi$ от $n$ аргументов *ассоциативна*, если при подстановке $\psi$ в любое из $n$ мест получается одна и та же функция $2n - 1$ аргументов:

$$\begin{aligned}\psi(\psi(x_1, \dots, x_n), x_{n+1}, \dots, x_{2n-1}) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, \dots, x_{n+1}), \dots, x_{2n-1}) \equiv \dots \\ \dots \equiv \psi(x_1, \dots, x_{n-1}, \psi(x_n, \dots, x_{2n-1})).\end{aligned}$$

Тривиальные примеры дают «итерации» двухместной ассоциативной операции, $\psi = x_1 * x_2 * \dots * x_n$. Нетривиальные: пусть $\zeta$ — корень степени $n - 1$ из единицы ($\zeta^{n-1} = 1$). Тогда

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \zeta x_2 + \zeta^2 x_3 + \dots + \zeta^{n-1} x_n$$

ассоциативна: при подстановке внутреннего $\psi$ на $k$-е место его $j$-й аргумент получает множитель $\zeta^{k-1}\zeta^{j-1} = \zeta^{(k+j-1)-1}$ — ровно тот, что положен месту $k + j - 1$, а аргументы, сдвинувшиеся на $n - 1$ мест вправо, сохраняют множитель, так как $\zeta^{n-1} = 1$. В действительных числах можно взять $\zeta = -1$ при нечетном $n$: $\psi = x_1 - x_2 + x_3 - \dots + x_n$ (при $n = 3$ — пример выше). Вообще, если $h$ — биекция, то $h^{-1}[\psi(h(x_1), \dots, h(x_n))]$ снова ассоциативна (как в упр. 1). Систематически $n$-местные ассоциативные операции изучаются в теории $n$-арных групп (Дёрнте, 1928; Пост, 1940).

**Решение упражнения 7 (§ 4)**

Функции из базиса должны принадлежать самому множеству $\mathfrak{M}_0$, а для проверки того, что система $H$ — базис, достаточно убедиться, что она полна и что после удаления *любого одного* элемента полнота теряется. Заметим главное: при суперпозиции полиномов коэффициенты результата лежат в кольце, порожденном (сложением и умножением) коэффициентами исходных полиномов.

**Целые коэффициенты** ($\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$):

$$H = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\}.$$

Полнота: $1 = (-1)(-1)$, $0 = 1 + (-1)$, $n = 1 + \dots + 1$, $-n = (-1)\,n$; далее одночлены — произведениями, многочлены — суммами. Минимальность: без $-1$ нет ни одной константы (из $x_1 + x_2$ и $x_1x_2$ без констант получаются только многочлены с неотрицательными коэффициентами без свободного члена); без $x_1x_2$ получаются лишь функции вида $c + \sum n_i x_i$ степени $\le 1$; без $x_1 + x_2$ — лишь одночлены $\pm x_1^{k_1} \cdots x_s^{k_s}$ и константы $\pm 1$.

**Рациональные коэффициенты** ($\mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots]$):

$$H = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\} \cup \{1/p :\ p \text{ простое}\}.$$

Полнота: кольцо, порожденное $-1$ и всеми $1/p$, есть $\mathbb{Q}$ ($1/q$ для составного $q$ — произведение $1/p$). Минимальность: без $1/p$ все коэффициенты лежат в кольце $\mathbb{Z}[1/q :\ q \ne p]$, где у знаменателей нет множителя $p$, так что $1/p$ не получить; без $-1$ все коэффициенты неотрицательны; без $x_1x_2$ или $x_1 + x_2$ — как выше. *Конечного* базиса здесь нет: у конечной системы конечное число коэффициентов, их знаменатели делят некоторое $N$, и все суперпозиции имеют коэффициенты из $\mathbb{Z}[1/N] \ne \mathbb{Q}$.

**Действительные коэффициенты** ($C^R$). Система $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ полна (пример 1), но базисом в смысле определения не является: отдельные константы избыточны (например, $2 = 1 + 1$). Если, как в обозначении $H_0$ книги, считать семейство всех констант одним элементом системы, то $H_0$ — базис: без сложения, без умножения или без констант полноты нет (рассуждения те же, что выше). Если же требовать неизбыточности поэлементно, то по замечанию о коэффициентах базис вида $\{x_1 + x_2,\ x_1x_2\} \cup C$ существует тогда и только тогда, когда у кольца $\mathbb{R}$ есть неизбыточная система образующих $C$ (такая, что ни одно $c \in C$ не выражается через остальные с помощью сложения и умножения). Для $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ такие системы указаны выше ($\{-1\}$ и $\{-1\} \cup \{1/p\}$); для $\mathbb{R}$ этот теоретико-кольцевой вопрос выходит за рамки книги, и мы оставляем его открытым (в предисловии автор предупреждает, что часть задач носит проблемный характер).

# Приложение А

# Замечания

## Замечания к исходным рабочим заметкам

Решения упражнений §3 основаны на заметках из каталога `notes/claude/` (файлы `p21-*.md`); в этом документе они переписаны так, чтобы каждое решение было самостоятельным: решение упражнения 1 содержит полные доказательства леммы (L) и свойств таблиц истинности, остальные решения напоминают нужные факты со ссылкой на него. По сравнению с заметками исправлено следующее.

- В разминочной таблице заметки к упр. 2 формула $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$ отмечена как самодвойственная («обе $\equiv \overline{A} \cup B$»). Это неверно: $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* = (A \cup B) \cap \overline{A} \equiv \overline{A} \cap B$ (что правильно вычислено ниже в той же заметке при проверке леммы (L)). В книге эта пара приведена лишь как пример *двойственных* формул.

- В заметке к упр. 3 сказано, что для произвольной формулы «ни из $F \cap F^* = \varnothing$ не следует $F \cup F^* = I$, ни наоборот». На самом деле эти условия равносильны для любой формулы (оба равносильны четности); замечание удалено.

- Универсальное множество в примере $\{0,1\}^n$ обозначено $U$, чтобы не путать его с константой $I$.

Все численные утверждения решений проверены программами из каталога `exercises/artifacts/checks/` (результаты — в файле `RESULTS.txt`).