
# Графики тестируемых функций

Автор: Юрий Кондратов, Бураханова Алена, Казарян Михаил

### 1. Гладкая функция


$$1 + x + y - xy + x^2 + y^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-1, -1)	0





$$1 + 7x + 5y + 0.5xy + 3x^2 + y^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-0.978723, -2.255319)	-8.06383




$$100 + 7x + 5y - 10xy + 3x^2 + 10y^2$$





$$100 + 7x + 5y - 10.95xy + 3x^2 + 10y^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-1997.435897, -1093.846154)	-9625.64102564




$$1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-0.25, -0.25, -0.25)	0.625

#### 6. Гладкая функция

$$10x^4 + 15y^4 + 15xy$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-0.582109, 0.525995)	-2.2964
	(0.582109, -0.525995)	-2.2964
Седловая точка	(0,0)	0





$$10x^6 + 15y^6 - 20(x^3y + xy^3)$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-1.08789, -1.00318)	-15.9327
	(1.08789, 1.00318)	-15.9327
Седловая точка	(0,0)	0



$$x^6 + y^6 - 2(x^3y + xy^3) + x^2 + y^2$$


Глобальный минимум: (x, y) = (-1, -1); (0, 0); (1, 1)

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-1, -1)	0
	(0,0)	0
	(1, 1)	0
Седловая точка	(-0.57735, -0.57735)	0.296297
	(0.57735, 0.57735)	0.296297




$$x^6 + y^6 - 3(x^3y + xy^3) + x^2 + y^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-1.34777, -1.34777)	-4.17732
	(1.34777, 1.34777)	-4.17732
Локальный минимум	(0,0)	0
Седловая точка	(-0.428373, -0.428373)	0.1777324
	(0.428373, 0.428373)	0.1777324




$$x^6 + y^6 - 2(x^3y + xy^3) + x^4 + y^4 - x^2 - y^2$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-1, -1)	-2
	(1, 1)	-2
Локальный минимум	(-0.39332, 0.39332)	-0.158403
	(0.39332, -0.39332)	-0.158403
Локальный максимум	(0,0)	0
Седловая точка	(-0.498104, 0.20241)	-0.15221
	(-0.20241, 0.498104)	-0.15221
	(0.20241, -0.498104)	-0.15221
	(0.498104, -0.20241)	-0.15221



11. Гладкая функция (функция Химмельбау) 
$$f(x,y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(3, 2)	0
	(-2.80518, 3.131312)	0
	(-3.779310, -3.283186)	0
	(3.584428, -1.848126)	0
Локальный максимум	(-0.2708456 - 0.923039)	181.617
Седловая точка	(-3.07303, -0.081353)	104.015
	(-0.127961, -1.95371)	178.337
	(0.0866775, 2.88425)	67.7192
	(3.38515, 0.0738519)	13.3119





$$f(x) = \sum_{k=1}^{4} \left[ \sum_{i=1}^{4} x_i^k - b_k \right]^2$$

, где  $b_k = [8, 18, 44, 114]$ 


Глобальный минимум: x = [1, 2, 2, 3]


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 2, 2, 3)	0


### 13. Гладкая функция (функция Бранина)

$$f(x,y) = \left(y - \frac{5.1}{4\pi^2}x^2 + \frac{5}{\pi}x - 6\right)^2 + 10\left(1 - \frac{1}{8\pi}\right)\cos x + 10$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	$(-\pi, 12.275)$	0.397887
	$(\pi, 2.275)$	0.397887
	(9.42478, 2.475)	0.397887








# 14. Гладкая функция (функция МакКормика) $f(x,y) = \sin(x+y) + (x-y)^2 - 1.5x + 2.5y + 1$

Глобальный минимум: (x, y) = (-0.547198, -1.5472)

Локальный минимум:  $(x, y) = (\pi k - 0.547198, \pi k - 1.5472)$ 


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-0.547198, -1.5472)	-1.913223
Седловая точка	$(\pi k - 0.547198, \pi k - 1.5472)$	$\pi k - \sin\left(\frac{2\pi}{3} - 2\pi k\right) - \frac{\pi}{3}$



# 15. Гладкая функция (функция Матиаса)

$$f(x,y) = 0.26(x^2 + y^2) - 0.48xy$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0)	0



16. Гладкая функция (функция Кин)

0.0

0.5


1.0

-0.5

-1.0

$$-\frac{\sin^2(x_1-x_2)\sin^2(x_1+x_2)}{\sqrt{x_1^2+x_2^2}}$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0, 1.39325)	-0.673668



# 17. Гладкая функция (функция Шмидта-Веттерса)


$$\frac{1}{1 + (x_1 - x_2)^2} + \sin\left(\frac{\pi x_2 + x_3}{2}\right) + e^{\left(\frac{x_1 + x_2}{x_2} - 2\right)^2}$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0.78547, 0.78547, 0.78547)	3

# 18. Гладкая функция (функция Зеттла)

$$\frac{1}{4}x_1 + (x_1^2 - 2x_1 + x_2^2)^2$$


	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-0.029896,0)	-0.003791
Седловая точка	(1.96715,0)	0.495963
Локальный максимум	(1.06275, 0)	1.25783



# 19. Гладкая функция(функция Биля)

$$(x_1x_2 - x_1 + 1.5)^2 + (x_1x_2^2 - x_1 + 2.25)^2 + (x_1x_2^3 - x_1 + 2.625)^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(3, 0.5)	0
Седловая точка	(0.100538, -2.64451)	9.86451
	(0,1)	14.2031




20. Гладкая функция (функция Колвилля): 
$$(x_1-1)^2+100(x_1^2-x_2)^2+10.1(x_2-1)^2+(x_3-1)^2+90(x_3^2-x_4)^2+10.1(x_4-1)^2\\+19.8\frac{x_4-1}{x_2};\;-10\leq x_i\leq 10$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 1, 1, 1)	0

$$(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 1)	0




22. Гладкая функция

$$(x_2 - x_1^2)^2 + 100(1 - x_1)^2$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 1)	0






23. Гладкая функция

$$100(x_2 - x_1^3)^2 + (1 - x_1)^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 1)	0
	<del></del>	



24. Гладкая функция

$$(x_1 + 10x_2)^2 + 5(x_3 - x_4)^2 + (x_2 - 2x_3)^4 + 10(x_1 - x_4)^4$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0,0,0)	0


$$(x_1^2 - x_2 + 1)^4 + 100(x_2 - x_3)^6 + tg^4(x_3 - x_4) + x_1^8 + (x_4 - 1)^2$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0, 1, 1, 1)	0

#### 26. Гладкая функция (сферическая)

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0,,0)	0






### 27. Гладкая функция (функция Нестерова Чебышева-Розенброка 1)

$$f(x) = \frac{1}{4}(x_1 - 1)^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - 2x_i^2 + 1)^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 1, 1,, 1)	0




# 28. Гладкая функция (функция Розенброка)

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \left( 100 \left( x_i^2 - x_{i+1} \right)^2 + (x_i - 1)^2 \right)$$

Глобальный минимум:  $x = [1, 1, 1, \dots, 1]^T$ 

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(1, 1, 1,, 1)	0




29. Гладкая функция(функция Бохачевского):

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[ x_i^2 + 2x_{i+1}^2 - 0.3\cos(3\pi x_i) - 0.4\cos(4\pi x_{i+1}) + 0.7 \right]$$


	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0,0,,0)	0

Эта функция имеет множество локальных минимумов.



30. Гладкая функция:


$$x_1^2 + 10^6 \sum_{i=2}^n x_i^2$$




# 31. Гладкая функция (Голдштейна-Прайса):

$$[1 + (x + y + 1)^{2}(19 - 14x + 3x^{2} - 14y + 6xy + 3y^{2})][30 + (2x - 3y)^{2}(18 - 32x + 12x^{2} + 48y - 36xy + 27y^{2})]$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,-1)	3
Локальный минимум	$\left(-\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right)$	30
,	$(\frac{6}{5}, \frac{4}{5})$	840
	$(\frac{9}{5}, \frac{1}{5})$	84
Локальный максимум	$(\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$	1155






#### 32. Негладкая функция (Букин06):

$$100\sqrt{|y - 0.01x^2|} + 0.01|x + 10|$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(-10,1)	0





# 33. Гладкая функция (Cosine Mixture):

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 0.1 \sum_{i=1}^{n} \cos(5\pi x_i)$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0)	0.2 (n=2)
Глобальный минимум	(0,0,0,0)	0.4 (n=4)


Эта функция имеет множество локальных минимумов.





# 34. Гладкая функция (Bukin02):


$$100(y - 0.01x^2 + 1)^2 + 0.01(x + 10)^2$$




# 35. Негладкая функция (BartelsConn):

$$|x^2 + y^2 + xy| + |sinx| + |cosy|$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0)	1







### 36. Гладкая функция (Price04):

$$(2x^3y - y^3)^2 + (6x - y^2 + y)^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	(0,0)	0
	(2,4)	0
	(1.464, -2.506)	0







# 37. Гладкая функция Three Hump Camel:

$$2x_1^2 - 1.05x_1^4 + \frac{x_1^6}{6} + x_1x_2 + x_2^2$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[0,0]	0

# 3D plot:







# 38. Гладкая функция Six Hump Camel:

$$4x_1^2 + x_1x_2 - 4x_2^2 - 2.1x_1^4 + 4x_2^4 + \frac{1}{3}x_1^6$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[0.898 , -0.712 ]	-1.03162845348

# 3D plot:







# 39. Гладкая функция Branin01:

$$\left(-1.275\frac{x_1^2}{\pi^2} + 5\frac{x_1}{\pi} + x_2 - 6\right)^2 + \left(10 - \frac{5}{4\pi}\right)cos(x_1) + 10$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	$[-\pi, 12.275]$	0.3978







### 40. Гладкая функция Branin02:

$$\left(-1.275\frac{x_1^2}{\pi^2} + 5\frac{x_1}{\pi} + x_2 - 6\right)^2 + \left(10 - \frac{5}{4\pi}\right)cos(x_1)cos(x_2) + \log(x_1^2 + x_2^2 + 1) + 10$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[-3.2,12.53]	5.559037



#### Contour plot:




# 41. RotatedEllipse01:


$$f(x,y) = 7x^2 - 6 \cdot \sqrt{3} xy + 13y^2$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[0,0]	0

### 3D plot:



#### Contour plot:




# 42. Гладкая функция Egg Crate:

$$x_1^2 + x_2^2 + 25[\sin^2(x_1) + \sin^2(x_2)]$$


	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[0,0]	0

Эта функция имеет большое количество локальных экстремумов

# 3D plot:



# Contour plot:




# 43. Гладкая функция RotatedEllipse02:


$$f(x,y) = x^2 - xy + y^2$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[0,0]	0

#### 3D plot:




#### Contour plot:



## 44. Гладкая функция Bird:

$$f(x,y) = (x-y)^2 + e^{(1-\sin(x))^2}\cos(y) + e^{(1-\cos(y))^2}\sin(x)$$

	$(\bar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальный минимум	[4.70105575, 3.15294602]	-106.76453672
Глобальный минимум	[-1.58214217, -3.13024680]	-106.76453672




### 45. Гладкая функция Hosaki:


$$f(x,y) = \left(1 - 8x + 7x^2 - \frac{7x^3}{3} + \frac{x^4}{4}\right)y^2e^{-y^2}$$

	$(ar{x})$	$f(\bar{x})$
Глобальные минимумы	$[4,\pm 1]$	-1.59414410
Локальные минимумы	$[1,\pm 1]$	-0.76641550

### 3D plot:



### Contour plot:




# 46. Гладкая функция El-Attar-Vidyasagar-Dutta:


$$f(x,y) = (x^2 + y - 10)^2 + (x + y^2 - 7)^2 + (x^2 + y^3 - 1)^2$$

	(x,y)	f(x,y)
Глобальный минимум	(3.40919, -2.17143)	1.71278
Локальный минимум	(-3.62315, -2.38415)	26.9754
Локальный минимум	(-1.52071, 1.41228)	99.0206
Локальный минимум	(2.27617, 0.864777)	54.7511

#### 3D plot:



#### Contour plot:



#### Источники:

- 1. <a href="http://www.optimization-online.org/DB">http://www.optimization-online.org/DB</a> FILE/2011/02/2923.pdf
- 2. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Test functions for optimization">https://en.wikipedia.org/wiki/Test functions for optimization</a>
- 3. <a href="http://www.geatbx.com/docu/fcnindex-01.html">http://www.geatbx.com/docu/fcnindex-01.html</a>
- 4. <a href="http://infinity77.net/global\_optimization/test\_functions.html">http://infinity77.net/global\_optimization/test\_functions.html</a>
- 5. 'Applied nonlinear programming', David M. Himmelblau, 1972.