

ANÁLISIS FUNCIONAL, GRADO EN MATEMÁTICAS

Cuarto curso, 12/11/2014

1. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado real.
 - (a) Si A y B son dos subconjuntos de E . ¿Qué significa que A y B se puedan separar en E ?
 - (b) Probar que si A y B son dos subconjuntos no vacíos y disjuntos de E , tales que, además, A es compacto y B es cerrado, entonces existe algún $\varepsilon > 0$, tal que $((A + B(0; \varepsilon)) \cap (B + B(0; \varepsilon))) = \emptyset$.
 - (c) Si A y B son dos subconjuntos de E , convexos, no vacíos y disjuntos, tales que, además A es compacto y B cerrado, pruébese que A y B se pueden separar de manera estricta (se puede usar el primer teorema de separación probado en clase).
2. Si $(E, \|\cdot\|)$ y $(F, \|\cdot\|)$ son espacios normados y $L : E \rightarrow F$ es una aplicación lineal, decídase razonadamente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
 - (a) Si la dimensión de E es finita, entonces L es continua.
 - (b) Si la dimensión de F es finita, entonces L es continua.
3. Decídase, razonadamente, cuáles de las siguientes aplicaciones lineales son continuas:
 - (a) $L : X = C([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \rightarrow \int_a^b f(x) dx - f(a)$, cuando en X se considera la norma uniforme.
 - (b) $L : X = C([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \rightarrow \int_a^b f(x) dx - f(a)$, cuando en X se considera la norma de $L^1(a, b)$.
 - (c) $L : P_n(x_1, x_2) \rightarrow P_{n-1}(x_1, x_2)$, $L(P) = \frac{\partial P}{\partial x_1}$, $\forall P \in P_n(x_1, x_2)$.
 $P_m(x_1, x_2)$ indica el espacio vectorial normado de polinomios de grado menor o igual a m , en las variables $(x_1, x_2) \in [0, 1]^2$, con la norma uniforme.