1. Resolver el sistema

$$AX - B^T = \frac{1}{2}A^2$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -8 & 6 \end{bmatrix}$$

2. Determine X e Y de 2×2 tales que

$$X + AY^T = B$$
$$X^T + YC = D$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Demuestre que $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 + \alpha \\ 1 - \alpha & -\alpha \end{bmatrix}$$

es invertible y $A^{-1} = A$

4. Demostrar que \mathbb{R}^2 con las siguientes operaciones no es un espacio vectorial sobre \mathbb{R}

$$(x,y) + (z,u) = (3y + 3u, -x - z)$$

 $c(x,y) = (3cy, -cx)$