

Цель работы

Решить задачу о погоне


Задание

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 19,1 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 5,2 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

Теоретическое введение

1. Принимаем за t_0 , $x_{л0}$ - место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{к0} = k$ - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения.
2. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров $x_{л0}$ ($\theta = x_{л0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой




охраны

3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.
4. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k-x$ или $k+x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса. Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как x/v или $k-x/2v$ (во втором случае $x+k/2v$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения: $\frac{x}{v} = \frac{k-x}{2v}$ в первом случае или

$$\frac{x}{v} = \frac{k+x}{2v} \text{ во втором}$$

Отсюда найдём два значения $x_1 = \frac{k}{3}$ и $x_2 = k$, задача решается для двух случаев

5. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и v_τ - тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем, что $\frac{dr}{dt} = v$. Тангенциальная скорость - это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $v_\tau = r \frac{d\theta}{dt}$.



Из рисунка видно, что $v_\tau = \sqrt{4v^2 - v^2} = \sqrt{3}v$. Тогда получаем, что $r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{3}v$

6. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений
- $$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{3}v \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\theta_0 = 0 \quad r_0 = x_1$$

или

$$\theta_0 = -\pi \quad r_0 = x_2$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению: $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{3}}$ Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, вы получите траекторию движения катера в полярных координатах.

Выполнение работы

Открыв Pluto.jl, я начал писать код. Сначала я подключил библиотеки Plots и DiffetentialEquations:

```
using Plots
using DiffetentialEquations
```

Далее я ввёл данные, приведённые в условии задачи:

```
const k = 19.1 # Расстояние между лодкой и катером, когда туман развеялся
const vel_diff = 5.2 # Разница скоростей
```

и посчитал начальные точки и задал начальные углы для двух случаев:

```
x_firstInst = k/(vel_diff + 1) # Начальная точка первого случая
x_secondInst = k/(vel_diff - 1) # Начальная точка второго случая
teta01 = 0
teta02 = π
```

Далее написал функцию, являющуюся дифф. уравнением, необходимым для нахождения траектории:

```
function ode_fn(du, u, p, t) # Дифференциальное уравнение для вычисления
траектории катера
    r, teta = u
    du[1] = 1
    du[2] = sqrt(vel_diff^2 - 1) / du[1]
end

dt = 0.01 # Изменение времени
tspan = (0, 5) # Продолжительность
```

Далее с помощью ODEProblem передал в функцию ode_fn начальные значения и границы и с помощью solve решил её для шага dt:

```
prob1 = ODEProblem(ode_fn, [x_firstInst, teta01], tspan) # Задание начальных
условий в дифф. уравнение для первого случая

sol = solve(prob1, dtmax = dt) # Решение дифф. уравнения
```

После я передал массивы значений R1 и Θ_1 , полученные с помощью solve:

```
R1 = [u[1] for u in sol.u] # Изменение расстояния от центра
θ1 = [u[2] for u in sol.u] # Изменение угла поворота относительно центра
```


И задал траекторию движения лодки:

```
boat_r = Float64[0, 8]
boat_θ = Float64[2 * π/3]
```

После этого я инициализировал полярную систему координат:

```
plt1 = plot( # Полярная система координат
    proj = :polar,
    aspect_ratio = :equal,
    dpi = 300,
    title = "Задача о погоне",
    legend = false
)
```

Задача о погоне



После этого я добавляю на неё траектории катера и лодки:


```
plot!( # Отрисовка траектории катера для первого случая
    plt1,
    θ1,
    R1,
```

```

    label = "Траектория катера",
    color = :green
  )
  plot!( # Добавление траектории лодки
    plt1,
    boat_θ,
    boat_r,
    label = "Траектория лодки",
    color = :red
  )


```

Задача о погоне



Выполнив аналогичные команды для второго случая получил следующую траекторию:

Задача о погоне



Вывод

Задача выполнена, траектории движения катера и лодки построены