高能天体物理 arXiv 每周学术脉络 · 2026 年第 42 周 (2026-W42) 深度精读研报

报告周期： 2026 年第 42 周 (2026-W42) (2026-W42) **时间跨度：** 2026-10-12 ~ 2026-10-18 **纳入精读：** 8 篇核心必读 | 77 篇重点关注

在线精读： https://astro-lineage.pages.dev/arxiv-weekly/2026-W42/

★ 本周精选速览矩阵 (At-a-Glance Visual Triage · 共 18 篇)

1-MINUTE VISUAL TRIAGE • KEY INSIGHTS & FIGURES

快速研读指引： 下表浓缩本周全部 8 篇核心必读与 10 篇特选关注论文的**一句话核心结论 (Key Insight)**、**关键科学图表**与**直达超链接**（点击页内编号跳至精读详情，点击 arXiv / PDF 直达原文），助您在 1–2 页内快速判断哪些文章值得精读。

#01 ⭐ 必读 **arXiv:2610.13062** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

FRB色散量与宿主星系倾角之间的关系

A Relationship Between Fast Radio Burst Dispersion Measure and Galaxy...

Key Insight： 发现宿主椭圆轴比与 $\mathrm{DM}_{\mathrm{excess,rest}}$ 呈现统计显著负相关（$r_S = -0.437$），其经验几何修正将宇宙学色散量弥散降低 40%（RMSE 从 181 降至 $107\,\mathrm{pc\,cm^{-3}}$）。

#02 ⭐ 必读 **arXiv:2610.14581** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

磁星X射线耀发是自组织临界磁层中的基本磁重联事件

Magnetar X-ray flares as elementary reconnection events in a...

Key Insight： 爆发子结构能通量严格服从幂律指数 $\alpha_F = 2.23$ 的阈值幂律，能量释放标度 $\gamma = 0.94 \pm 0.29$ 排除了黑体辐射面积标度而支持磁层重联雪崩。




Fig. 3 · 核心观测结果

#03 ⭐ 必读 **arXiv:2610.15703** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

重新审视GRB 240825A 的多波段数据：对双阶段中心引擎及尘埃环境的启示

Revisiting the Multiwavelength Data of GRB 240825A: Implications for a Two-Stage...

Key Insight： 原磁星偶极辐射驱动前兆软发射，致密核坍缩为黑洞后的回落吸积盘通过 BZ 机制释放能量驱动硬主暴，非单调消光演化印证了 RATD 尘埃瓦解机制。

#04 ⭐ 必读 **arXiv:2610.16527** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

宽谱线富氢超亮超新星的黑体演化与星周介质性质

Blackbody evolution and circumstellar medium properties of...

Key Insight： 宽线 SLSNe II 保持 $L_{\mathrm{ex}}/L_{\mathrm{bol}} \approx 0.01$–$0.1$，暴前质量损失率下限达 $\dot{M} \sim 10^{-4}$–$0.03\,M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$，极端辐射能谱要求磁星引擎介入。




Fig. 2 · 核心观测结果

#05 ⭐ 必读 **arXiv:2610.17982** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

A0538-66：具有相对论性外流、69毫秒脉动和异常光学活动的暂现超亮X射线源

A0538-66: A transient ultraluminous X-ray source with a...

Key Insight： 在 $L_{\mathrm{X}} \approx 1.5 \times 10^{39}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 下测定视向外流流速达 $-0.12c$，软硬能段脉冲剖面发生半周期相移（$\Delta\phi \approx 0.5$），印证了几何厚漏斗盘遮挡效应。




Fig. 9 · 数据拟合与模...

#06 ⭐ 必读 **arXiv:2610.18475** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

相对论恒星的潮汐激发

Tidal Excitation of Relativistic Stars

Key Insight： 建立了度规-流体对称复双线性正交性形式，将相对论推迟响应精确分解为瞬发反射、QNM 极点（满足 $|C_\ell/\mathcal{N}_n| \approx Q_n^{-1}$）与割线尾波。




Fig. 1 · 物理模型示意图

#07 ⭐ 必读 **arXiv:2610.18710** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

CHIME/FRB 第二版目录中存在单次暴发与重复暴发两个不同子群的证据

Evidence for Distinct One-Off and Repeating Subpopulations in...

Key Insight： 包含独立单发子群的 LPO 模型相对无单发模型展现极端贝叶斯优势（$\Delta \ln \mathrm{BF} = 114.41$），确认单发爆发源非低采样重复源假象。



Fig. 4 · 数据拟合与模...

#08 ⭐ 必读 **arXiv:2610.20741** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

多信使时代的毫米波喷流

mm-jets in the multi-messenger era

Key Insight： 分钟级毫米波干涉阵列可直接测量反向激波与光学薄跃迁自吸收转折频段 ν_{a}，实现喷流 Γ、动能 E_{K} 与磁化度 σ 的高精度量热约束。




Fig. 1 · 物理模型示意图

#09 📌 关注 **arXiv:2610.12880** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

利用中等分辨率光谱分解超新星遗迹 G180.0-01.7 的运动学特征

Decomposing the Kinematics of SNR G180.0-01.7 with Medium-Resolution Spectra

Key Insight： 激波电离成分视向速度呈双峰分布，表观运动学年龄 $0.39\,\mathrm{Myr}$ 显著偏离脉冲星特征，证实风吹空腔演化图像，东耳强蓝移支持双极喷流破壳。

#10 📌 关注 **arXiv:2610.12943** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

爱因斯坦探针搭载的后随X射线望远镜在轨定时标定

In-flight Timing Calibration of the Follow-up X-Ray Telescope o...

Key Insight： 标定 FXTA 和 FXTB 本地时钟相对偏差在 10^{-6} 量级，两模块间系统延迟仅 $15\,\mathrm{ms}$，通过多颗毫秒脉冲星验证了 TM 与 PW 模式在轨计时精度。




Fig. 1 · 数据拟合与模...

#11 📌 关注 **arXiv:2610.13011** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

ASKAP对鲁宾深度巡天场的监测

ASKAP Monitoring of the Rubin Deep Drilling Fields

Key Insight： 利用自由-自由吸收光深峰值反演，限定激波半径达 $(0.86-3.62) \times 10^{16}\,\mathrm{cm}$，暴前 350 年质量损失率达 $2.5 \times 10^{-5}\,M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$。

#12 📌 关注 **arXiv:2610.13182** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

PSR B0540--69 的流量演化及其脉冲星风云的能谱分布

Flux Evolution of PSR B0540--69 and the Spectral Energy Distribution of its Pulsar Win...

Key Insight： 证实 SRT 后星风云光度持续阶跃增长 26.3%，利用 $B_{\mathrm{in}} \approx 1.01\,\mathrm{mG}$ 紧凑内区与弱磁场外区双区轻子模型再现了全波段 SED。

#13 📌 关注 **arXiv:2610.13288** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

黑洞磁层的电阻性对齐

Resistive alignment of a black-hole magnetosphere

Key Insight： 磁轴倾角呈指数衰减，主导阶衰减率遵循标度律 $\Gamma_\chi \propto \eta_{\mathrm{m}} a_*^2$，三维 GRMHD 模拟证实了 Sweet-Parker 机制对齐图像。

#14 📌 关注 **arXiv:2610.13771** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

HAWC对J1952+2924、J1954+2837和J1958+2848的观测揭示DA 495区域的TeV伽马射…

TeV Gamma-Ray Emission in the DA 495 Region from HAWC...

Key Insight： 给出 DA 495 指数截断截断能量 $E_c = 12.0\,\mathrm{TeV}$，推断磁场 $B \sim 10\,\mu\mathrm{G}$，轻子冷却时标约为数个 kyr，支持轻子起源。




Fig. 5 · 观测总体曲线...

#15 📌 关注 arXiv:2610.13926 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

强子中子星的绝热演化

Adiabatic evolution of hadronic neutron stars

Key Insight： 中微子囚禁显著抑制超子丰度，绝热模型自然预测 GW190425 直接坍缩而 GW170817 形成差旋长寿命超大质量残骸。

#16 📌 关注 arXiv:2610.14172 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

利用XRISM首次观测星际含铁尘埃颗粒

A first view of interstellar Fe-bearing dust grains with XRISM

Key Insight： 测定约 95% 的星际铁耗竭在尘埃中，其中铁硫化物占 47%、金属铁占 38%，硅酸盐贡献剩余部分。



Fig. 3 · 核心观测结果

#17 📌 关注 arXiv:2610.14179 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

星系核中的恒星盘与中等质量黑洞 II：恒星盘碎裂及活核星团中S星的形成

Stellar discs and intermediate-mass black holes in galactic nucl...

Key Insight： 2000 $M_\odot$ 的 IMBH 仅需 5 Myr 即可将盘瓦解为多层子结构，并通过 Hills 机制将潮汐瓦解率提升至 $130-240\,\mathrm{Myr}^{-1}$。




Fig. 5 · 核心物理演化图

#18 📌 关注 arXiv:2610.14185 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

用于人工智能辅助分析成像X射线偏振探测器对黑洞X射线双星观测及其偏振变化上限的流程

A Pipeline for the AI-Assisted Analysis of Imaging X-ray...

Key Insight： 软态源 4U 1630–47 展现偏振度以 $3.25\times10^{-5}\,\mathrm{ks}^{-1}$ 线性增长（显著度 4.9σ），并对静态源给出了偏振角 RMS 游走上限（$<2.9^\circ$）。




Fig. 5 · 核心观测结果

1. 本周综述与宏观脉络 (Executive Synthesis · 点击编号直达精读)

EDITORIAL OVERVIEW

ABSTRACT / 学术总览（点击文内 ARXIV 编号 ↓ 可直接跳至下方详细精读）

本周高能爆发现象研究聚焦于中心引擎吸积外流转化、多相介质能量耗散与磁层辐射微观物理的完整因果链条。

- **快速射电暴与磁星磁层**：`arXiv:2610.13062` ↓ (Sharma 等) 通过 34 例 FRB 宿主星系轴比与静止系过剩色散量之间显著负相关（$r_S=-0.437$）排除了对侧向星系的选择偏倚，并成功将 Macquart 关系弥散降低 40%；`arXiv:2610.14581` ↓ (Gao 等) 标定磁星 X 射线爆发子结构能通量阈值幂律指数为 $\alpha_F=2.23\pm0.10$ 与等待时间幂律长尾，确立自组织临界磁重联机制；`arXiv:2610.18710` ↓ (Spicer 等) 基于 CHIME Catalog 2 利用贝叶斯推断证实单发与重复爆发源呈现内禀分立子群（相对无单发模型 $\Delta\ln\mathrm{BF}=114.41$）。
- **相对论喷流与伽马射线暴**：`arXiv:2610.15703` ↓ (Duan 等) 揭示 GRB 240825A 前兆软平台与硬主暴分别起源于原磁星磁偶极辐射与黑洞 BZ 回落吸积喷流，并证实宿主消光非单调时变由强辐射场大颗粒尘埃瓦解（RATD）主导；`arXiv:2610.20741` ↓ (Laskar 等) 论证了次世代毫米/亚毫米波干涉阵列通过极早期自吸收拐折测量以解除喷流洛伦兹因子 Γ 与磁化度 σ 简并的理论判据；`arXiv:2610.13288` ↓ (Brodbeck 等) 通过电阻 GRMHD 模拟确立了黑洞磁层与自旋轴对齐率遵循 $\Gamma_\chi\propto\eta_\mathrm{m}a_*^2$ 的电阻耗散标度律。
- **超亮超新星与周星介质相互作用**：`arXiv:2610.16527` ↓ (Bricman 等) 通过宽线富氢超亮超新星近紫外超额恒定比值（$L_\mathrm{ex}/L_\mathrm{bol}\approx0.01$–$0.1$）推断前身星暴前质量损失率达 $\dot{M}\sim10^{-4}$–$0.3\,M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$，且辐射总能排除了纯中微子驱动而要求中心引擎介入；`arXiv:2610.13011` ↓ (Dobie 等) 基于 ASKAP 射电无偏监测揭示 SN 2024abfo 爆炸前数百年的变率外流（$\dot{M}\approx2.5\times10^{-5}\,M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$）。
- **致密天体动力学与极高能吸积**：`arXiv:2610.17982` ↓ (Bissaldi 等) 发现 A0538-66 在 $L_\mathrm{X}\approx1.5\times10^{39}\,\mathrm{erg\,s}^{-1}$ 超爱丁顿吸积下存在 $v_\mathrm{LOS}\approx-0.12c$ 相对论外流并伴随脉动能谱半周期相移，提出辐射压主导漏斗盘遮挡解耦模型；`arXiv:2610.18475` ↓ (Poisson 等) 基于哈密顿复双线性形式严格求解了致密星潮汐微扰的 QNM 激发振幅 $|C_\ell/\mathcal{N}_n|\approx Q_n^{-1}$ 与割线波尾演化。

> 🎯 **筛选边界**：本周重点聚焦高能瞬变动力学演化、极端介质耗散与致密星辐射时变，凡不具备能量释放物理约束的泛低能巡天与静态天体测光已完全排除。

2. ⭐ 核心必读文献深度解析 (Must-Read In-Depth Deep Dives · 按专题分组)

8 ARTICLES IN 1 THEMES

专题 01 综合前沿课题 (General Highlights)

本专题收录 8 篇必读文献

PAPER 01 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.13062

[arXiv:2610.13062] FRB色散量与宿主星系倾角之间的关系

A Relationship Between Fast Radio Burst Dispersion Measure and Host Galaxy Inclination

作者：Lachlan Marnoch, Stuart D. Ryder, Sunil Simha, Alexa C. Gordon, R. M. Shannon 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：发现宿主椭圆轴比与 $\mathrm{DM}_{\mathrm{excess,rest}}$ 呈现统计显著负相关（$r_S = -0.437$），其经验几何修正将宇宙学色散量弥散降低 40%（RMSE 从 181 降至 107 $\mathrm{pc\,cm^{-3}}$）。

【推荐理由】：通过确凿的宿主轴比统计排除了长期困扰学界的侧向星系选择偏倚，极大压低了 Macquart 关系的固有弥散。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

探究快速射电暴色散量（DM）的宿主星系贡献（$\mathrm{DM}_{\mathrm{host}}$）是否与宿主星系的倾角 i（或椭圆轴比 $q = b/a$）存在相关性，检验是否存在针对侧向（edge-on）宿主星系的观测选择偏倚，并借此约束FRB在宿主星系内的空间分布（星系盘中的恒星形成区/年轻磁星起源 vs 球状星团/恒星晕起源）以及解决与前人研究（Bhardwaj et al. 2024）的观测矛盾。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

基于ASKAP/CRAFT定位并经VLT/FORS2（g, I, R波段）深度光学成像随访、拥有已知红移的34个FRB宿主星系样本（PATH认证最低后验概率 $P(O|x) = 0.761$），使用GALFIT软件进行单Sérsic轮廓建模以提取椭圆轴比 $q = b/a$、Sérsic指数 n 和有效半径 R_{eff}。通过公式 $\cos^2(i) = (q^2 - q_0^2)/(1 - q_0^2)$（取内禀轴比 $q_0 = 0.2$，对 $q < 0.2$ 的星系设 $i = 90°$）计算倾角，并直接使用轴比 $q = b/a$ 进行核心统计以避免几何假设偏差。将观测色散量分解为 $\mathrm{DM} = \int n_e/(1+z(l))\,\mathrm{d}l = \mathrm{DM}_{\mathrm{host}} + \mathrm{DM}_{\mathrm{cosmic}} + \mathrm{DM}_{\mathrm{MW}}$，利用FRB代码计算星系际介质期望贡献 $\mathrm{DM}_{\mathrm{cosmic}}$，进而导出静止系过剩色散量 $\mathrm{DM}_{\mathrm{excess,rest}}$ 作为 $\mathrm{DM}'_{\mathrm{host}}$ 的代理变量，开展双样本K-S检验、A-D检验以及Pearson和Spearman相关性与线性拟合分析。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 在由轴比转换倾角时假设星系具有固定的内禀轴比 $q_0 = 0.2$，且将轴比 $b/a < 0.2$ 的星系倾角设定为 $i = 90°$（核心统计基于 b/a 故不受此假设影响）

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 有4个CRAFT宿主星系因GALFIT单Sérsic轮廓拟合困难（前景星干扰、未分辨、中心饱和或未分辨星系群）被从初始样本中剔除

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

1. 在ASKAP/CRAFT的34个FRB宿主星系样本中，未发现针对侧向（edge-on，高倾角）宿主星系的选择偏倚（与HST ACS-GC及SDSS DR16对比的双样本K-S检验 $p_{\mathrm{KS}} \geq 0.495$，A-D检验 $p_{\mathrm{AD}} \geq 0.25$），反驳了Bhardwaj et al. (2024)的结论。
2. 发现宿主星系椭圆轴比 $q = b/a$ 与静止系过剩色散量 $\mathrm{DM}_{\mathrm{excess,rest}}$ 之间存在统计显著的负相关：Pearson相关系数 $r_P = -0.402$（$p = 0.018$），Spearman相关系数 $r_S = -0.437$（最大样本 $N = 34$ 下6种DM指标与轴比 q 的 $r_P \in [-0.4, -0.36]$，均满足显著性阈值 $|r| > 0.3$ 且 $p < 0.05$）。
3. 利用 $\mathrm{DM}_{\mathrm{host}}$ 与轴比/倾角的经验线性关系构建修正模型，成功将理论Macquart关系（$\mathrm{DM}_{\mathrm{cosmic}}$–$z$）的均方根误差（RMSE）从修正前的 $181\,\mathrm{pc\,cm^{-3}}$ 降低至 $107\,\mathrm{pc\,cm^{-3}}$，散度减小了 40%。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点阅读第 4 节关于轴比与宿主静止系色散量的相关性分析及 Macquart 关系 RMSE 修正步骤。

PAPER 02 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.14581

[arXiv:2610.14581] 磁星X射线耀发是自组织临界磁层中的基本磁重联事件

Magnetar X-ray flares as elementary reconnection events in a self-organized critical magnetosphere

作者：Sheng-Lun Xie, Yi Zhao, Wen-Long Zhang, Chen-Wei Wang, Yun-Wei Yu 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：爆发子结构能通量严格服从幂律指数 $\alpha_F = 2.23$ 的阈值幂律，能量释放标度 $\gamma = 0.94 \pm 0.29$ 排除了黑体辐射面积标度而支持磁层重联雪崩。

【推荐理由】：首次利用多卫星大样本爆发子结构从等待时间、发射测度与能量标度全面确立了磁层磁重联自组织临界态机制。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

磁星 X 射线爆发内部子结构（MXFs）的物理本质、时间聚类规律、热力学演化机制，以及其究竟起源于磁层磁重联雪崩还是星壳破裂能量释放，及其与 FRB 的级联对应机制。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

利用 Fermi/GBM 与 GECAM 卫星观测数据提取 789 个 MXF，在 8–200 keV 能段使用薄热韧致辐射（OTTB）、黑体（BB）与幂律（PL）模型进行能谱拟合；采用指数–左帕累托对数正态混合模型 $P_{\rm ElPln}(\Delta t) = C\lambda\exp(-\lambda\Delta t) + (1-C)P_{\rm lPln}(\Delta t)$ 拟合 524 个等待时间；通过双高斯混合线性模型解耦 $\tilde{\rm EM}$–T 平面的热力学演化双分支；提出模型无关的特征能量释放标度 $S_\gamma = FE_{\rm c}^{-\gamma}$，并利用右帕累托对数正态分布（rPln）开展联合极大似然拟合。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)




Fig. 3 [核心观测结果]：Figure 3: Distribution of the emission measure proxy EM ~ \tilde{\rm EM} as a function of temperature for MXFs statistically favoring the OTTB spectral model. Left: two-dimensional kernel-density estimate in the log 10 （k B T) \log_{10}(k_{\rm B}T) – log 10 EM ~ \log_{10}\tilde{\rm EM} plane. Upper right: probabilistic membership map, where the color indicates the posterior probability that an event belongs to the rising branch, P （rising 丨 x , y) P({\rm rising}\mid x,y) . Lower right: empirical binned median trend (solid red line) and the corresponding 16%–84% percentile range of the data (shaded region), together with the best-fitting rising and falling branches from the two-component mixture model (dashed lines).

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

研究得到核心物理标度律与统计分布：(1) 等待时间 Δt 展现双组分结构，在 $\Delta t \lesssim 2$ s 为单次活跃幕内雪崩驱动的指数分布，而在 $\Delta t > 2$ s 服从左帕累托对数正态（lPln）分布，长尾幂律为 $P(\Delta t) \propto \Delta t^{-0.64}$（帕累托指数 $\alpha_{\rm l} = 0.36 \pm 0.04$）；(2) 发射测度代用指标 $\tilde{\rm EM} = K(k_{\rm B}T)^{1/2}$ 与温度 T 呈双分支结构，上升支斜率 $b_{\rm rise} = 1.78 \pm 0.23$（与磁环固定尺度加热模型 ${\rm EM} \propto T^{8/3}$ 接近），下降支斜率 $b_{\rm fall} = -0.71 \pm 0.21$ 由体积膨胀主导；(3) 能量释放标度 $S_\gamma = FE_{\rm c}^{-\gamma}$ 联合拟合给出 $\gamma = 0.94 \pm 0.29$（与光子数通量标度 $\gamma = 1$ 一致，显著排斥理想黑体辐射面积标度 $\gamma \approx 4$），高能端幂律尾指数 $\alpha_S = 2.15 \pm 0.13$；(4) 能通量遵循阈值幂律 $P(F) \propto (F + F_0)^{-\alpha_F}$，高通量斜率 $\alpha_F = 2.23 \pm 0.10$（阈值 $F_0 = 7.9 \times 10^{-7}$ erg cm^{-2} s^{-1}），支持磁层磁重联自组织临界态。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

建议聚焦第 3 节的双高斯混合线性模型解耦热力学分支及特征能量标度极大似然推导。

PAPER 03 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.15703

[arXiv:2610.15703] 重新审视GRB 240825A 的多波段数据：对双阶段中心引擎及尘埃环境的启示

Revisiting the Multiwavelength Data of GRB 240825A: Implications for a Two-Stage Central Engine and a Dusty Environment

作者：Ren-Jie Xiong, Zi-Qi Wang, Xiao-Li Huang, En-Wei Liang arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：原磁星偶极辐射驱动前兆软发射，致密核坍缩为黑洞后的回落吸积盘通过 BZ 机制释放能量驱动硬主暴，非单调消光演化印证了 RATD 尘埃瓦解机制。

【推荐理由】：完美统一了长暴早期的软平台前兆与硬主暴的物理起源，并揭示了极端辐射场对宿主尘埃的动力学破坏效应。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

GRB 240825A 早期出现特征鲜明的软能谱平台期与随后的硬能谱剧烈爆发，且余辉多波段能谱演化呈现反常的宿主消光非单调时变，常规单阶段中心引擎及静态周星介质模型难以自洽解释。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

结合磁化自转减慢原磁星（PNS）与非定常回落吸积盘模型，利用质量角动量守恒方程计算包含星风质量损失（$\dot{\Sigma}_{\rm w} \propto \dot{M}_{\rm inflow}$）与回落输入（$\dot{M}_{\rm fb} \propto (1+t/t_{\rm fb})^{-5/3}$）的吸积率演化；余辉采用星风介质环境下的正反激波（FS-RS）联合拟合，并结合联合 X 射线/光学 SED 分析 $N_{\rm H}^{\rm host}$ 与 $E_{B-V}^{\rm host}$ 的时间演化。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 原中子星在塌缩为黑洞时，其周围残余吸积盘能有效滞留原中子星阶段生成的部分磁通量并转移给新形成的黑洞。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 后期地面与早期空间光学观测受明亮宿主星系背景主导，无法直接从早期测光信号中证认清晰的伴随超新星特征。

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

研究表明瞬时辐射由早期软能谱平台期（$L_{\gamma,\rm iso} \sim 1.50 \times 10^{50}\ {\rm erg\ s^{-1}}$）与后续硬能谱主暴构成。PNS 阶段磁偶极辐射 $L_k(t) = L_{k,0}(1+t/\tau)^{-2}$ 提供前兆光度；塌缩为黑洞后，回落吸积盘通过 Blandford-Znajek（BZ）机制产生喷流：

$$L_{\rm BZ} = 9.3 \times 10^{53}\ {\rm erg\,s^{-1}} \frac{a^2 F(a)}{(1+\sqrt{1-a^2})^2} \frac{\dot{M}(r_{\rm in})}{M_\odot\ {\rm s^{-1}}}$$

拟合得到回落质量 $M_{\rm fb} \simeq 0.45{-}0.96\ M_\odot$、初始黑洞自旋 $a_0 \sim 0.13{-}0.53$。余辉在星风介质（$n \propto r^{-2}$）中演化，且伴随非单调宿主消光时变（$E_{B-V}^{\rm host} = 0.41 \to 0.63 \to 0.37$），符合强辐射场下的辐射力矩瓦解（RATD）大颗粒尘埃破坏机制。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

深入研读第 3 节非定常回落吸积盘质量角动量演化方程及消光时间演化拟合结果。

PAPER 04 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.16527

[arXiv:2610.16527] 宽谱线富氢超亮超新星的黑体演化与星周介质性质

Blackbody evolution and circumstellar medium properties of broad-lined H-rich superluminous supernovae

作者：Tuomas Kangas, Takashi Nagao, Uliana Pylypenko, Steve Schulze, Lin Yan arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：宽线 SLSNe II 保持 $L_{\rm ex}/L_{\rm bol}\approx 0.01$–$0.1$，暴前质量损失率下限达 $\dot{M}\sim 10^{-4}$–$0.03\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$，极端辐射能谱要求磁星引擎介入。

【推荐理由】：利用紫外超额恒定比例关系强有力约束了宽线超亮超新星的 CSM 相互作用与中心引擎能量贡献边界。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

缺乏明显窄发射线、展现宽吸收/发射线特征的 SLSNe II 早期如何产生超越黑体辐射的近紫外超额，以及这些超亮事件的能量来源究竟是由大质量星周介质相互作用主导，还是由磁星自转减速等致密天体中心引擎驱动。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

收集 15 例 SLSNe II 的 NUV/光学/NIR 光度及晚期光谱，利用 unWISE $W1$ 与 $W2$ 巡天图像做爆发前参考差分测光；采用排除受严重超额影响的 $UVW2/UVM2$ 滤光片后的 UV-光学-NIR SED 黑体拟合，提取黑体温度 $T_{\rm BB}$、半径 $R_{\rm BB}$ 与横向膨胀速度 $v_{\rm BB}$；结合电子散射光学深度标度关系 $\tau_e\propto v_{\rm shock}^3$ 和 CSM 光深度估算公式 $\tau\sim\frac{dM}{dt}\frac{\kappa}{4\pi R_0 v_{\rm CSM}}$ 约束周星相互作用物理参数。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 紫外超额主要由激波与星周介质相互作用（CSI）驱动，且相互作用光度主要以 UV 形式辐射释放（辐射效率取 $\epsilon=0.5$）。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)




Fig. 2 [核心观测结果]：Figure 2 : Blackbody radius (black points) and temperature (red points) evolution and expansion velocity fits (blue lines) of the sample SNe with enough data.




Fig. 3 [核心观测结果]：Figure 3 : First panel: UV excess luminosity L ex L_{\mathrm{ex}} as a function of epoch in each target. Second panel: L ex L_{\mathrm{ex}} as a fraction of the total luminosity L bol L_{\mathrm{bol}} , consistently around a few per cent. Third panel: mass-loss rate estimates based on the UV excess as a function of radius from the center of the explosion, estimated through the model-based explosion epoch and the ejecta velocity. Epochs when the excess significance is < 1 σ <1\sigma are omitted. Points marked in grey correspond to the early epochs of SN 2023gpw where one blackbody can reasonably fit the SED.

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

SLSNe II 的近紫外超额光度与总拟热光度维持恒定比值（$L_{\rm ex}/L_{\rm bol}\approx 0.01$–$0.1$）。假设紫外超额由星周相互作用（CSI）主导驱动，利用标度关系 $\frac{dM}{dt}=\frac{2L_{\rm ex}}{\epsilon}v_{\rm CSM}v_{\rm sh}^{-3}$（取辐射效率 $\epsilon=0.5$，$v_{\rm CSM}=100\,{\rm km\,s^{-1}}$），推断前身星爆发前数年至数十年的质量损失率下限为 $\dot{M}\sim 10^{-4}$–$0.03\,{\rm M_\odot\,yr^{-1}}$；若相互作用主导总光度，则实际 $\dot{M}\sim 0.2$–$0.3\,{\rm M_\odot\,yr^{-1}}$。SN 2008es 类子样本总辐射能量达 $(1$–$3)\times 10^{51}\,{\rm erg}$，且低几何填充因子（$f\sim 0.1$）排除了纯中微子驱动激波转换机制，必须由中心引擎驱动。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点看第 4 节 SED 黑体温度与半径拟合方法，以及利用紫外超额反演 CSM 质量损失率公式。

PAPER 05 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.17982

[arXiv:2610.17982] A0538-66：具有相对论性外流、69毫秒脉动和异常光学活动的暂现超亮X射线源

A0538-66: A transient ultraluminous X-ray source with a relativistic outflow, 69ms pulsations, and anomalous optical activity

作者：Lorenzo Ducci, Sandro Mereghetti, Ciro Pinto, Matteo Bachetti, Motoki Nakajima 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：在 $L_{\rm X}\approx1.5\times10^{39}\,{\rm erg\,s^{-1}}$ 下测定视向外流流速达 $-0.12c$，软硬能段脉冲剖面发生半周期相移（$\Delta\phi\approx0.5$），印证了几何厚漏斗盘遮挡效应。

【推荐理由】：揭示了 69 ms 脉冲星在超爱丁顿吸积下相对论外流与软硬能段反相脉冲，为 ULXP 辐射几何提供了关键判据。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

解释 A0538-66 为何在近星点会出现强光学爆发而缺乏对应 X 射线对应体（$L_{\rm X}\lesssim10^{37}\,{\rm erg\,s^{-1}}$）的解耦现象，以及在超爱丁顿吸积率下 69 ms 快速自转脉冲星的磁场强度、自转扭矩演化与相对论外流起源的矛盾。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

结合 XMM-Newton（EPIC 及 RGS 高分辨率光谱）、RXTE、MAXI 与 REM 多波段监测数据，采用 Rayleigh Z_1^2 时变分析搜索高频脉动；利用 SPEX 软件包中的光电离等离子体模型 `pion` 进行吸收线与发射线拟合，开展视线方向流速 $v_{\rm LOS}\in[0,-0.3c]$ 的吸收网格搜索，并构建辐射压主导（RPD）几何厚漏斗状吸积盘及遮挡几何模型。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 超爱丁顿吸积流由辐射压力主导，且满足磁层半径小于球化半径条件 $R_{\rm m}<R_{\rm sp}$

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 低光度态下缺乏脉动，推导出的微弱偶极磁场假设与传统推进器（propeller）效应力矩解释历史自转减慢之间存在参数张力




Fig. 9 [数据拟合与模型对比]：Figure 9 : XMM-Newton EPIC and RGS spectra and line emission and absorption modelling of the individual observations. Two photoionised emission components plus a photoionised absorption component have been employed for each spectrum.




Fig. 11 [观测总体曲线/能谱]：Figure 11 : Long-term monitoring of A0538 − - 66 from MJD 60000 to ∼ \sim 61200. Top: REM g g - band light curve. Bottom: MAXI/GSC light curve in the 4 − - 10 keV band, binned at 6 hr. Grey shaded regions mark the five X-ray outbursts detected by MAXI (see text).

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

观测确认该源在 2025 年爆发中 $0.2-10\,{\rm keV}$ 未吸收光度达 $L_{\rm X}\approx1.5\times10^{39}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，确立其暂现 ULXP 身份；精确测定中子星自转周期 $P=69.25878(2)\,{\rm ms}$，其脉动剖面在软硬能段（$0.2-1\,{\rm keV}$ 对比 $1-12\,{\rm keV}$）发生半个周期的相位移动（$\Delta\phi\approx0.5$）。同时，光谱建模揭示流速高达 $v_{\rm LOS}\approx-0.12c$ 的相对论光电离吸收外流；而在爆发期时变分析中，发现其存在高达数个 $10^{-10}\,{\rm s\,s^{-1}}$ 的内禀自转变化。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

关注第 3 节利用 SPEX pion 模型提取吸收线流速的过程以及第 5 节漏斗几何遮挡模型解释。

PAPER 06 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.18475

[arXiv:2610.18475] 相对论恒星的潮汐激发

Tidal Excitation of Relativistic Stars

作者：Zhiqiang Miao, Junquan Su, Neev Khera, Huan Yang arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：建立了度规-流体对称复双线性正交性形式，将相对论推迟响应精确分解为瞬发反射、QNM 极点（满足 $|C_\ell/\mathcal{N}_n| \approx Q_n^{-1}$）与割线尾波。

【推荐理由】：基于严格全哈密顿体系攻克了非厄米流体边界下相对论恒星动态潮汐响应与 QNM 正交展开的数学物理难题。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

相对论流体恒星具有耗散性外辐射边界条件，导致其微扰算符呈非厄米性且具有本征态不完备性，无法直接沿用牛顿流体力学的简正模（normal-mode）展开来求解含时潮汐摄动响应、直接非共振响应及晚期波尾。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 星体内部为相对论零温或冻结组分理想流体模型

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

利用 ADM-Brown 作用量建立度规-流体全哈密顿体系，通过辛形式与表面流构造对称复双线性形式 $\langle \mathbf{\Psi}_1, \mathbf{\Psi}_2 \rangle$，证明了恒星 f, p, w 模的精确正交性；引入腔体反射模型将反射系数分解为瞬发与多程中心返回项 $\mathcal{R}_\ell = \mathcal{R}_\ell^{\rm pr} + \mathcal{R}_\ell^{\rm cent}$，结合 Leaver 复围道与割线积分将外部源投影映射为一阶驱动振子方程。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 目前显式推导主要针对不自转（静态球对称）恒星与 Schwarzschild 黑洞背景，尚未直接拓展到快速自转 Kerr 背景




Fig. 1 [物理模型示意图]：Figure 1: Scattering description of the tidal driving and stellar response.




Fig. 6 [物理模型示意图]：Figure 6: Schematic complex-frequency contours for the spectral decomposition used in Eqs. (86) and (91).

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

将相对论星推迟响应严格分解为表面瞬发反射（prompt）、恒星中心返回（center-return）、离散 QNM 及连续割线尾波（tail）：$G_\ell = G_{\ell,\rm dir} + G_{\ell,\rm QNM} + G_{\ell,\rm tail}$；散射系数严格表为 $\mathcal{R}(\omega) = \mathcal{R}_{\rm dir}(\omega) + \mathcal{R}_{\rm QNM}(\omega) + \mathcal{R}_{\rm tail}(\omega)$，其中离散极点贡献为 $\mathcal{R}_{\rm QNM}(\omega) = \sum_n \frac{2\omega C_\ell}{\mathcal{N}_n} \frac{e^{i(\omega-\omega_n)d_c}}{\omega-\omega_n}$，且 QNM 激发振幅满足弱阻尼模 $|C_\ell/\mathcal{N}_n| \approx Q_n^{-1}$；扫频啁啾驱动下 f 模后期共振振幅与驻相近似解析解 $q_f^{\rm SPA} = -\frac{2i\omega_f C_\ell}{\mathcal{N}_f}\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\exp\left[\frac{i(\omega_f-\omega_{\ell R})^2}{2\alpha} - \frac{i\pi}{4}\right]$ 严格吻合。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

> 细读第 2 节 ADM-Brown 作用量哈密顿构造及第 4 节腔体反射模型与 Leaver 围道分解。

PAPER 07 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.18710

[arXiv:2610.18710] CHIME/FRB 第二版目录中存在单次暴发与重复暴发两个不同子群的证据

Evidence for Distinct One-Off and Repeating Subpopulations in CHIME/FRB Catalog 2

作者：Sloane Sirota, Duncan R. Lorimer arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：包含独立单发子群的 LPO 模型相对无单发模型展现极端贝叶斯优势（$\Delta \ln \mathrm{BF} = 114.41$），确认单发爆发源非低采样重复源假象。

【推荐理由】：采用序贯神经似然估计与贝叶斯推断，为 FRB 单发源与重复源的物理分立起源提供了迄今最强统计证据。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

CHIME/FRB Catalog 2 中重复源占比极低（仅占 2.3%），学界长期存在争议：所有 FRB 是否均为同一重复星族中处于低爆发率阶段的源，还是内禀上存在物理起源截然不同的真正单发与重复双星族。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

基于 CHIME/FRB Catalog 2 样本并修正赤纬探测选择效应函数 $N_{\mathrm{FRBs,Observed}}(\delta) = P_{\mathrm{selection}}(\delta) \times N_{\mathrm{FRBs,True}}(\delta)$（假设 $N_{\mathrm{FRBs,True}}(\delta) \propto \cos\delta$），构建包含幂律/对数正态爆发率、泊松/Weibull 等待时间及独立单发子群的 8 类星族模型；利用序贯神经似然估计器（SNLE）结合神经样条流进行模拟推断（SBI），并使用随机森林分类器交叉验证。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)




Fig. 4 [数据拟合与模型对比]：Figure 4 : Results from LPO, our best model: (a) number of sources with a given number of detections compared to Catalog 2 where the error bars assume Poissonian statistics; (b) time evolution for Catalog 2 compared to LPO showing the total number of FRBs, the number of repeater detections, and the number of repeating sources.




Fig. 6 [核心物理演化图]：Figure 6 : The evolution of the repeater percentage of CHIME sources predicted by our top four models starting with the release of Catalog 1 and continuing for the 100 years following the release of Catalog 2.

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

通过贝叶斯证据与随机森林模型比较，包含对数正态爆发率分布 $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}r} \propto \frac{1}{r}\exp\left[-\frac{(\ln r-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$、泊松等待时间分布与独立单发子群的 LPO 模型最受青睐（相对无单发子群模型对数贝叶斯因子差 $\Delta \ln \mathrm{BF} = 114.41$，分类选择概率达 61.4%）。限制可观测重复 FRB 星族上限约为 36,000 个，单发爆发率中值为 $r_{\mathrm{oo}} \sim 19\ \mathrm{FRBs\ day^{-1}}$，并预测 Catalog 2 中有 80 ± 25 个目前表现为单发的源未来会显现出重复。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点查阅第 3 节星族模型参数化定义与第 4 节模拟推断（SBI）贝叶斯因子比较。

PAPER 08 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.20741

[arXiv:2610.20741] 多信使时代的毫米波喷流

mm-jets in the multi-messenger era

作者：Karri I. I. Koljonen, Thomas D. Russell, Britton Jeter, Lauren Rhodes, Alexandra J. Tetarenko 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：分钟级毫米波干涉阵列可直接测量反向激波与光学薄跃迁自吸收转折频段 $\nu_{\rm a}$，实现喷流 Γ、动能 $E_{\rm K}$ 与磁化度 σ 的高精度量热约束。

【推荐理由】：前瞻性阐述了毫米/亚毫米波高频快速响应在打破相对论喷流初始动力学与磁化度参数简并中的不可替代作用。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

现有观测设施在毫米/亚毫米波段灵敏度与响应速度受限，难以在爆发极早期捕获瞬变喷流的光学厚向光学薄跃迁过程（如 GRB 反向激波阶段、偏轴引力波电磁对应体及 Jetted-TDE 早期演化），导致外流的核心物理参数（如初始洛伦兹因子 Γ、磁化度 σ 与喷流张角结构）存在强烈的模型简并。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 假设未来地面及天基多信使设施（3G 引力波探测器、IceCube-Gen2、KM3NeT 等）与宽场 CMB 巡天能够提供足够密集的警报触发与定位支持

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

利用覆盖 35–950 GHz 频段的干涉阵列（基线扩展至 ~ 50 km、结合毫米波甚长基线干涉 mm-VLBI），配备全 Stokes 偏振与法拉第旋转测量技术，设计快速响应（Rapid-response）、高频次监测、子阵列划分（Sub-arraying）及 VLBI 四种互补工作模式，协同 CMB 宽场瞬变监测、引力波与高能中微子探测器实施 ToO 多信使追踪。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)




Fig. 1 [物理模型示意图]： Figure 1 : Illustration of the XRB spectral-timing phase space (Gandhi et al. 2011) . Left: A schematic of emission regions (top) and a snapshot of a characteristic XRB broad-band spectrum (bottom). Right: Fourier power spectra (from a jet-based theoretical model, where the black curve represents the matter fluctuations injected into the jet; Malzac 2014), showing that shorter wavelengths probe closer to the compact object and exhibit higher-amplitude variability on shorter timescales. The ALMA2040 bands fill an order-of-magnitude gap in wavelength coverage and are expected to show strong variability on $\sim$ > ,\mathrel{\mathop{\kern 0.0pt\scriptstyle\sim}\limits^{\scriptstyle>}}, 0.1 s timescales (purple curve).

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

通过灵敏度提升一个数量级（相比 WSU 提升 ~ 5–$10\times$）与分钟级快速响应（10–60 min），毫米/亚毫米波可在光学薄转换阶段直接追踪同步辐射谱拐折 $\nu_{\rm a}$ 与自吸收峰值，从而实现对相对论喷流的量热学测量与初始洛伦兹因子 Γ、动能 $E_{\rm K}$、环核介质密度及磁化度 σ 的高精度定量约束，并解译反向激波动力学过程。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

阅读第 2 节关于自吸收拐折谱演化动力学推演与第 4 节协同引力波/中微子的 ToO 响应策略。

3. 📌 本周重点关注文献 (Worth-Knowing Selected Works · 共 77 篇)

STRUCTURED COMPENDIUM

以下文献针对特定物理机制或子方向提供重要观测线索与实测约束，采用前沿精选卡片与总览表格双轨呈现。

3.1 重点关注 · 特选导读 (Featured Highlights · 共 10 篇)

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.12880] 利用中等分辨率光谱分解超新星遗迹 G180.0-01.7 的运动学特征**

原题： Decomposing the Kinematics of SNR G180.0-01.7 with Medium-Resolution Spectra | **作者：** Juan-Juan Ren, Wei Zhang, Chao-Jian Wu 等 | PDF

【推荐理由】： 通过精细光谱线比和视向速度解耦，化解了著名超新星遗迹 S147 的三方年龄矛盾并揭示了双极外流突起本质。

【核心要点】： 激波电离成分视向速度呈双峰分布，表观运动学年龄 $0.39\,\mathrm{Myr}$ 显著偏离脉冲星特征，证实风吹空腔演化图像，东耳强蓝移支持双极喷流破壳。

【阅读切入】： 关注第 3 节基于三级判据从背景弥漫气体中分离 SNR 激波电离细丝的方法。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.12943] 爱因斯坦探针搭载的后随X射线望远镜在轨定时标定**

原题： In-flight Timing Calibration of the Follow-up X-Ray Telescope on Board the Einstein Probe | **作者：** Juan Zhang, Xiaofan Zhao, Dawei Han 等 | PDF

【推荐理由】： 系统呈现了 EP/FXT 望远镜在轨多模式计时精度定标与本地晶振漂移校正算法，是该载荷高能时变分析的基石。

【核心要点】： 标定 FXTA 和 FXTB 本地时钟相对偏差在 10^{-6} 量级，两模块间系统延迟仅 $15\,\mathrm{ms}$，通过多颗毫秒脉冲星验证了 TM 与 PW 模式在轨计时精度。

【阅读切入】： 速览第 2 节时钟漂移多项式拟合模型与第 3 节时间模式下帧时间校正公式。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.13011] ASKAP对鲁宾深度巡天场的监测**

原题： ASKAP Monitoring of the Rubin Deep Drilling Fields | **作者：** Dougal Dobie, James Freeburn, Iris de Ruiter 等 | PDF

【推荐理由】： 展示了深钻天区无偏准实时射电监测巡天管线，并由 SN 2024abfo 限制了超新星前身星爆发前数百年的变率星风。

【核心要点】： 利用自由-自由吸收光深峰值反演，限定激波半径达 $(0.86-3.62)\times10^{16}\,\mathrm{cm}$，暴前 350 年质量损失率达 $2.5\times10^{-5}\,M_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$。

【阅读切入】： 参考第 4 节中使用 `redback-csm` 进行自由-自由与同步辐射自吸收拟合的配置细节。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.13182] PSR B0540--69 的流量演化及其脉冲星风云的能谱分布**

原题： Flux Evolution of PSR B0540--69 and the Spectral Energy Distribution of its Pulsar Wind Nebula | **作者：** Juan Zhang, Xuezhi Liu, Junyang Zhang 等 | PDF

【推荐理由】： 提供了年轻脉冲星自转减慢率跃变后 14 年间星风云 X 射线平台阶跃与宽波段 SED 空间分层辐射完整建模。

【核心要点】： 证实 SRT 后星风云光度持续阶跃增长 26.3%，利用 $B_{\rm in}\approx1.01\,\mathrm{mG}$ 紧凑内区与弱磁场外区双区轻子模型再现了全波段 SED。

【阅读切入】： 重点看第 3 节脉冲星时变流量分离与第 4 节双区同步+逆康普顿辐射模型设置。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.13288] 黑洞磁层的电阻性对齐**

原题： Resistive alignment of a black-hole magnetosphere | **作者：** Ruben Lier, Oliver Porth | PDF

【推荐理由】： 严格推导了破坏理想无力条件的赤道电流片对倾斜黑洞磁轴与自旋轴对齐的物理机制与时标标度。

【核心要点】： 磁轴倾角呈指数衰减，主导阶衰减率遵循标度律 $\Gamma_\chi\propto\eta_{\rm m}a_*^2$，三维 GRMHD 模拟证实了 Sweet-Parker 机制对齐图像。

【阅读切入】： 细读第 2 节慢自旋 Blandford-Znajek 解的电阻微扰展开与电流片翘曲面方程。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.13771] HAWC对J1952+2924、J1954+2837和J1958+2848的观测揭示DA 495区域的TeV伽马射线辐射**

原题： TeV Gamma-Ray Emission in the DA 495 Region from HAWC Observations of J1952+2924, J1954+2837, and J1958+2848 | **作者：** R. Alfaro, C. Alvarez, E. Anita-Rangel 等 | PDF

【推荐理由】： 化解了 DA 495 区域不同地面伽马实验流强测量差异的长期争议，并认证了两个新的 TeV 晕候选体。

【核心要点】： 给出 DA 495 指数截断截断能量 $E_c=12.0\,\mathrm{TeV}$，推断磁场 $B\sim10\,\mu\mathrm{G}$，轻子冷却时标约为数个 kyr，支持轻子起源。

【阅读切入】： 速览第 3 节 3ML 框架下的能谱截断幂律拟合及与 VERITAS 结果的一致性对比。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.13926] 强子中子星的绝热演化**

原题： Adiabatic evolution of hadronic neutron stars | **作者：** Domenico Logoteta, Francesco Zeno Constanzo, Ignazio Bombaci 等 | PDF

【推荐理由】： 构建了包含有限温、超子自由度与中微子囚禁的简化绝热准静态中子星演化方案，直观判定双中子星并合残骸命运。

【核心要点】： 中微子囚禁显著抑制超子丰度，绝热模型自然预测 GW190425 直接坍缩而 GW170817 形成差旋长寿命超大质量残骸。

【阅读切入】： 查阅第 2 节等熵中微子囚禁状态方程推导与第 4 节引力波残骸临界质量分析。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.14172] 利用XRISM首次观测星际含铁尘埃颗粒**

原题： A first view of interstellar Fe-bearing dust grains with XRISM | **作者：** I. Psaradaki, L. Corrales, E. Costantini 等 | PDF

【推荐理由】： 利用 XRISM 极高能量分辨率首次在 X 射线波段定量分离了星际 Fe 尘埃的化学宿主形态与耗竭度。

【核心要点】： 测定约 95% 的星际铁耗竭在尘埃中，其中铁硫化物占 47%、金属铁占 38%，硅酸盐贡献剩余部分。

【阅读切入】： 重点看第 3 节 Resolve 光谱在 Fe K 边 XAFS 精细结构的消光模型 amol 拟合。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.14179] 星系核中的恒星盘与中等质量黑洞 II：恒星盘碎裂及活核星团中S星的形成**

原题： Stellar discs and intermediate-mass black holes in galactic nuclei II. Fragmenting the disc and forming the S-stars in a live nuclear star cluster | **作者：** Taras Panamarev, Bence Kocsis | PDF

【推荐理由】： 阐明了逆行轨道中等质量黑洞在活星团中瓦解恒星盘、再现 S 星极高偏心率及回避区的全动力学图像。

【核心要点】： $2000\,M_\odot$ 的 IMBH 仅需 $5\,\mathrm{Myr}$ 即可将盘瓦解为多层子结构，并通过 Hills 机制将潮汐瓦解率提升至 $130-240\,\mathrm{Myr}^{-1}$。

【阅读切入】： 研读第 3 节 N-body 模拟中盘角动量纤维结构演化与损失锥空锥判定判据。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.14185] 用于人工智能辅助分析成像X射线偏振探测器对黑洞X射线双星观测及其偏振变化上限的流程**

原题： A Pipeline for the AI-Assisted Analysis of Imaging X-ray Polarimetry Explorer Observations of Black Hole X-ray Binaries and Limits on Their Polarization Variability | **作者：** B. Domine, B. Liu, H. Krawczynski 等 | PDF

【推荐理由】： 展示了智能体流水线在 IXPE 偏振分析中的应用，并给出了黑洞双星软态偏振时变与 RMS 游走上限的统计约束。

【核心要点】： 软态源 4U 1630–47 展现偏振度以 $3.25\times10^{-5}\,\mathrm{ks}^{-1}$ 线性增长（显著度 4.9σ），并对静态源给出了偏振角 RMS 游走上限（$<2.9^\circ$）。

【阅读切入】： 速读第 2 节双智能体解耦验证架构与第 4 节功率约束上限（PCL）统计计算。

3.2 重点关注 · 全周论文简表 (Weekly Compendium · 共 67 篇)

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.22118 2026-10-15	**Are $E>B$ regions essential for particle injection in relativistic magnetic reconnection?** *Are $E>B$ regions essential for particle injection in relativistic magnetic reconnection?* Omar French, Fan Guo, Xiaocan Li 等	在零导向场（$b_g = 10^{-5}$）的相对论磁重联模拟中（以 $\gamma_{\rm inj} = \sigma/4$ 为注入阈值），注入粒子的能量增益主要来自磁化通道（magnetized channel，由动生电场 $\mathbf{E}_m = -\mathbf{u}\times\mathbf{B}/c$ 做功驱动）：磁化通道在 $\sigma = 12$ 时为 $\sim 95\%$ 的注入示踪粒子提供最大做功份额，在 $\sigma = 800$ 时仍占 $\sim 65\%$；在 $\sigma \geq 200$ 时，仍有约 40%–45% 的注入粒子从未进入过 $E > B$ 区域；未磁化做功份额随模拟尺寸增大显著下降（每加倍 L_x/d_e 下降约 20%–45%）。	5.3 Astrophysical implications
arXiv:2610.21966 2026-10-15	**Breakdown of hydrodynamic universality in causal first-order viscous neutron star oscillations** *Breakdown of hydrodynamic universality in causal first-order viscous neutron star oscillations* Lennox S. Keeble, Alejandro Cárdenas-Avendaño	研究发现当体黏滞系数超过临界阈值 $\zeta^* \sim \sqrt{\Delta_{\min}}\frac{1-c_s^2}{2c_s}\frac{\epsilon+p}{k} \sim \frac{9(1-c_s^2)}{2\pi c_s} \times 10^{30}\,\mathrm{g/cm/s}$（中心体黏滞度 $\zeta_c \gtrsim 2\times10^{30}\,\mathrm{g/cm/s}$）时，所有因果标架均偏离一阶有效场论（EFT）适用范围（$\Delta_{\rm EFT} \geq 0.1$），一阶流体力学普适性破缺；在强黏滞极限下（如 $\zeta_c = 10^{31}\,\mathrm{g/cm/s}$），BDNK理论激发非物理不稳定模，增长时标约为 $\sim 0.2\,\mathrm{ms}$；对于径向动力学失稳阈值，耗散修正消失，失稳临界中心密度 $\epsilon_c^* \approx 5.663\times10^{15}\,\mathrm{g/cm^3}$ 与理想流体严格一致。	III.2 Neutron star oscillations
arXiv:2610.21863 2026-10-15	**Convective Oscillations of Cosmic Rays** *Convective Oscillations of Cosmic Rays* Yiran Zhang, Siming Liu	推导得出了宇宙线空间起伏功率谱 $P(t,k,p) = P_{\rm s} + P_{\rm d}$。在小尺度极限（$k\to\infty$）下，功率谱由声波对流分量主导，呈现渐近标度 $P_{\rm s}\propto k^{\gamma_{\rm s}-4}$ 与 $P_{\rm d}\propto k^{\gamma_{\rm d}-2}$（对于柯尔莫哥洛夫湍流 $\gamma_j = -5/3$）；在大尺度极限（$k\to0$）下满足 $P_{\rm s}\propto k^4$ 与 $P_{\rm d}\propto k^2$。逆康普顿（IC）散射产生的 TeV 表面亮度起伏功率谱满足 $2\pi\mathcal{K}\langle\tilde{S}_1\tilde{S}_1^*\rangle \propto \Pi(t,\mathcal{K},E)/\mathcal{K}$，高能辐射功率谱能够直接反映电子-正电子对流振荡的全局形态。	IV Radiation Power Spectrum
arXiv:2610.21844 2026-10-15	**Secular Evolution of Quasiperiodic Eruptions: eRO-QPE2** *Secular Evolution of Quasiperiodic Eruptions: eRO-QPE2* Zirui Zhang, Cong Zhou, Zhen Pan	排除了每轨道单次爆发的假设，弱次级爆发光子数上限为 $N_{\rm small}/N_{\rm large} < 0.56\%$ (95% 置信度)；贝叶斯时序推断给出轨道初始周期分别在参考历元为 $T_{\rm obt}(t_{\rm ref,1}) = 17.41^{+0.05}_{-0.06}\,\mathrm{ks}$ 与 $T_{\rm obt}(t_{\rm ref,4}) = 16.39^{+0.15}_{-0.13}\,\mathrm{ks}$，平均轨道衰减率为 $\langle\dot{T}_{\rm obt}\rangle \approx -0.97\times10^{-5}$（对应重现周期衰减率 $\dot{T}_{\rm rec}\simeq\frac{1}{2}\dot{T}_{\rm obt}\approx-5\times10^{-6}$），轨道偏心率上限为 $e<0.026$ 与 $e<0.033$，早期长短间隔差主要由吸积盘半厚度引起的光行时差几何效应（贡献约 $500\,\mathrm{s}$）所致。	II.2 One or Two Eruptions per Period
arXiv:2610.21806 2026-10-15	**Extracting the Central Sound Speed of Neutron Stars through Intrinsic Stellar Structure Scaling with Reduced Equation-of-State Model Dependence** *Extracting the Central Sound Speed of Neutron Stars through Intrinsic Stellar Structure Scaling with Reduced Equation-of-State Model Dependence* Jian-Hao Shi, Bao-Jun Cai, Yu-Gang Ma	通过极小化 6 族（或排除 $c_\omega = 0$ 的 5 族）非线性 Walecka 模型系综间线性标度关系 $s_{\rm c}^2 \approx \alpha\Theta + \beta$ 的色散，提取出典型 $1.4\,M_\odot$ 中子星的核心参数：中心声速平方 $s_{\rm c}^{2,*} \approx 0.523^{+0.044}_{-0.044}$（5 族提取为 $0.496^{+0.092}_{-0.092}$），显著高于共形极限值 $1/3$；中心物态参数 $\mathrm{X}^* = (P_{\rm c}/\varepsilon_{\rm c})^* \approx 0.173^{+0.020}_{-0.018}$，对应半径 $R_{1.4}^* \approx 11.73^{+1.08}_{-0.92}\,\mathrm{km}$。高密渐近极限表现为：$c_\omega = 0$ 时 $\phi\to s^2\to1$；$1<q<2$ 时 $\phi\to s^2\to1/(2q-1)$；$q\geq2$ 时 $\phi\to s^2\to1/3$。并且仅凭矢量排斥与非线性自相互作用的竞争，即可在纯核子物质中于有限密度 $\rho_{\rm turn}\sim2$–$8\rho_0$ 处激发非单调的内部声速峰。	Introduction
arXiv:2610.21589 2026-10-15	**Probing fundamental physics with ALMA2040 mm-wavelength observations of neutron stars** *Probing fundamental physics with ALMA2040 mm-wavelength observations of neutron stars* Kuo Liu, Marilyn Cruces, Gregory Desvignes 等	数值模拟表明，ALMA2040 在 $40\,\mathrm{GHz}$ 积分 3 小时预计可探测到银心（GC）约 45% 的普通脉冲星和约 20% 的毫秒脉冲星；对于重复 FRB，若具有平谱或倒谱分量，由于毫米波散射可忽略，不仅能精确分辨亚微秒本征微结构，高灵敏度相控阵系统还能将典型能量 $10^{40}\,\mathrm{erg}$ 的 FRB 探测视界从 $z\sim1$ 拓展至 $z\sim3$–6；此外可利用银心强磁场磁星 PSR J1745−2900 的光子-轴子共振转换来严格限制轴子耦合常数 g_γ。	1 Scientific context and open questions
arXiv:2610.21583 2026-10-15	**A Shell Collision Scenario for EP251222b/GRB 251222A: Connecting Prompt Emission and Double-Peaked Afterglow** *A Shell Collision Scenario for EP251222b/GRB 251222A: Connecting Prompt Emission and Double-Peaked Afterglow* Run Shi, Di Xiao, Brajesh Kumar 等	通过多波段（EP/WXT, FXT, Fermi/GBM, Swift/XRT 及 Mephisto 光学/近红外）数据联合贝叶斯拟合，确定慢且宽壳层翼部与合并后核心的洛伦兹因子分别为 $\Gamma_{1,w} = 228^{+48}_{-48}$ 和 $\Gamma_c = 293^{+36}_{-45}$，第二壳层 $\Gamma_2 = 336^{+42}_{-52}$；介质密度 $\log(n/\mathrm{cm^{-3}}) = 0.19^{+0.43}_{-0.41}$。非弹性碰撞前核心区总动能为 $E_{k,1,c}+E_{k,2} = (5.5^{+5.4}_{-3.1})\times10^{54}\,\mathrm{erg}$，合并后核心动能 $E_{k,c} = (5.4^{+5.4}_{-3.1})\times10^{54}\,\mathrm{erg}$，耗散能量 $E_{\rm diss} = (1.6^{+2.1}_{-0.9})\times10^{52}\,\mathrm{erg}$，动力学耗散效率为 $\eta_{\rm diss}\equiv\frac{E_{\rm diss}}{E_{k,1,c}+E_{k,2}} = 0.37^{+0.07}_{-0.14}\%$。有限能段（0.5–4 keV）X 射线效率中值约为 $\eta_X = \frac{E_{\rm flare,iso}}{E_{\rm flare,iso}+E_{k,c}} \approx 0.06\%$–$0.09\%$，X 射线耀斑辐射能量占动力学耗散能量的 18%–30%。	III Afterglow Modeling

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.21560 2026-10-15	**Numerical simulations of low-mass black hole-neutron star mergers with moderate eccentricities** *Numerical simulations of low-mass black hole-neutron star mergers with moderate eccentricities* Ivan Markin, Gonzalo Morrás, Tim Dietrich	数值相对论波形表明偏心潮汐修正可在并合前数个毫秒内引入 $\sim 0.1\,\mathrm{rad}$ 的相位差异；吸积盘动力学表明残余黑洞质量 $M_{\rm BH}^{\rm rem}$ 与自旋 $\chi_{\rm BH}^{\rm rem}$ 几乎不受中等偏心率影响，捕获 g 模振荡频率与相位主要由黑洞特征决定且不随偏心率改变；然而当施加最大磁场强度达 $10^{17}\,\mathrm{G}$（回落物质中磁场强度 $\lvert B\rvert \approx 10^{15}\,\mathrm{G}$）的强磁场后，捕获 g 模震荡受到显著破坏与阻尼。在极向漏斗区域，磁化参量下限可达 $\sigma = b^2/(2\rho) \sim 3\times 10^4$，具备产生超相对论喷流的条件，但由于穿透黑洞视界的无量纲磁通量 $\phi_{\rm BH} = \Phi_{\rm BH}/(\sqrt{\dot M_{\rm BH} M_{\rm BH}}) \lesssim 2.5$，盘仍处于标准正规演化（SANE）态而非磁阻滞盘（MAD）。	III.3 Accretion and trapped g modes
arXiv:2610.21499 2026-10-15	**Polarization Properties of Thomson-Scattering Triaxial Ellipsoids** *Polarization Properties of Thomson-Scattering Triaxial Ellipsoids* Naoki Hachisu, Tatsuya Matsumoto, Tomonori Totani	对于适度偏离球对称的旋转椭球体，线偏振度随视线倾角的变化遵循 $\Pi \propto \sin^2\theta$；而在强形变长球体（$a=b<1$）中，偏振呈现非单调的双峰结构，并在顶面与侧面偏振相互抵消的中间视线角 $\theta_{\rm null}$ 降为零（在长径比极限 $a\to 0$ 时 $\theta_{\rm null}\simeq 41^\circ$），伴随偏振角发生 90° 翻转；对于一般三轴椭球体（$x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$），偏振极值取决于最大投影掠射面元面积，在极端轴比（如 $a/b\sim 100$）下最大净偏振度趋于饱和并接近半无限平面平行纯汤姆孙散射大气的 Chandrasekhar 理论极限 $\Pi\simeq 11.7\%$（数值计算达到 $\simeq 10\%$）。	4 Summary
arXiv:2610.21495 2026-10-15	**Identification of ultra-high-energy neutrinos in vertical air showers with surface detectors** *Identification of ultra-high-energy neutrinos in vertical air showers with surface detectors* Jaime Alvarez-Muñiz, Ruben Conceição, Pedro J. Costa 等	在多信使瞬变源 $1\,\mathrm{h}$ 时间窗口与 3° 空间窗口下，设定本底污染率 $\varepsilon_{\rm bkg}=2\times10^{-5}$（抑制因子 $r\simeq 5\times10^4$），当 $E_\nu = 10^{18}\,\mathrm{eV}$ 且 $\theta = 30^\circ$ 时，结合真实 SSD-WCD 探测器分析得到的电子中微子点源有效面积达到 $A_{\rm eff}\simeq 1.6\times10^{-2}\,\mathrm{km^2}$（理想变量下为 $4.0\times10^{-2}\,\mathrm{km^2}$），与传统倾斜中微子通道处于同等量级；对于弥散中微子通量，$\theta\in[30^\circ,35^\circ]$ 处的 90% 置信度上限为 $E_\nu^2\frac{\mathrm{d}\Phi_\nu}{\mathrm{d}E_\nu}\lesssim 2.03\times10^{-7}\,\mathrm{GeV\,cm^{-2}\,s^{-1}\,sr^{-1}}$，弱于地掠射通道约 15 倍。	6 Conclusions
arXiv:2610.21110 2026-10-15	**Neutrino production at the extreme vicinity of supermassive black hole in NGC 1068** *Neutrino production at the extreme vicinity of supermassive black hole in NGC 1068* Zhi-Peng Ma, Kai Wang	中微子辐射区被严格限制在超大质量黑洞极端近邻：$R\gtrsim 10R_{\rm s}$ 在 $\sim 5\sigma$ 被排除，$R\gtrsim 6R_{\rm s}$ 在 $\sim 3\sigma$ 被排除；严格吻合样本集中在逼近 ISCO 的极小尺度 $R\lesssim 3R_{\rm s}$（中位值 $\sim 0.5R_{\rm s}$）。要求非热质子谱非常陡峭（$\tilde s\sim 3.3$–3.4），最小质子光度达热光度量级（$\tilde L_{\rm p,min}\sim 10^{45}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$），最高能量 $\tilde E_{\rm p,max}\sim 1\,\mathrm{PeV}$；随机湍流加速要求磁场 $B\sim 10^5\,\mathrm{G}$。	III Observational constraints
arXiv:2610.21104 2026-10-15	**Detecting and Identifying Supernovae in AGN Accretion Disks** *Detecting and Identifying Supernovae in AGN Accretion Disks* Zhi-Peng Ma, Kai Wang	吸积盘内超新星激波破越与相互作用辐射的特征频段和可见时标强烈依赖于超大质量黑洞质量 $M_{\rm BH}$：对于低质量黑洞系统（$M_{\rm BH}=10^6M_\odot$），峰值辐射温度为 $T_{\rm peak}\sim 50$–$90\,\mathrm{eV}$（极紫外 EUV 波段），超越 AGN 背景的可见时标较短（$t_{\rm vis}\sim 0.5$–$1.5\,\mathrm{days}$）；当 $M_{\rm BH}=10^7M_\odot$ 时，$T_{\rm peak}\sim 30$–$50\,\mathrm{eV}$，$t_{\rm vis}\sim 0.2$–$7\,\mathrm{days}$；当黑洞质量增加至 $M_{\rm BH}=10^8M_\odot$ 时，特征辐射红移至紫外/光学波段（$T_{\rm peak}\sim 3$–$8\,\mathrm{eV}$），可见时标显著延长至 $t_{\rm vis}\sim 3$–$70\,\mathrm{days}$。	III.2 Distinguishing AGN-disk SNe from Isolated SNe
arXiv:2610.20961 2026-10-15	**A model for the image structure and spectral energy distribution of relativistic jets** *A model for the image structure and spectral energy distribution of relativistic jets* Dominic W. Pesce, Ramesh Narayan, Yuh Tsunetoe	推导并证实了相对论力无规喷流在慢冷却机制（$\nu_m<\nu<\nu_c$）下的轴向强度轮廓标度律 $I_\nu\propto z^{-s(p+3)/2}\approx z^{-1.57}$（取 M87* 基准直指数 $s=0.569$、电子谱指数 $p=2.205$），与实测衰减斜率高度一致；推导出 SED 随黑洞质量 M 与吸积率 $\dot m$ 的自相似变换律：特征频率满足 $\nu_m,\nu_c\propto M^{-1/2}\propto \dot m^{-3/2}$，光学薄光度密度满足 $L_\nu\propto ha^3\dot m^{3/2}M^{3/2}$；在全参数 MCMC 拟合中，M87* 宽波段 SED 达到 $\chi^2=33.5$（45 个测量，$\chi^2_\nu=0.99$），Sgr A* 宁静态 SED 达到 $\chi^2_\nu=1.27$。	III Spectral energy distribution
arXiv:2610.20948 2026-10-15	**JWST reveals a highly ionized nebula powered by an ultraluminous X-ray source with a massive black hole in the metal-poor galaxy Holmberg II** *JWST reveals a highly ionized nebula powered by an ultraluminous X-ray source with a massive black hole in the metal-poor galaxy Holmberg II* F. A. Fogantini, P. Zeidler, L. M. Oskinova 等	测得高电离态离子（IP $\gtrsim 97\,\mathrm{eV}$，如 [Ne V] 与 [Ne VI]）辐射区偏离中心 ULX 约 $\Delta r\sim 17-24\,\mathrm{pc}$，其辐射张角显著收缩至 OA $\sim 34^\circ-38^\circ$ 并高度对齐于位置角 PA $\sim 68^\circ$；星云气体在所有电离相中均处于运动学平静状态，线宽与仪器分辨率一致（例如 [Ne V] $\lambda14.33\,\mu\mathrm{m}$ 的 FWHM $\sim 110\,\mathrm{km\,s^{-1}}$），排除了快辐射激波（速度数百 $\mathrm{km\,s^{-1}}$）作为主要激发源，确立了吸积黑洞（$L_{\rm X}\sim(1-30)\times10^{39}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$）各向异性逃逸辐射的主导光电离机制。	IV.2 Line surface-brightness maps

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.20869 2026-10-15	**FUGUE: A New GPU-accelerated General Relativistic Magnetohydrodynamics Code with Weak-Field Multipole Self-Gravity and Quasi-Stationary Kerr Black Hole Evolution** *FUGUE: A New GPU-accelerated General Relativistic Magnetohydrodynamics Code with Weak-Field Multipole Self-Gravity and Quasi-Stationary Kerr Black Hole Evolution* Piotr Plonka, Agnieszka Janiuk	数值验证在多项标准激波与吸积测试中展现二阶收敛。应用于 $M_{\rm disk}=1\,M_\odot$、$M_{\rm BH}=3\,M_\odot$ 的 Toomre 不稳定吸积盘（$Q\sim1/3$）时，自引力激发了多极螺旋结构，总归一化傅里叶功率 $\mathcal{P}=\sum_{m=1}^{16}\lvert D_m/D_0\rvert^2\sim10^{-2}$（比无自重情况高两个量级）；引力不稳定性导致发作式吸积脉冲，显著增大了视界磁通量 $\Phi_{\rm BH}$ 并调制了 Blandford–Znajek 喷流光度 $L_{\rm BZ}$。	VIII Toomre-unstable self-gravitating accretion disk
arXiv:2610.20740 2026-10-15	**Understanding cosmic explosions** *Understanding cosmic explosions* Karri I. I. Koljonen, Tomek Kamiński, Anna Y. Q. Ho 等	阐明了毫米波/亚毫米波（$\sim$ 35--950 GHz）在瞬变源早期光度峰值阶段避开厘米波同步辐射自吸收（SSA）与自由-自由吸收（FFA）的物理优势；能够直接约束半径 $R\sim10^{14}$--10^{17} cm 范围内的周星介质密度轮廓及外流动能；明确了 ALMA2040 灵敏度提升 10--20 倍、瞬时带宽提升达 64 倍后，探测微类星体爆发（特征单色射电光度 $L_\nu\approx1.2\times10^{23}\,(S_\nu/\mathrm{Jy})\,(d/10\,\mathrm{kpc})^2\,\mathrm{erg\,s^{-1}\,Hz^{-1}}$）和解析河内超新星膨胀的技术指标要求。	1 Scientific Context and Open Questions
arXiv:2610.20719 2026-10-15	**Wandering intermediate-mass black holes and off-nuclear tidal disruption events from early star clusters** *Wandering intermediate-mass black holes and off-nuclear tidal disruption events from early star clusters* Claire E. Williams, Smadar Naoz, Yihao Zhou 等	早期高密度星团中的 IMBH（$M_{\rm BH}\sim10^2-10^5\,M_\odot$）在黑洞影响半径内耗尽恒星前驱动短时爆发性离核 TDE，单次爆发持续约 $10-100\,\mathrm{Myr}$，累积事件数受限于 $N_{\rm TDE}\lesssim M_{\rm BH}/M_*\sim10^3-10^4$。由于双体弛豫时标 $t_{\rm relax}\propto\sigma^3/(\rho m_*\ln\Lambda)\propto r_{\rm h}^{3/2}$，紧凑星团引发的单星系 TDE 发生率在极高红移 $9\lesssim z\lesssim13$ 达到峰值，在大质量原初星系中可高达 $\sim4\times10^{-2}\,\mathrm{yr^{-1}}$；且大部分高红移偏核 TDE 分布在距主星系约 $10^2\,\mathrm{kpc}$ 的外围或逃逸至晕外，表现为无宿主高能瞬变，其回落时标遵循 $t_{\rm fb}\propto M_{\rm BH}^{1/2}$ 呈现短时超爱丁顿辐射特征。	IV.1 Off-nuclear TDEs in the high-redshift Universe probe the initial conditions of star clusters
arXiv:2610.20601 2026-10-14	**Transient PULSE: Code for the Transient Propagation of UltraLight (pseudo)Scalars to Earth** *Transient PULSE: Code for the Transient Propagation of UltraLight (pseudo)Scalars to Earth* Jason Arakawa, Charles Cheung, Muhammad Hani Zaheer 等	给出了超轻玻色子波包在介质密度分布 $\rho_{\rm matter}(\ell)$ 中的色散传播数值框架与解析标度：群速度满足 $v_\phi(\ell,p)=\sqrt{1-(m_\phi^2+\beta(\ell))/\omega_p^2}$，其中介质效应诱发的有效质量平方修正为 $\beta=\sum_i 8\pi d_i^{(2)}\rho_i/M_{\rm Pl}^2$，在 $m_\phi^2+\beta(\ell)\geq\omega_p^2$ 时产生环境屏蔽截断；高动量模先于低动量模到达导致信号拉宽（$\tilde{t}_*>t_*$）与反啁啾时频结构。验证了源端动量积分能量与地球处时间积分能流守恒： $$\int\frac{dE}{dp}dp\Big\rvert_{\rm Source}\simeq4\pi r^2\int\sum_i\rho_i(t)v_i dt\Big\rvert_{\rm Earth}$$ ，相对误差 $<0.1\%$。	Theoretical Background
arXiv:2610.20495 2026-10-14	**A Parsec-Scale Transient High-Frequency-Peaked Radio Source in the Very Large Array Sky Survey Brightening and Fading over a Decadal Timescale** *A Parsec-Scale Transient High-Frequency-Peaked Radio Source in the Very Large Array Sky Survey Brightening and Fading over a Decadal Timescale* Yuyang Chen, B. M. Gaensler, Maria R. Drout 等	VT J1823-2345的3 GHz流量约在2023年达峰后衰减，半峰以上持续时间为$t_{1/2,\rm obs}\gtrsim10\,\mathrm{yr}$；2023—2024年谱峰约为$\nu_{\rm p,obs}\simeq6.65\,\mathrm{GHz}$，峰值流量由约69.38降至55.30 mJy，未测得显著峰频变化。谱指数按$S_\nu\propto\nu^\alpha$定义，光厚端$\alpha_{\rm thick}\sim0.7$、光薄端$\alpha_{\rm thin}\sim-0.9$至$-1$。15 GHz角尺寸为$0.40\times0.08\,\mathrm{mas}$，亮温为$T_B=5.7\times10^9(1+z)\,\mathrm{K}$；8.8 GHz线偏振率约0.73%，$\mathrm{RM_{obs}}\sim+1.2\times10^4\,\mathrm{rad\,m^{-2}}$。作者倾向其为年龄数十年、投影尺度不超过约3.5 pc的短寿命年轻喷流，可能与间歇AGN活动或带喷流TDE有关；距离和红移未知，耀变体解释尚未完全排除。	先读 5. SUMMARY AND CONCLUSION，再读 4.1. General Considerations 与 4.2. Time Evolution and Comparison with Correlations；关注爆炸激波替代解释时接读 C.4. Extragalactic Non-relativistic Transient 和 C.5. Gamma-Ray Burst。
arXiv:2610.20477 2026-10-14	**LHAASO Constraints on New-Source Cosmic Rays:Abundance Scenarios and Injection Spectral Indices** *LHAASO Constraints on New-Source Cosmic Rays:Abundance Scenarios and Injection Spectral Indices* Xu-Lin Dong, Pei-Pei Zhang, Qi-Ling Chen 等	在 QGSJET-II-04 强子相互作用模型下，类伴星无选择性富集丰度的 Case-2 模型对平均对数质量数 $\langle\ln A\rangle$ 的拟合优度（$\chi^2/\mathrm{d.o.f.}=55.23/20$）显著优于类 SNR 难熔元素富集的 Case-1 模型（$\chi^2/\mathrm{d.o.f.}=157.91/20$）；但 Case-2 拟合全粒子谱需要重元素注入谱指数（$\gamma=2.00$）系统性硬于氦核（$\gamma=2.20$）。	RESULTS
arXiv:2610.20423 2026-10-14	**Rotochemical heating of neutron stars in 2D** *Rotochemical heating of neutron stars in 2D* Mikhail V. Beznogov, Jerome Novak, Dany Page 等	数值模拟表明，中子星在旋化学加热作用下经历三个演化阶段：初始加热相、准平衡平台期（quasi-equilibrium plateau）及最终冷却相。当无量纲化学势不平衡参数 $\xi\equiv\Delta\mu/(k_{\rm B}T)>5.5$ 时，不可逆化学弛豫净加热率超过中微子冷却（$Q_{\rm tot}=Q_{\rm eq}[b\xi^2H(\xi)-F(\xi)]$）。对于偶极磁场 $B_{\rm dip}\sim10^8-10^9$ G，RH 效应在光子冷却主导期（$t\gtrsim300$ kyr）显现；计算证实红移化学势偏差 $\Delta\tilde{\mu}_l\leq0.05\ \mathrm{MeV}\ll\mu_n,\mu_p,\mu_l$，且冷却曲线表现出对核心对称能密度斜率及质子丰度 $y_p(n_{\rm B})$ 的极强依赖。	Conclusions

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.20163 2026-10-14	**Search for High-Energy Neutrinos from Infrared Flares** *Search for High-Energy Neutrinos from Infrared Flares* R. Abbasi, M. Ackermann, J. Adams 等	393个北天红外耀发与10年IceCube穿越径迹数据未呈现显著关联：$\mathrm{TS}=0$、$\hat{n}_s=0$、局部$p=0.998$。在共同能谱$dN_\nu/dE_\nu \propto E_\nu^{-\gamma}$以及所采种群外推假设下，$\gamma=1,2,2.5$对应的100 TeV弥散缪子中微子通量贡献上限分别为0.14%、3.5%和2.7%，置信度为90%。对所讨论的尘埃回声模型，若机制在所有TDE中起作用，即$\eta=1$，则耗散效率满足$\varepsilon_{\rm diss} < \phi_0/\phi_{\rm model} \approx 2.8\times10^{-3}$。上述种群和模型限制均依赖所采假设，而非无条件排除TDE中微子起源。	首先阅读4. Results，掌握零结果与通量上限；随后阅读5. Discussions和Appendix A: Population study，核查效率约束及种群外推的条件；最后回到3. Analysis method，检查一年时间窗和红外权重是否适合拟检验的发射模型。
arXiv:2610.20065 2026-10-14	**Optical constraints on intranight variability in TeV HBLs from a two-year Asiago Schmidt monitoring campaign** *Optical constraints on intranight variability in TeV HBLs from a two-year Asiago Schmidt monitoring campaign* Domenico Impiombato, Giacomo Bonnoli, Elisa Prandini 等	统一分析三颗TeV HBL后，仅H 1426+428可靠检出光学夜内变异：R、I波段分别为15/43和5/40个合格时段；其中分别13和3个时段可测局部特征时标。观测者系局部外推倍增／减半时标约为 $\lvert\tau_{\rm obs}\rvert \simeq 5$–$15$ min，定义为 $\lvert\tau_{\rm obs}\rvert = \lvert\Delta t\rvert \ln 2/\lvert\ln(F/F_0)\rvert$，其中 $F/F_0 = 10^{-0.4\Delta m}$。这些不是完整耀发持续时间，也不是直接观测到通量完整倍增或减半。仅计入可靠变异且具有可测时标的时段，时长加权占空比为 $DC_{{\rm dur},R}=28.0\%$、$DC_{{\rm dur},I}=7.0\%$。1ES 1959+650与PG 1553+113在所用统计框架内未检出可靠夜内变异。	先读 5.3. Duty cycle of intranight variability，核对时标和占空比的操作定义；再读 4.2. Variability classification 与 6. Discussion，理解可靠性优先的筛选及物理解释边界。
arXiv:2610.19877 2026-10-14	**Linear Polarization of Synchrotron Radiation from Very-small-pitch-angle Electrons** *Linear Polarization of Synchrotron Radiation from Very-small-pitch-angle Electrons* Meng Nie, Jirong Mao	极小俯仰角条件为 $\alpha \ll 1/\gamma$。幂律电子分布下，忽略有限电子最高能量导致的积分下限修正后，低频偏振满足 $\Pi \simeq [(p-1)/p](\nu/\nu_L)^2$；峰位与峰值分别为 $\nu_{\rm peak}=(1+1/p)\nu_L$、$\Pi_{\rm peak}=(p^2-1)/(p^2+1)$；在 $\nu > 2\nu_L$ 且高能截止尚不重要的平台区，$\Pi = 2(p-1)/(p^2-p+2)$，例如 $p=2.5$ 时约为52.2%。附录的解析检验表明峰和折点并非数值伪影。Maxwellian电子的偏振峰约为70.7%，峰频约为 $\nu_{\rm pk} \simeq 4.8\nu_L[T_e/(10^{10}\,{\rm K})]$；固定温度时，增强磁场使偏振频谱整体移向高频而不改变形状，即 $\nu_{\rm pk}\propto B$。X射线波段的极小俯仰角同步辐射偏振通常低于常规同步辐射。	先读 2.2. Very-small-pitch-angle Synchrotron Polarization，了解单电子辐射和偏振；再读 3.3. Polarization of Maxwellian Electron Energy Distribution 与 3.4.3. Polarization in the X-Ray Band；最后结合 5. CONCLUSIONS 及附录B核对适用限制和解析标度。
arXiv:2610.19771 2026-10-14	**Large dust grains escaping from a supernova remnant** *Large dust grains escaping from a supernova remnant* Evgenii O. Vasiliev	尘埃能否存活与逃逸严格受控于初始粒径 a_0 与最大截断尺寸 $a_{\rm cut}$：小颗粒（$a_0 \lesssim 0.05\,\mu$m）受流体阻力束缚在热气体中被热溅射完全破坏；而大颗粒（$a_0 \gtrsim 0.1\,\mu$m）因较大惯性能穿越扫积壳层并超越前向激波逃逸至星际介质。当 $a_{\rm cut}\sim 3-10\,\mu$m 时，在超新星遗迹于 $t\sim 30\,$kyr 转入辐射相致密壳层形成前，大颗粒逃逸/存活质量分数可达 $70\%-80\%$；高速逃逸颗粒在星际介质中受动力学溅射，当相对速度减速至 $\lvert v_p - v_{\rm gas}\rvert \lesssim 300\,{\rm km\,s^{-1}}$ 时动能溅射停止，使 $a_{\rm cut}=10\,\mu$m 在 $n=1\,{\rm cm^{-3}}$ 介质中演化到 200 kyr 时仍保持约 50% 的存活质量分数。	3. RESULTS
arXiv:2610.19672 2026-10-14	**Constraint on particle mass of dark matter based on XTE J1814-338 observation and DANS model** *Constraint on particle mass of dark matter based on XTE J1814-338 observation and DANS model* Lin Wang, Dehua Wen	在 APR3 核物质 EOS 下，结合 XTE J1814-338 观测与星系团自散射截面限制，得到暗物质粒子质量范围为 $0.96\,{\rm GeV} \le m_\chi \le 3.22\,{\rm GeV}$；综合软硬不同的核物质 EOS 后，全局下限为 $0.837\,{\rm GeV}$，上限为 $3.98\,{\rm GeV}$。在无相互作用（$y=0$）极限下 $m_\chi \in [0.593,\,0.682]\,{\rm GeV}$；当固定 $m_\chi = 2\,{\rm GeV}$ 时，自相互作用强度参数被限制在 $y\in[15.8,\,37.2]$（较软 EOS）和 $y\in[18.4,\,32.1]$（较硬 EOS），对应的暗物质质量分数分别为 $F_\chi\in[0.44,\,0.71]$ 与 $F_\chi\in[0.82,\,0.95]$。	Constraining dark matter parameters with the observation of XTE J1814-338 and self-interaction limit
arXiv:2610.19649 2026-10-14	**Correlation of galactic very-high-energy gamma-ray sources detected by LHAASO with high-energy neutrinos** *Correlation of galactic very-high-energy gamma-ray sources detected by LHAASO with high-energy neutrinos* Long-Yu Zhang, Kai Wang	在误差区域阈值 $\Omega_{90}\le 10\,{\rm deg}^2$ 下筛选出 9 组空间重叠（对应 7 个中微子与 8 个 LHAASO 源）。Monte Carlo 模拟得出全样本的偶然符合概率为 $p=0.237$（KM2A 样本 $p=0.312$，WCDA 样本 $p=0.115$），均大于 0.05，无法拒绝随机符合假设。在纯 pp 强子反应假说下，利用截断幂律质子谱 $dN_p/dE_p = (A/E_p^{\alpha})\exp[-(E_p/E_{\rm cut})^{\beta}]$（固定 $\beta=1.0$）推导的最乐观理论中微子通量，多数显著低于 IceCube 观测通量，表明目前未发现显著的物理关联。	Coincidence analysis
arXiv:2610.19595 2026-10-14	**A possible evolutionary connection between high-mass X-ray binary pulsars and isolated rotation-powered pulsars** *A possible evolutionary connection between high-mass X-ray binary pulsars and isolated rotation-powered pulsars* Jun Yang	SMC HMXB 脉冲星在 $\log P - \log\lvert\dot{P}\rvert$ 平面呈现幂律分布：$\log\lvert\dot{P}\rvert = (1.02\pm0.11)\log P - 10.92$（Spearman 秩相关系数 $\rho=0.77$，分散度 $0.59\,{\rm dex}$；其中具有显著长期加速/减速趋势的 23 颗源斜率为 1.16 ± 0.12）。该斜率与特征年龄 $\tau_c<10^4\,{\rm yr}$ 的年轻 RPP 斜率（1.10 ± 0.16）相近，两者对应的特征年龄均在 $\tau_c = P/(2\lvert\dot{P}\rvert)\sim 1$–$10\,{\rm kyr}$，但 HMXB 的自转周期比年轻 RPP 慢 2 到 3 个数量级。若外推当前加速率，脉冲星加速至 $P\sim 1\,{\rm s}$ 仅需 $t\sim 10^2$–$10^4\,{\rm yr}$（远短于伴星主序寿命 $\gtrsim 10^6$–$10^7\,{\rm yr}$），因而最终自转周期由吸积力矩准平衡 $R_{\rm mag}\approx R_{\rm co} = (GMP^2/4\pi^2)^{1/3}$ 决定，并在供体星经历第二颗超新星时破裂释放为孤立中子星。	Results
arXiv:2610.19313 2026-10-14	**Transients and Stellar Activity as Revealed by Ultraviolet Diagnostic Tracers** *Transients and Stellar Activity as Revealed by Ultraviolet Diagnostic Tracers* Richard de Grijs, Martin A. Barstow, Deepak Chahal 等	阐明了超新星激波破越（SBO）的辐射捕获破越临界物理判据为光深 $\tau \lesssim c/v$（发生层通常在 $10\lesssim\tau\lesssim100$），破越时产生持续 $\sim 10^{3-4}\,{\rm s}$ 的软 X 射线至 UV 辐射脉冲；三维模拟表明红巨星前身星的 SBO 辐射热光度达 $L_{\rm bol}\sim 10^{44}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，持续约 $3-6\,{\rm hr}$。在恒星耀斑方面，推断光球层热黑体辐射温度达 $T\approx 8500-50{,}000\,{\rm K}$，色球与过渡区低密度介质辐射由散射源函数 $S_\nu \simeq (1-\epsilon)J_\nu + \epsilon B_\nu$（$\epsilon\ll1$）主导；低质量恒星磁活动在罗斯贝数 $Ro\equiv P_{\rm rot}/\tau_{\rm conv}\lesssim 0.1$ 处呈现饱和区。	UV studies of Supernovae: An early-time perspective

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.18972 2026-10-14	**The Second Catalog of Low-Energy Fermi-LAT Sources** *The Second Catalog of Low-Energy Fermi-LAT Sources* The Fermi-LAT Collaboration	在检验统计量 $TS > 25$ 下证认出 450 个 20–200 MeV 伽马射线源，中位能通量为 $\tilde{F}_{20-200\,\mathrm{MeV}} = 1.90 \times 10^{-11}\,\mathrm{erg\,cm^{-2}\,s^{-1}}$。其中 377 个源与已知对应体关联（325 个河外源，以 FSRQ 为主，占比 67%；52 个银河系源，以脉冲星为主），73 个为未关联源（60 个为全新发现）。银河系源的光子谱指数显著硬于河外源（中位数 $\tilde{\Gamma}_{\mathrm{GAL}} = 1.48$ vs $\tilde{\Gamma}_{\mathrm{EGAL}} = 1.99$），整体能谱硬于 4FGL（$\tilde{\Gamma}_{\mathrm{2FLE}} = 1.96$ vs $\tilde{\Gamma}_{\mathrm{4FGL}} = 2.31$），并基于判据 $\frac{\lvert\Gamma_{\mathrm{2FLE}} - \Gamma_{\mathrm{4FGL}}\rvert}{\sqrt{\Gamma^2_{\mathrm{err,2FLE}} + \Gamma^2_{\mathrm{err,4FGL}}}} > 2$ 发现了 92 个候选能谱转折源。	2FLE Catalog description
arXiv:2610.18962 2026-10-14	**Identity Crisis: Untangling Mass-Ordering Artifacts from Compact-Object Pairing in Gravitational-Wave Populations** *Identity Crisis: Untangling Mass-Ordering Artifacts from Compact-Object Pairing in Gravitational-Wave Populations* Soumendra Kishore Roy, Asad Hussain, L. A. C. van Son 等	推导证明质量排序坐标折叠无法凭空产生量纲特征尺度；若条件质量比峰值满足 $q_{\mathrm{peak}}(m_1) = \mu/m_1 \propto m_1^{-1}$，则母体必存在真实的组分特征质量标度 μ。在 GWTC-5 高质量端（$m_1 \gtrsim 40\,\mathrm{M}_\odot$）推断中，次级质量轨迹满足 $m_{2,\mathrm{loc}} = m_q^{\alpha_q} m_1^{1-\alpha_q}$，测得 $\alpha_q = 1.2^{+0.8}_{-0.8}$ 与 $m_q = 49^{+9}_{-8}\,\mathrm{M}_\odot$，表明在 (m_1, m_2) 平面上存在平行于 m_1 轴、近乎恒定的水平脊线（$m_2 \simeq 50\,\mathrm{M}_\odot$），该特征尺度客观存在于未排序的物理母体中。	Introduction
arXiv:2610.18952 2026-10-14	**Nonlinear Perturbations of Relativistic Stars** *Nonlinear Perturbations of Relativistic Stars* K. J. Kwon, Abhishek Hegade K. R., Tejaswi Venumadhav 等	推导了 Regge-Wheeler 规范下二阶摄动的一阶常微分主方程 $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\cdot\mathbf{Y} + \mathbf{B}[\boldsymbol{S}]$，并在由对称算符 $\boldsymbol{I}_0$ 定义的本征模投影下导出了二阶振幅方程。该理论包含模-模 (κ_{abc})、模-潮汐 ($\kappa_{ab\ell m}$) 及相对论特有的潮汐-潮汐直接耦合 ($\kappa_{a\ell m\ell' m'}$)。针对 SLy4 物态方程计算的静态二次潮汐响应（二次 Love 数 p_{20}），在仅保留四极 f 模截断下即可逼近全数值度规匹配解，偏差仅约 $3.6\% \sim 4.7\%$，且在弱场极限下严格退化为牛顿公式。	Summary of Main Resultslabelsec:exec_summary
arXiv:2610.18840 2026-10-13	**Seeing Double: The Theory Defying Twin Flares of TDE 2022dbl** *Seeing Double: The Theory Defying Twin Flares of TDE 2022dbl* Xinze Guo, Ryan Chornock, Raffaella Margutti 等	TDE 2022dbl 发生于 $\log_{10}(M_{\mathrm{BH}}/M_\odot) = 6.01 \pm 0.45$ 的黑洞周围。第一次与第二次爆发黑体峰值光度分别为 $L_{\mathrm{bb}} = (6.24 \pm 0.24) \times 10^{43}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 与 $(2.117 \pm 0.067) \times 10^{43}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$，峰后 195.6 天内辐射能分别为 $(2.030 \pm 0.031) \times 10^{50}\,\mathrm{erg}$ 与 $(1.508 \pm 0.037) \times 10^{50}\,\mathrm{erg}$。第一次爆发峰值附近 H$\alpha$ 具有极宽谱线（FWHM $\approx$ 22000–22900 $\mathrm{km\,s^{-1}} \sim 0.07\,c$），约为第二次爆发（$\sim$ 9200–9600 $\mathrm{km\,s^{-1}}$）的两倍。理论预期于 ~ 700 d（2026年2月）出现的第三次耀斑并未探测到（$L_{\mathrm{bol}} \sim 1.1 \times 10^{42}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$，暗约 30 倍）；弹道式致密核重构模型计算表明，轨道能量正向反冲速度 $v_{\mathrm{kick}} \equiv \sqrt{2\Delta E} \sim 865\,\mathrm{km\,s^{-1}}$（对应重构时标 ~ 11 d）足以将再现周期延迟至未探测时刻，而将核心完全解离抛射则需 $v_{\mathrm{kick}} \sim 2400\,\mathrm{km\,s^{-1}}$。	VI Discussion
arXiv:2610.18687 2026-10-13	**The compact jets of the black hole X-ray binary Swift J1753.5-0127 during its 2023-2024 outburst** *The compact jets of the black hole X-ray binary Swift J1753.5-0127 during its 2023-2024 outburst* Noa Grollimund, Stéphane Corbel, Lauren Rhodes 等	爆发全过程射电通量密度表现为倒转谱（$S_\nu \propto \nu^\alpha$，AMI-LA 始终高于 MeerKAT）。多波段 SED 拟合给出吸积盘内径被显著截断（$R_{\mathrm{in}}/R_g > 181$–$369\,R_g$），喷流同步辐射转折频率 $\nu_{\mathrm{break}} \leq 4.8 \times 10^{12}$ Hz。校准后的 L_{R}–L_{X} 呈现典型的混合型折线幂律相关：在转折光度 $L_{\mathrm{trans}} = (1.4 \pm 0.6) \times 10^{36} (D/3.9\,\mathrm{kpc})^2\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 以下为平缓过渡支 $L_{\mathrm{R}} \propto L_{\mathrm{X}}^{\beta_{\mathrm{trans}}}$（$\beta_{\mathrm{trans}} = 0.28 \pm 0.03$），以上为陡峭离群支 $L_{\mathrm{R}} \propto L_{\mathrm{X}}^{\beta_{\mathrm{outl}}}$（$\beta_{\mathrm{outl}} = 1.06 \pm 0.11$）。射电谱指数 α 随 L_{X} 增加而变平乃至跌落至负值，依据非锥形绝热喷流模型（截面标度 $r(x) \propto x^a$），该演化对应喷流约束参数 a 随吸积率上升而减小，即喷流呈现更受限的几何结构。	3.2 Constructing a smooth $LmathrmX–LmathrmR$ plane for Swift J1753
arXiv:2610.18671 2026-10-13	**Multimessenger Constraints on Nuclear Acceleration in Neutrino-Emitting Seyfert Coronae** *Multimessenger Constraints on Nuclear Acceleration in Neutrino-Emitting Seyfert Coronae* Chengchao Yuan	中微子通量相对纯质子情形满足 $\mathcal{F}_\nu/\mathcal{F}_{\nu,p} \simeq (1 - f_{\mathrm{nuc}}) + f_{\mathrm{nuc}} r_\nu$。由于富氦的 Solar 模板在 3 TeV 处的中微子产额比 r_ν 显著高于 CNO 与 Fe 模板，其允许核成分份额接近 $f_{\mathrm{nuc}} \to 1$；而 CNO 与 Fe 模板在 NGC 1068 中受中微子探测与 $\mathcal{F}_\gamma(0.1\,\mathrm{GeV}) \leq 10^{-12}\,\mathrm{erg\,cm^{-2}\,s^{-1}}$ 伽马射线天花板约束，核份额上限为 $f_{\mathrm{nuc}} \sim 0.8$。在 NGC 7469 中增大 f_{nuc} 会显著削弱高能尾部。	IV Multimessenger results and constraints
arXiv:2610.18633 2026-10-13	**The ePESSTO+ census of ZTF nuclear transients. I. What flares in galactic nuclei?** *The ePESSTO+ census of ZTF nuclear transients. I. What flares in galactic nuclei?* E. Concepción, T. Petrushevska, G. Leloudas 等	在 476 个核区瞬变源候选体中，202 个获得光谱分类（SN Ia 占 67%、SN II 占 16%、SN Ib/c 占 4%、TDE 占 5% 即 10 例）。TDE 表现出持久蓝色且极慢的红化速率 $\Delta(g-r)/\Delta t = 0.0022 \pm 0.0006\,\mathrm{mag\,day^{-1}}$，比超新星变红速率（$0.0120$–$0.0339\,\mathrm{mag\,day^{-1}}$）慢约一个数量级；TDE 全光变平均颜色为 $g - r = -0.25 \pm 0.05$ mag（峰前为 -0.26 ± 0.04 mag），而各类超新星均显著偏红（SN Ia 为 0.08 ± 0.02 mag，SN II 为 0.35 ± 0.05 mag，SN Ib/c 为 0.49 ± 0.19 mag）；TDE 无红移修正中位数上升时标为 $t_{\mathrm{rise}} = 34.0 \pm 6.1$ days，显著长于 SN Ia（16.5 ± 1.4 days）与 SN II（15.9 ± 2.6 days）。	3.2 Photometric properties and transient classification

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.18476 2026-10-13	**Broadband non-thermal emission predictions based on 3D simulations of supernova explosions within active galactic nuclei jets** *Broadband non-thermal emission predictions based on 3D simulations of supernova explosions within active galactic nuclei jets* B. Longo, V. Bosch-Ramon, M. Perucho 等	相互作用在弓激波区域加速相对论电子，同步辐射峰值位于X射线波段，总光度达数个 $10^{41}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$（对应通量略低于 $10^{-11}\,\mathrm{erg\,cm^{-2}\,s^{-1}}$）；逆康普顿散射星系红外光子在 $\sim 1\,\mathrm{TeV}$ 达到峰值，光度约 $10^{40}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$。质子与重核可被加速至最高能量 $E_{\max} \sim 10\,\eta_B^{}Z\,\mathrm{EeV}$。	4.1 Spectral energy distribution
arXiv:2610.18322 2026-10-13	**Two sides of the same spin: tracking optical and radio pulsations of SAX J1808.4-3658 from outburst to quiescence** *Two sides of the same spin: tracking optical and radio pulsations of SAX J1808.4-3658 from outburst to quiescence* C. Ballocco, A. Miraval Zanon, A. Papitto 等	2022 年爆发期探测到去消光 V 波段相干光学脉动，光度分别为 $L^{\mathrm{V,O1}}_{\mathrm{pulsed}} \approx (1.15 \pm 0.13) \times 10^{30}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 与 $L^{\mathrm{V,O2}}_{\mathrm{pulsed}} \approx (1.38 \pm 0.13) \times 10^{30}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$。光学脉动显著滞后于 X 射线脉动，测得相位差分别为 $\delta\phi_{\mathrm{O1}} = 0.353 \pm 0.017$ 和 $\delta\phi_{\mathrm{O2}} = 0.205 \pm 0.013$（对应时延 $\delta\tau_{\mathrm{O1}} = 0.88 \pm 0.04\,\mathrm{ms}$ 与 $\delta\tau_{\mathrm{O2}} = 0.51 \pm 0.03\,\mathrm{ms}$）。光学脉动通量与 X 射线光度呈反相关（光学振幅随 X 射线流量增大由 0.55% 降至 0.28%，定标为 $L^{\mathrm{opt}}_{\mathrm{pulsed}} \propto \dot{M}^{-4/7}$，对应磁层截断半径 $R_{\mathrm{m}} \propto \dot{M}^{-2/7}$）。宁静态下未探测到相干脉动，测定光学脉动光度上限为 $L^{\mathrm{V,UL}}_{\mathrm{pulsed}} < 2.2 \times 10^{29}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$（光学脉冲辐射效率 $\eta < 1.2 \times 10^{-5}$），MeerKAT 射电折叠搜索流量密度上限为 $9\,\mu\mathrm{Jy}$。	5 Discussion and conclusions
arXiv:2610.18315 2026-10-13	**Cell-based theoretical criteria on the onset and stability limit of thermonuclear detonation** *Cell-based theoretical criteria on the onset and stability limit of thermonuclear detonation* Kazuya Iwata, Keiichi Maeda, Ken J. Shen	给出了球面爆轰临界曲率直径 $d_{\mathrm{cri}} \approx 13\lambda$，推导出包层稳定传播的临界压力标高阈值为 $H_{\mathrm{p,crit}} = 0.556\lambda$；低密度包层最小起爆能量标度为 $E_{\min} = \frac{2197}{16}\pi\rho_{\mathrm{ini}}I_1D_{\mathrm{CJ}}^2\lambda^3$（$I_1 = 0.423$），并在高密核心引入内能修正 $E_{\min} \equiv \frac{4}{3}\pi(d_{\mathrm{cri}}/2)^3\frac{1}{2}\rho_{\mathrm{ini}}(\varepsilon_{\mathrm{int}} + V_{\mathrm{CJ}}^2)$；对于 CO 核心，标定出碳和氧特征胞格尺度 $\lambda_{\mathrm{C}} = 27.5L_{\mathrm{C}}$ 与 $\lambda_{\mathrm{O}} = 36.5L_{\mathrm{O}}$，证实完全起爆需满足氧尺度阈值；证明纯氦包层在 $\lesssim 0.01\,M_\odot$ 时 $E_{\min} \sim 10^{48-51}\,\mathrm{erg}$ 难以起爆，而碳掺杂通过质子催化 α 捕获可使临界包层质量降至 $\sim 10^{-3}\,M_\odot$。	II.2 Minimum initiation energy
arXiv:2610.18208 2026-10-13	**Fast Radio Bursts from Monster Shocks and Flares of Inspiraling Binary Neutron Stars: A Kinetic Model for Double Pulsar** *Fast Radio Bursts from Monster Shocks and Flares of Inspiraling Binary Neutron Stars: A Kinetic Model for Double Pulsar* Jan Benáček, Benoît Cerutti, Martin Pohl 等	数值模拟表明，双中子星轨道运动会切断闭合磁环并形成向外传播的快磁声波（FMSW），越过轨道光圆柱半径 $R_{\mathrm{LC}} = c/\Omega_{\mathrm{orb}} \approx 114\,\mathrm{km} \approx 9.5R_\star$ 后陡化为非线性的“怪兽激波（monster shock）”，伴随等离子体火球与重联电流片。轨道坡印亭通量变化可达 $\Delta L_{\mathrm{orb}} \approx B_\star^2R_{\mathrm{NS}}^6\Omega_{\mathrm{orb}}^6D^2/(2c^5) \approx 3 \times 10^{40}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$。在射电转换效率 $\xi = 10^{-3}$ 条件下，激波释放能量对应各向同性等效射电光度上限可达 $L_{\mathrm{iso}} \approx 2 \times 10^{40}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$，特征持续时标约 $0.1R_{\mathrm{LC}}/c \approx 38\,\mu\mathrm{s}$，能合理解释毫秒/微秒级 FRB 辐射特征。	II Methods and Results
arXiv:2610.18146 2026-10-13	**Low-frequency spectra and scattering of pulsars towards the Gum Nebula with the MWA** *Low-frequency spectra and scattering of pulsars towards the Gum Nebula with the MWA* Ting Yu, Zhifu Gao, Zhongli Zhang 等	所有 6 颗脉冲星的低频能谱均偏离单一幂律；若将低频翻转归因于自由-自由吸收（FFA），其峰频 $\nu_{\mathrm{peak}} = \nu_0(-2.1\tau_0/\alpha)^{1/2.1}$ 要求吸收介质发射测度高达 $\mathrm{EM} \sim 10^4$–$10^5\,\mathrm{pc\,cm^{-6}}$（$T_{\mathrm{e}} = 3 \times 10^3$–$10^4\,\mathrm{K}$），对应的光深为 $\tau_{\mathrm{ff}}(\nu_{\mathrm{peak}}) = -\alpha/2.1 \simeq 0.7$–$1.2$，远超古姆星云平滑壳层预期的 $\mathrm{EM} \sim 3$–$35\,\mathrm{pc\,cm^{-6}}$（在 $200\,\mathrm{MHz}$ 处 $\tau_{\mathrm{ff}} \lesssim 2.8 \times 10^{-3}$）。在散射展宽标度律 $\tau_{\mathrm{sc}} \propto \nu^{\alpha_{\mathrm{sc}}}$ 方面，PSR J0737−3039A 与 J0837−4135 符合经典薄屏 ν^{-4}，而 PSR J0742−2822（$\alpha_{\mathrm{sc}} = -3.07 \pm 0.11$）、Vela 脉冲星（厚屏模型 $\alpha_{\mathrm{sc}} = -2.74 \pm 0.03$）和 PSR J0820−4114（联合拟合 $\alpha_{\mathrm{sc}} = -1.59^{+0.43}_{-0.45}$）显著平于 -4。虽然微观湍流预言散射测度与发射测度满足标度关系 $\mathrm{SM} \propto F\,\mathrm{EM}$，但观测显示吸收与散射在源际间并不具一一对应关系，反映出两者由视线上不同几何分布的等离子体结构主导。	4.4 Are absorption and scattering produced by the same structures?
arXiv:2610.18103 2026-10-13	**Finite-Temperature Equations of State for Neutron-Star Mergers within the Quark Mean-Field Model** *Finite-Temperature Equations of State for Neutron-Star Mergers within the Quark Mean-Field Model* Shuochong Han, Xiangdong Sun, Zhenyu Zhu 等	QMF 模型的有效标量耦合随密度增大而减弱，高密区有效质量 m^*/m 趋缓并显著高于 RMF，在 $\rho_{\mathrm{b}} > 0.3$–$0.4\,\mathrm{fm^{-3}}$ 区间预言出更高的同位旋不对称度 β、更低的质子/轻子丰度 Y_e, Y_μ。热压 $P_{\mathrm{th}} = P(\rho_{\mathrm{b}},\beta,T) - P(\rho_{\mathrm{b}},\beta,0)$ 在 QMF 下相对 RMF 较低；借助 KAN 获得了关于 $(\rho_{\mathrm{b}},\beta,T)$ 的热指数 $\Gamma_{\mathrm{th}} = 1 + \frac{P_{\mathrm{th}}}{\varepsilon_{\mathrm{th}}}$ 解析拟合，最大相对偏差约 1%。	V.4 Implications for NS Mergers
arXiv:2610.17647 2026-10-13	**The Promise of Gravitational-Wave Astronomy** *The Promise of Gravitational-Wave Astronomy* Parameswaran Ajith	基于当前引力波观测数据，局域宇宙（$z \sim 0$）致密双星事件率密度定标为：双中子星 $\mathcal{R}_{\mathrm{BNS}} \sim 5.1 - 154.7\,\mathrm{yr^{-1}\,Gpc^{-3}}$，双黑洞 $\mathcal{R}_{\mathrm{BBH}} \sim 27.5 - 49.4\,\mathrm{yr^{-1}\,Gpc^{-3}}$，中子星-黑洞 $\mathcal{R}_{\mathrm{NS-BH}} \sim 6.7 - 32.8\,\mathrm{yr^{-1}\,Gpc^{-3}}$；在核心坍缩超新星中，3D模拟显示核心坍缩近乎球对称且绝大部分重力结合能转化为中微子辐射，GW爆发反映原初中子星振荡；大质量黑洞极端质量比旋进（EMRI）在跌入视界前可积累 $N_{\mathrm{cyc}} \sim 10^4 - 10^5$ 个相对论轨道周期的波形相位。	2.3 Core-collapse supernovae

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.17618 2026-10-13	**Observational evidence of black hole event horizon from ultra-compact X-ray binaries** *Observational evidence of black hole event horizon from ultra-compact X-ray binaries* Qian-Qi Ma, Wei-Min Gu, Shan-Shan Weng 等	黑洞候选体 47 Tuc X-9 的平均辐射效率为 $\eta < 3 \times 10^{-4}$，比同吸积率量级（$\dot{M} \sim 10^{16}\,\mathrm{g\,s^{-1}}$）的中子星系统（如 M15 X-2，$\eta > 0.05$）低 2 到 3 个数量级；观测总光度满足 $L_{\rm tot} = L_{\rm flow} \ll \frac{GM\dot{M}}{2R_{\rm ISCO}}$，证明平流热能被黑洞事件视界吞噬，而非像中子星那样在硬表面碰撞释放。	Observational evidence of black hole event horizon from ultra-compact X-ray binaries
arXiv:2610.17423 2026-10-13	**Internal Nucleon Properties and the Equation of State of Ultra-Dense Matter** *Internal Nucleon Properties and the Equation of State of Ultra-Dense Matter* Bikram Keshari Pradhan, Jérôme Margueron, Guy Chanfray 等	研究发现通过孤立核子模型直接映射至均匀超密夸克物质存在根本矛盾：在孤子中心区域，机械压强 $p^{\rm mec}$ 与热力学压强 $p^{\rm th} = n^2 \frac{\partial(\varepsilon/n)}{\partial n}$ 显著分离，且两者压强变号的临界密度定性不一致。在因果律限制 $c_s^2 = \frac{dp}{d\varepsilon} \leq 1$ 方面，Belinfante 热力学压强 $p^{\rm th}_{\rm Bel}$ 在全密度范围违背因果律（超光速），正则压强 $p^{\rm mec}_{\rm can}$ 和 $p^{\rm th}_{\rm can}$ 分别在 $\varepsilon \gtrsim 2.4\,\mathrm{GeV\,fm^{-3}}$ 和 $1.6\,\mathrm{GeV\,fm^{-3}}$ 时打破因果律极限，偏离微扰 QCD 趋近共形极限 $c_s^2 = 1/3$ 的理论预期。	4 Conclusions
arXiv:2610.17280 2026-10-13	**Discovery of 51 pulsars in a reanalysis of the Green Bank North Celestial Cap Survey and a revised pulsar census** *Discovery of 51 pulsars in a reanalysis of the Green Bank North Celestial Cap Survey and a revised pulsar census* R. Sengar, L. Vleeschower, D. L. Kaplan 等	通过对 GBNCC 巡天的再分析确认了 51 颗新脉冲星，其中 50 颗为经典/慢脉冲星（自转周期 $P \in [0.299, 4.424]$ s，$\mathrm{DM} \in [10.85, 192.80]\,\mathrm{pc\,cm^{-3}}$），1 颗为双星毫秒脉冲星 PSR J2147−3604（$P \approx 3.2$ ms，轨道周期 $P_{\rm orb} \approx 4.5$ d）。新发现脉冲星的 350 MHz 流量密度中位数为 $S_{350} = 0.71$ mJy，将 GBNCC 巡天脉冲星探测普查总数提升至 964 颗。此外，PSRs J0947−2525、J1818+3305 与 J2123+3239 的观测色散量均超过 NE2025、NE2001 和 YMW16 银河电子模型预测的视线最大值 $\mathrm{DM}_{\rm max}$，且折叠增益呈现出高次谐波求和更为显著的特性，即 $(S/N)_{\rm fold}/(S/N)_{\rm FFT}$ 随谐波阶数 $n_{\rm h}$ 增加而增大。	IV.3 Pulsar properties
arXiv:2610.17248 2026-10-13	**Scaling Up: A Global Optical/X-ray Correlation For Reprocessing Across Black Hole Masses** *Scaling Up: A Global Optical/X-ray Correlation For Reprocessing Across Black Hole Masses* Changhyun Cho, David M. Russell, Aaryan Sharma 等	发现了横跨XRB与AGN黑洞质量尺度的全局光学/X射线再辐射定标关系：自由拟合得到 $\log L_V = (0.53 \pm 0.13)\log L_X + (0.87 \pm 0.20)\log a_R + c$；固定 $\beta = 0.5$ 后为 $\log L_V = 0.48\log L_X + 0.96\log a_R + 6.47$（皮尔逊系数 $R = 0.998$，本征弥散仅 0.143 dex）；引入几何薄盘投影面积倾角修正后为 $\log L_V = 0.46\log L_X + 0.92\log(a_R\cos i) + 7.99$（本征弥散降至 0.127 dex），证实几何薄盘热再辐射机制在恒星级与超大质量黑洞中普遍适用。	IV.1 The Global Optical/X-ray Correlation
arXiv:2610.17247 2026-10-13	**Radio and Gamma-Ray Timing of a Newly Discovered Millisecond Pulsar** *Radio and Gamma-Ray Timing of a Newly Discovered Millisecond Pulsar* L. Vleeschower, R. Sengar, L. Nieder 等	测定 PSR J2147−3604 自转周期 $P \approx 3.20$ ms，色散量 $\mathrm{DM} = 17.02\,\mathrm{pc\,cm^{-3}}$；处于双星系统，轨道周期 $P_b = 4.514755965(5)$ d，偏心率极低 $e = 1.9(1) \times 10^{-5}$，投影半长轴 $x_{\rm p} \approx 3.5$ lt-s；伴星中值质量为 $M_{\rm c,med} \approx 0.22\,M_\odot$（假设脉冲星质量 $1.5\,M_\odot$），符合低质量 X 射线双星轨道周期–氦白矮星质量标度关系；测得观测旋转量为 $\mathrm{RM} = 18.5 \pm 5.1\,\mathrm{rad\,m^{-2}}$（扣除电离层贡献后约为 $21.1\,\mathrm{rad\,m^{-2}}$）；动力谱闪烁带宽 $\Delta\nu_d = 4.5(3)$ MHz，调制指数 $m_{\rm DISS} \simeq N_{\rm scint}^{-1/2} \sim 0.2$–$0.4$。	III.3 Joint radio and gamma-ray timing
arXiv:2610.17230 2026-10-13	**Universal relations for hybrid stars and their quark cores: a systematic scan of the quark-matter parameter space** *Universal relations for hybrid stars and their quark cores: a systematic scan of the quark-matter parameter space* J. P. Carlomagno, G. A. Contrera, A. G. Grunfeld 等	混合星全局表面可观测量与纯强子中子星普适关系极其一致，其 I-Love 关系偏差在全参数空间中均 $< 0.5\%$，$\bar{I}_S$--$\mathcal{C}_S$ 偏差 $< 3\%$；在夸克核边界处，无量纲潮汐形变度标度为 $\Lambda_C \propto \mathcal{C}_C^{-4}$（区别于真空中自束缚天体的 $\mathcal{C}^{-5}$），其依赖关系高度因子化为 $\Lambda_C \mathcal{C}_C^4 = \frac{2+\alpha}{15} f(\mathcal{C}_C)$，其中 α 仅依赖界面参数 $\xi \equiv p_{\rm tr}/\varepsilon_+$ 与相变界面声速 $c_{s,+}^2$；同时发现 54,550 个稳定混合星构型的相界面分数质量与半径服从严格的双参数通用剖面：$\frac{M_{g,C}}{M_{g,S}} = 2.498\left(\frac{R_C}{R_S}\right)^3 - 1.498\left(\frac{R_C}{R_S}\right)^5$。	IV Universal and quasi-universal relations for star and core
arXiv:2610.17218 2026-10-13	**From Giant Envelopes to Rapidly Contracting Cores in Rotating Population III Stars from 500 to $1000 \, M_\odot$** *From Giant Envelopes to Rapidly Contracting Cores in Rotating Population III Stars from 500 to $1000 \, M_\odot$* Devesh Nandal, John Chisholm, Daniel J. Whalen 等	恒星在 ZAMS 具有占比高达 93%–95% 的对流核（466–950 $M_\odot$）。从 He 耗尽至 Si 耗尽，晚期极短燃烧时标使角动量输运与化学混合完全冻结；中心角速度激增约 340 倍（至 $\Omega_{\rm c} \simeq 3.99 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$，与表面相差 7.6×10^4 倍），但内层 $5\,M_\odot$ 的比角动量变化不足 1‰。在假定坍缩形成黑洞的情形下，最内稳定圆轨道处比角动量阈值 $j_{\rm ISCO,ext} = \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{GM_r}{c}$，模型内部最大赤道比角动量比值仅为 $\max(j_{\rm eq}/j_{\rm ISCO,ext}) = 0.313$（位于 $M_r = 191.95\,M_\odot$），无法满足离心环化形成吸积盘的条件。此外，在 $1000\,M_\odot$ 模型的全局中绝热指数始终满足 $\Gamma_1 > 4/3$（$\Gamma_{1,\min} = 1.34082$），未发生对不稳定爆发。	III.4 Rotation and angular momentum evolution
arXiv:2610.17140 2026-10-12	**The nearby Type II supernova 2024ggi beyond 600 days: circumstellar interaction and dust formation** *The nearby Type II supernova 2024ggi beyond 600 days: circumstellar interaction and dust formation* L. Ferrari, G. Folatelli, C. P. Gutiérrez 等	多波段测光显示光变曲线在 $600 \sim 650$ d 发生变平（flattening），脱离了 $^{56}\mathrm{Co} \to {}^{56}\mathrm{Fe}$ 的放射性衰变率；光谱在 706 d 与 811 d 展现出延伸至 $v \approx \pm 8000\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ 的盒状（boxy）Hα 轮廓，红翼明显受抑；辐射转移模拟测得冷致密壳层（CDS）几何厚度比为 $R_{\rm in}/R_{\rm out} \simeq 0.7$，形成的新生尘埃质量为 $M_{\rm dust} \sim 5 \times 10^{-6}$–$5 \times 10^{-5}\,M_\odot$（碳质或碳-硅酸盐混合）或 $\sim 10^{-3}\,M_\odot$（纯硅酸盐），扫过的 CSM 位于 $r \sim (4$–$7) \times 10^{16}$ cm，对应爆发前 $\sim 10^3$ yr 的恒星风物质。	4 Conclusion

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.17033 2026-10-12	**Cosmic Colliders in Binary Blazars Probing Ultra-High-Energy Particle Physics** *Cosmic Colliders in Binary Blazars Probing Ultra-High-Energy Particle Physics* Giorgio Galanti	次秒差距双耀变体喷流在小偏角（$\theta_{\rm mis}\sim 1^\circ-6^\circ$）驱动下发生束流对撞，质心系能量可达 $\sqrt{s}\sim 10^{10}\,\mathrm{GeV}$；相互作用区质子光深维持在 $3\times10^{-3}\lesssim\tau_{pp}\lesssim 0.13\ll 1$，处于光学薄区；高能极限下次级粒子能量满足 $E'_\nu\simeq E'_\gamma/2$，全味中微子与光子产额比满足 $\frac{\mathrm{d}^2N_\nu}{\mathrm{d}E'_\nu\mathrm{d}\sqrt{s}}=\eta_{\nu\gamma}\frac{\mathrm{d}^2N_\gamma}{\mathrm{d}E'_\gamma\mathrm{d}\sqrt{s}}$（其中 $\eta_{\nu\gamma}\simeq 1.25$）；非对称喷流碰撞会在 $E'_\nu\sim(10^7-10^8)\,\mathrm{GeV}$ 处产生阶梯状能谱折折（knee/ankle），构成特有的超高能中微子观测印记。	Cosmic Colliders in Binary Blazars Probing Ultra-High-Energy Particle Physics
arXiv:2610.17013 2026-10-12	**Indirect Dark Matter Detection in the Multi-Messenger Era: Experiments, Systematics, Anomalies, and Prospects for Discovery** *Indirect Dark Matter Detection in the Multi-Messenger Era: Experiments, Systematics, Anomalies, and Prospects for Discovery* Muad Ghaith, Khaled Obaideen	论文系统汇总了间接探测的核心参数限制：自共轭暗物质 s 波湮灭的 CMB 能量注入参数上限为 $p_{\rm ann}=f_{\rm eff}\frac{\langle\sigma v\rangle}{m_\chi}<3.2\times10^{-28}\,\mathrm{cm^3\,s^{-1}\,GeV^{-1}}$（Planck 2018，95% CL）；伽马谱线搜索在 1 TeV 处达到 $\langle\sigma v\rangle\approx 2.3\times10^{-28}\,\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$（H.E.S.S.，Einasto 轮廓）；AMS-02 正电子超出测得源截断为 $810^{+310}_{-180}\,\mathrm{GeV}$；太阳中微子探测排除了自旋相关散射截面 $\sigma_{\rm SD}\sim$ 数 $\times10^{-41}\,\mathrm{cm^2}$；各向同性伽马背景在 $>50\,\mathrm{GeV}$ 处已有 $86\%(+16/-14\%)$ 被点源解析。	10 A Multi-Messenger Discovery Framework
arXiv:2610.16899 2026-10-12	**Double Detonations on a Moving Mesh with $\texttt{Cattails}$: Characterizing Early Reddening in SNe Ia** *Double Detonations on a Moving Mesh with $\texttt{Cattails}$: Characterizing Early Reddening in SNe Ia* Dillon Hasenour, Paul Duffell, Abigail Polin	推导出早期红化极大时间的扩散标度律为 $t_{\rm red}\sim\sqrt{\frac{\kappa M_{\rm shell}}{4\pi c v_{\rm shell}}}\approx 10\,\mathrm{d}\sqrt{M_{\rm shell}/M_\odot}$，并针对薄壳偏差引入带指数截断的拟合关系：$t_{\rm red}(M_{\rm shell})=t_0e^{-(m_0/M_{\rm shell})^5}\sqrt{M_{\rm shell}/M_\odot}$，其中 $t_0(B-V)=17.39\,\mathrm{d}\,(M_{\rm tot}/M_\odot)^{-0.95}$，$m_0(B-V)=0.0265\,M_\odot\,(M_{\rm tot}/M_\odot)^{-5.6}$；同时给出峰值绝对星等与总质量的经验关系 $B_{\rm mag}=-20.5+1.34\,(M_{\rm tot}/M_\odot)^{-4.33}$ 及 $g_{\rm mag}=-20.5+1.18\,(M_{\rm tot}/M_\odot)^{-4.52}$。	V Reddening and Mass Relations
arXiv:2610.16296 2026-10-12	**Direct Observational Constraint on Upstream Magnetic Field Amplification Reveals the Particle Acceleration Limit in a Supernova Remnant** *Direct Observational Constraint on Upstream Magnetic Field Amplification Reveals the Particle Acceleration Limit in a Supernova Remnant* Yuya Kawabata, Takaaki Tanaka, Hiromasa Suzuki 等	通过激波前锋外 X 射线热点的径向分布，测得高能质子的特征扩散长度为 $l_{\rm diff}\sim 1\,\mathrm{pc}$。在假定粒子束缚达到玻姆极限（回旋因子 $\eta=1$）条件下，基于次级电子同步辐射模型推导出激波上游磁场强度为 $B_{\rm up}\sim 10\,\mu\mathrm{G}$： $$B_{\rm up}=14\eta\left(\frac{\varepsilon_{\rm sync}}{1\,\mathrm{keV}}\right)^{1/2}\left(\frac{B_{\rm clump}}{1\,\mathrm{mG}}\right)^{-1/2}\left(\frac{V_{\rm sh}}{3000\,\mathrm{km\,s^{-1}}}\right)^{-1}\left(\frac{l_{\rm diff}}{1\,\mathrm{pc}}\right)^{-1}\mu\mathrm{G}$$ \n结合遗迹年龄 $t_{\rm age}\sim 1600$–$2000\,\mathrm{yr}$ 与激波速度 $V_{\rm sh}\sim 3000\,\mathrm{km\,s^{-1}}$，受限的最大质子能量为：\n $$E_{\rm max}=96\eta^{-1}\left(\frac{B_{\rm up}}{14\,\mu\mathrm{G}}\right)\left(\frac{V_{\rm sh}}{3000\,\mathrm{km\,s^{-1}}}\right)^2\left(\frac{t_{\rm age}}{1600\,\mathrm{yr}}\right)\,\mathrm{TeV}\sim 100\,\mathrm{TeV}$$ \n表明当前上游磁场放大不足以将粒子加速到 $\sim 1\,\mathrm{PeV}$，独立解释了该 SNR 在 TeV 伽马射线能谱中观测到的截断现象。	Results and Discussion
arXiv:2610.16130 2026-10-12	**Equation of State Classification of Core-Collapse Supernovae with a Network of Gravitational-Wave Detectors** *Equation of State Classification of Core-Collapse Supernovae with a Network of Gravitational-Wave Detectors* A. Akhmetali, Y. S. Abylkairov, J. A. Font 等	基于 10 种核物质 EOS 的分类表明：对于 2G 网络，银心方向（$d=8.2\,\mathrm{kpc}$）在有利到达时间下有效分类距离可达 $\sim 20\,\mathrm{kpc}$，不利时间降至 $\sim 3\,\mathrm{kpc}$；多探测器协同显著平滑天线盲区，全天归一化平均准确率 AUC 从 HL 的 0.67 提升至 HLVKA 的 0.76，全天天区覆盖率从 0.69（HL）提升至 0.93（HLVKA）。对于 3G 网络，有利到达时间下 ET+CE40 的分类探测距离达 $\sim 100\,\mathrm{kpc}$（覆盖大麦哲伦云 LMC 距离 $d\approx 49.8\,\mathrm{kpc}$），而不利时间下完整 3G 网络（ET+CE20+CE40）的分类距离仍可维持在 $\sim 20\,\mathrm{kpc}$。在近距离（$d=2\,\mathrm{kpc}$）下，10-EOS 分类准确率为 94%，排除存在波形简并的 3 种 EOS 后 7-EOS 准确率达 99%。	IV. RESULTS
arXiv:2610.16097 2026-10-12	**Radiation-Regulated Spherical Accretion with an Inner Accretion Disk** *Radiation-Regulated Spherical Accretion with an Inner Accretion Disk* Cheng-Liang Jiao, Liying Zhu, Xiang-dong Shi 等	吸积流外边界出射光度被自洽调节至广义爱丁顿极限附近 $L_{\rm out}\approx L_{\rm crit}\approx L_{\rm Edd}$，其中 $L_{\rm crit}=L_{\rm Edd,\kappa}\left(\frac{r}{r-r_{\rm S}}\right)^2\left(1-\frac{g_{\rm gas}}{g}\right)$。内部吸积盘的辐射反馈限制了吸积率，存在由 $L_{\rm in}(\dot{M}_{\rm sat})=L_{\rm crit}(r_{\rm in})$ 确定的饱和吸积率 $\dot{M}_{\rm sat}\approx 26.62L_{\rm Edd}/c^2$；当外边界环境密度满足 $\rho_{\rm out}\gg\frac{35.5aT_{\rm out}^4}{c^2}$ 时吸积率进入饱和态，入流比焓降转化为辐射光度，使得内盘仅需输入光度 $L_{\rm in}\approx L_{\rm Edd}-\frac{4aT_{\rm out}^4\dot{M}}{3\rho_{\rm out}}$。	4. SUMMARY AND CONCLUSION
arXiv:2610.15946 2026-10-12	**Constraints on the r-process Delay Time from Dwarf Spheroidal Galaxies** *Constraints on the r-process Delay Time from Dwarf Spheroidal Galaxies* Lauren E. Henderson, Evan N. Kirby, Mithi A. C. de los Reyes 等	若双中子星并合（NSMs）是唯一的 r-过程源，其最小延迟时间必须缩短至 $t_{\rm min,NSM}=14$–$16\,\mathrm{Myr}$（Fornax 星系中甚至达 $11^{+2}_{-1}\,\mathrm{Myr}$），这与双星演化及引力辐射吸积时延理论相冲突，强烈支持早期存在快 r-过程源（如磁转动超新星 MRSNe）；同时，理论 NSM 产额必须对轻 r-过程元素进行下调，Sr 和 Y 需分别减少约 5 倍和 50 倍（$\mathrm{normSr_{NSM}}\approx 0.2$, $\mathrm{normY_{NSM}}\approx 0.02$）。对于 Ia 型超新星，其最小时延拟合限制在 $t_{\rm min,Ia}\approx 50$–$100\,\mathrm{Myr}$。	4.3. NSM minimum delay time

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.15779 2026-10-12	**Rotating Vector Model predictions in millisecond pulsar magnetospheres with dipole and quadrupole field components** *Rotating Vector Model predictions in millisecond pulsar magnetospheres with dipole and quadrupole field components* Anna V. Bilous	数值积分表明：(1) 随四极分量比值 $f_{\rm Q} \equiv B_{\rm Q}/B_{\rm D}$ 增大，OFLR 发生复杂的拓扑跃迁，在正交大倾角（如 $\theta_{\rm D} = 80^\circ$）下北 OFLR 分裂为两个独立的水滴状区域；(2) 局域辐射因场线聚束效应（bunching）可呈现紧密的 PA 轨迹，且在限制发射高度切片下能被经典偶极 RVM 极佳拟合，但在多极场作用下会导致真实的偶极倾角与观测角 $(\theta_{\rm D}^{\rm true}, \theta_{\rm obs}^{\rm true})$ 与拟合参数产生显著简并和严重系统偏差；(3) 发射高度依赖性会导致天球图中出现多条分离或重叠的 PA 轨迹。	6 Biases in dipolar RVM fits to quadrupole-modified PA curves
arXiv:2610.15713 2026-10-12	**Bayesian exploration of weakly interacting models of dark matter admixed neutron stars based on multi-density constraints** *Bayesian exploration of weakly interacting models of dark matter admixed neutron stars based on multi-density constraints* Payaswinee Arvikar, Prashant Thakur, Sarmistha Banik	在单流体近似下，Higgs 门户模型约束暗物质粒子质量为 $\log_{10}(m_\chi/\mathrm{MeV}) = 3.38^{+1.05}_{-0.87}$（中位值约为 $2.4\,\mathrm{GeV}$），其有效相互作用耦合 $y = 0.104^{+0.062}_{-0.063}$；ALP 模型中核物质偏度系数被显著限制在 $Q_0 = -927.57^{+69.23}_{-55.54}\,\mathrm{MeV}$。各模型预言的最大质量相近（$M_{\rm max} \approx 2.09 - 2.13\,M_\odot$），但在 $1.4\,M_\odot$ 处 Higgs 门户模型呈现更紧致结构（$R_{1.4} = 12.24\,\mathrm{km}$，$\Lambda_{1.4} \approx 361$）及更高的 f 模振荡频率（$\nu_{f,1.4} = 1.83\,\mathrm{kHz}$）。贝叶斯证据量排序显示中子衰变与 ALP 方案优于 Higgs 门户模型。	3 Results and Discussions
arXiv:2610.15569 2026-10-12	**Mapping the Contracting Corona in GS 1354-64 with Insight-HXMT and XRISM: Evolving X-ray Lags and Quenched Reflection across a Complete State Transition** *Mapping the Contracting Corona in GS 1354-64 with Insight-HXMT and XRISM: Evolving X-ray Lags and Quenched Reflection across a Complete State Transition* Kaushik Chatterjee, Min Wei, Jie Liao 等	GS 1354-64 经历了完整的硬到软态转变：光子谱指数从硬态的 $\Gamma \simeq 2.4 - 2.5$ 迅速软化至软中间态峰值 $\Gamma \approx 3.05$（伴随吸积盘内区温度升至 $kT_{\rm in} \simeq 0.90 - 1.21\,\mathrm{keV}$，硬态高能截断能 $E_{\rm cut} \approx 40\,\mathrm{keV}$）；Type-C QPO 中心频率由 $\nu_{\rm QPO} \approx 0.30\,\mathrm{Hz}$ 加速单调上升至 $6.52\,\mathrm{Hz}$，其分数均方根振幅 RMS 随能量增强（LE $3.4\% - 11.5\%$，ME $9.2\% - 25.8\%$）；高能波段（ME 10–30 keV、HE 27–250 keV）相对于 2–4 keV 参考段的时延在硬态表现为显著的正硬延迟（最高达 $\tau \sim 160\,\mathrm{ms}$），随 $\nu_{\rm QPO}$ 升高至 $\approx 6.09\,\mathrm{Hz}$ 骤降并收敛于零（$\tau \approx 0$）；XRISM 观测同时证实硬态显著的宽 Fe Kα 相对论反射特征在软态完全淬灭（$R_{\rm refl} \approx 0$）。	IV.3.2 Energy and Temporal Evolution of X-ray Lags
arXiv:2610.14987 2026-10-12	**The R-Process Alliance: On J0010$-$1735, an Accreted, Chemically Unusual, Metal-poor Star with R-process Enhancement** *The R-Process Alliance: On J0010$-$1735, an Accreted, Chemically Unusual, Metal-poor Star with R-process Enhancement* Zoe Hackshaw, Rana Ezzeddine, Shivani P. Shah 等	测定 J0010−1735 的金属丰度为 $[\mathrm{Fe/H}] = -2.22 \pm 0.11$（LTE），并呈现极强的快中子俘获过程增强 $[\mathrm{Eu/Fe}] = +1.30$ 以及 $[\mathrm{Ba/Eu}] = -0.45$；铁峰元素显著匮乏（如 $[\mathrm{Mn\,I/Fe}] = -0.77$、$[\mathrm{Ni/Fe}] = -0.48$），与前身星质量约为 0.88–0.97 $M_\odot$ 的亚钱德拉塞卡质量（sub-$M_{\rm Ch}$）Type Ia 超新星模型产额一致；钙丰度异常偏高（$[\mathrm{Ca/Fe}] = +0.17$），提示富钙快变源（Ca-rich gap transient）贡献；利用核宇宙年代学公式 $\tau = 46.7\,\mathrm{Gyr}\,[\log(\mathrm{Th/X})_0 - \log(\mathrm{Th/X})_*]$ 结合实测 $\log\epsilon(\mathrm{Th/Eu}) = -0.26 \pm 0.24$ 导出恒星年龄为 $\tau = 12.5 \pm 4.2$ Gyr。	V.1.4 Neutron-capture Elements
arXiv:2610.14924 2026-10-12	**A GeV Gamma-Ray Spectral Excess in the Fermi Blazar 4FGL J0136.5+3906** *A GeV Gamma-Ray Spectral Excess in the Fermi Blazar 4FGL J0136.5+3906* Shi-Ju Kang, Yue Yin, Yong-Gang Zheng 等	在 17 年 Fermi-LAT 数据中，该源能谱在单对数抛物线连续谱之上表现出显著的高斯谱超出：最佳拟合中心能量 $E_{\rm signal} = 13.07 \pm 2.25\,\mathrm{GeV}$，线性高斯宽度 $\sigma_{\rm signal} = 10.00 \pm 0.02\,\mathrm{GeV}$，对数空间谱峰能量 $E_{\rm peak} = 19.26 \pm 1.52\,\mathrm{GeV}$，积分光子通量 $F_{\rm signal} = (3.62 \pm 0.72) \times 10^{-10}\,\mathrm{ph\,cm^{-2}\,s^{-1}}$，检验统计量 $\mathrm{TS} = 39.79$（显著性约 5.7σ）。时变分析表明前 8.5 年通量为 $(4.59 \times 10^{-10}\,\mathrm{ph\,cm^{-2}\,s^{-1}})$，后 8.5 年降至 $(2.67 \times 10^{-10}\,\mathrm{ph\,cm^{-2}\,s^{-1}})$，表现出明显的暂态特性。	III Results
arXiv:2610.14587 2026-10-12	**ELISA: A Bayesian X/$γ$-ray Spectral Analysis Toolkit** *ELISA: A Bayesian X/$γ$-ray Spectral Analysis Toolkit* Wang-Chen Xue, Sheng-Lun Xie, Chao Zheng 等	在 Insight-HXMT Crab 能谱拟合测试中，ELISA 结合 NUTS 采样器仅耗时 $\sim$ 12–16 s 即可达到 bulk ESS $\sim 10^4$，相比 XSPEC 的无梯度系综采样实现了约 $100\times$ 的采样效率提升；通过留一法交叉验证（PSIS-LOO）与 stacking 权重成功给出了吸收截断幂律对无截断幂律连续谱无显著预测优势的定量模型检验结果。	II.1 End-to-end workflow
arXiv:2610.14494 2026-10-12	**Reawakening of GS 1843+00: A Multiwavelength Study of its 2026 Giant X-ray Outburst** *Reawakening of GS 1843+00: A Multiwavelength Study of its 2026 Giant X-ray Outburst* Gaurava K. Jaisawal, Georgios Vasilopoulos, Francesco Carotenuto 等	X 射线 3–80 keV 去吸收光度在 10 kpc 下达到 $L_{\rm X} \sim (4.4\text{–}7.0) \times 10^{37}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$；NuSTAR 探测到约 29.7 s 的相干脉动，跨 34.9 天测定自转加速率 $\dot{P} = (-5.1 \pm 0.1) \times 10^{-8}\,\mathrm{s\,s^{-1}}$；宽能带能谱拟合为热康普顿化（等离子体温度 $kT_{\rm e} \approx 10\text{–}11\,\mathrm{keV}$，光深 $\tau \approx 3.8\text{–}4.2$）与黑体成分（$kT_{\rm BB} \approx 1.2\text{–}1.3\,\mathrm{keV}$，发射半径 2.5–4.2 km）及 Fe K$\alpha$ 线；MeerKAT 1.28 GHz 测得 3σ 峰值流强上限为 $36\,\mu\mathrm{Jy\,beam^{-1}}$，假定平谱（$\alpha = 0$），对应 6 GHz 射电光度上限分别为 $L_{\rm R} < 6.8 \times 10^{27}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$（5.1 kpc）和 $< 2.7 \times 10^{28}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$（10 kpc）。	4 Discussion

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.14353 2026-10-12	**The effect of triples on the Chemically Homogeneous Evolution Channel for producing Gravitational Wave Sources** *The effect of triples on the Chemically Homogeneous Evolution Channel for producing Gravitational Wave Sources* Silvia A. Popa, Selma E. de Mink, Stephen Justham 等	在较高金属度（$Z_\odot/3$）下，层级三体系统中的 ZLK 机制能够克服引力波孤立并合时标过长的问题：主序期强潮汐进动（$t_{\rm tides}\sim 0.1\,{\rm yr} < t_{\rm ZLK}\sim 21\,{\rm yr}$）猝灭 ZLK 振荡避免主序恒星碰撞；黑洞形成后潮汐消失且 $t_{\rm GR} > t_{\rm ZLK}$，偏心率被激发至 $e_{\rm max}\approx 0.998$，使并合时标从孤立状态的 $\sim 112\,{\rm Gyr}$ 剧烈缩短至 $\tau_{\rm merger}\approx \tau_{\rm isolation}(1-e_{\rm max}^2)^3 \approx 8\,{\rm kyr}$。在此通道下，黑洞质量分布峰值位于 $\sim 15\,M_\odot$，且自旋几乎全部处于低自旋区间（峰值约 0.25，全部 <0.4），50% 的系统在 $1\,{\rm Gyr}$ 内并合，约 10% 在 $1\,{\rm Myr}$（1% 在 $1\,{\rm kyr}$）内快速并合。	4. Distribution of merging black holes
arXiv:2610.14348 2026-10-12	**Mapping Wolf-Rayet winds with spectro-interferometry I. Detection of multiple co-rotating interaction regions in WR 6** *Mapping Wolf-Rayet winds with spectro-interferometry I. Detection of multiple co-rotating interaction regions in WR 6* K. Deshmukh, A. -N. Chené, A. J. Frost 等	通过VLTI/GRAVITY干涉拟合得出WR 6的连续谱均匀圆盘直径为 0.37–$0.48\,{\rm mas}$（对应距离 $1.4\,{\rm kpc}$ 下的辐射半径 $\approx 60\,R_\odot$），排除了早于B2.5 V（$M\approx 6\,M_\odot$）的主序伴星；首次在风中直接干涉探测到1至3个偏心大尺度密度结构，视向速度分布在 $-1589\pm 28\,{\rm km\,s^{-1}}$ 至 $+918\pm 14\,{\rm km\,s^{-1}}$ 之间（对比恒星终极风速 $v_\infty = 1759\,{\rm km\,s^{-1}}$），其多结构分布与时间演化直接支持了多重CIRs物理图景并排除了单伴星假说。	5. Conclusion