高能天体物理 arXiv 每周学术脉络 · 2026 年第 43 周 (2026-W43) 深度精读研报

报告周期：2026 年第 43 周 (2026-W43) (2026-W43) **时间跨度：**2026-10-19 ~ 2026-10-25 **纳入精读：**8 篇核心必读 | 90 篇重点关注

在线精读：https://astro-lineage.pages.dev/arxiv-weekly/2026-W43/

★ 本周精选速览矩阵 (At-a-Glance Visual Triage · 共 18 篇)

1-MINUTE VISUAL TRIAGE • KEY INSIGHTS & FIGURES

快速研读指引：下表浓缩本周全部 8 篇核心必读与 10 篇特选关注论文的**一句话核心结论 (Key Insight)**、**关键科学图表**与**直达超链接**（点击页内编号跳至精读详情，点击 arXiv / PDF 直达原文），助您在 1–2 页内快速判断哪些文章值得精读。

#01 ⭐ 必读 **arXiv:2610.22653** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Sparking Dynamic, Relativistic Magnetic Reconnection in a Twisted Flux Tube

Sparking Dynamic, Relativistic Magnetic Reconnection in a...

Key Insight：非均匀电阻引发入流速度 $\beta_{\rm rec} \sim 0.1$ 的爆发性重联，占横截面 $0.1\% \sim 3\%$ 的电荷匮乏区承担了 $20\% \sim 55\%$ 的欧姆耗散并驱动壳层热膨胀抛射。




Fig. 4 · 核心物理演化图

#02 ⭐ 必读 **arXiv:2610.24849** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Tidal Disruption Events in Active Galactic Nuclei: Thermal Radiation and Jets

Tidal Disruption Events in Active Galactic Nuclei: Thermal...

Key Insight：碎屑撞击使盘环向磁场向内平流致使南极磁通量激增 33 倍，激发 $L_{\rm BZ} \simeq 3 \times 10^{42}\,{\rm erg\,s^{-1}}$ 喷流，形成"南喷流、北热辐射"的百倍不对称态。




Fig. 1 · 物理模型示意图

#03 ⭐ 必读 **arXiv:2610.27311** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Source velocities of fast radio bursts constrained by their dispersion measure variations

Source velocities of fast radio bursts constrained by their dispersion measure variations

Key Insight：在自由-自由吸收光深 $\tau_{\rm ff} < 1$ 约束下，导出重复暴最小运动速度达 $|v_s| \sim 20$–$2800\,{\rm km\,s^{-1}}$，与超新星出生反冲磁星吻合。

#04 ⭐ 必读 **arXiv:2610.27312** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

SN 2023iop: An Extreme 1987A-like Supernova and the Death of Very Massive···

SN 2023iop: An Extreme 1987A-like Supernova and the Death ...

Key Insight：测得该源辐射总能量达 $(4.3 \pm 0.3) \times 10^{50}$ erg、连续谱偏振度达 $0.81 \pm 0.08\%$，联合禁线诊断将其约束为富氢 PISN 或强非对称 CSM 相互作用。




Fig. 10 · 核心观测结果

#05 ⭐ 必读 **arXiv:2610.27489** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Constraining the FRB Central Engine from Flux Variations of Persistent Radio Sources···

Constraining the FRB Central Engine from Flux Variations of...

Key Insight：磁星风云电子绝热冷却主导拟合表明注入电子截断必须满足 $\gamma_{\rm b} \sim 2 \times 10^2$，导出射电辐射效率仅为 $\eta_{\rm r} \sim 10^{-5}$–$10^{-4}$。




Fig. 5 · 数据拟合与模...

#06 ⭐ 必读 **arXiv:2610.28734** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

The (missing) gamma-ray counterparts to EP events

The (missing) gamma-ray counterparts to EP events

Key Insight：68% 的 EP 快速 X 射线暂现源无伽马对应体，Fermi/GBM 限制其 $E_{\rm peak} \lesssim 30$–$100\,{\rm keV}$ 与 $\Gamma_0 \lesssim 100$，指示中度相对论或激波破越起源。




Fig. 12 · 核心观测结果

#07 ⭐ 必读 **arXiv:2610.29226** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Double-Shock Radiation in Supernova Wind Breakout and EP260321a

Double-Shock Radiation in Supernova Wind Breakout and...

Key Insight：低速反激波（$\bar{v}_{r,bo} \sim 0.07c$）满足 LTE 并主导黑体热辐射，确定 EP260321a 发生在截断半径 $r_w \sim 10^{13}\,{\rm cm}$ 的致密星风破越中。




Fig. 1 · 物理模型示意图

#08 ⭐ 必读 **arXiv:2610.29838** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

PSR J0653+0443: An Eclipsing Millisecond Pulsar in an Extremely Eccentric Double···

PSR J0653+0443: An Eclipsing Millisecond Pulsar in an...

Key Insight：测得轨道周期 79.08 d、近星点速度 $1140\,{\rm km\,s^{-1}}$ 与平均引力波光度 $1.9 \times 10^{-4}\,L_\odot$，通过消除协方差模型精确提取后开普勒参数，约束次级星反冲速...




Fig. 3 · 数据拟合与模...

#09 📌 关注 **arXiv:2610.22662** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

The transformative power of ALMA2040 for mm-VLBI

The transformative power of ALMA2040 for mm-VLBI

Key Insight：在 230 GHz 获得 4 倍基线灵敏度提升，达到 sub-mJy 极限，可将黑洞视界及瞬变喷流成像拓展到弱 5–10 倍的暗弱目标。




Fig. 3 · 核心观测结果

#10 📌 关注 **arXiv:2610.22709** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

A New AI/ML Based Image Reconstruction Technique for Hard X-ray Coded Aperture···

A New AI/ML Based Image Reconstruction Technique for Hard ...

Key Insight：CNN-Transformer 混合模型在极高背景噪声（13000 计数）与非平移不变几何下仍可实现 0.25 s 快速推理与 $> 67\%$ 的精准单像素定位。




Fig. 7 · 核心观测结果

#11 📌 关注 **arXiv:2610.22816** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

A Unified Solution to the Low-Mass X-ray Binary Diversity Puzzle: Saturated Magnetic Braking Coupled with Irradiatio···

A Unified Solution to the Low-Mass X-ray Binary Diversity Puzzle: Saturated Magnetic...

Key Insight：引入物理辐照风效率 $f \in [10^{-5}, 10^{-3}]$ 拓宽了通往 UCXB 的分叉空间，自洽重现了 2A 1822–371 反常轨道膨胀与毫秒脉冲星周期空缺。

#12 📌 关注 **arXiv:2610.23028** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Gamma-ray calorimetry of Seyfert winds

Gamma-ray calorimetry of Seyfert winds

Key Insight：测得塞弗特星系外流强子量热分数仅为 $\rho_{\rm wind} = 0.020$，相比星暴超风低 13.5 倍，表明其缺乏致密靶气体进行有效 pp 碰撞产生 GeV 辐射。

#13 📌 关注 **arXiv:2610.23081** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

What can a uniform reflection pipeline establish about supermassive black hole···

What can a uniform reflection pipeline establish about...

Key Insight：在重新扣除背景并消除局部极小值后，41 个样本中仅 18 个通过质检且仅 1 个源（NGC 4051）具有稳健双边自旋约束，多数极向自旋拟合极度脆弱。



Fig. 2 · 数据拟合与模...

#14 📌 关注 **arXiv:2610.23089** ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Maximal efficiency of geometric beaming and polarization of highly super-Eddington···

Maximal efficiency of geometric beaming and polarization of...

Key Insight：由于多次散射导致的大角度逃逸，现实漏斗几何集束上限为 $\mathcal{B} \lesssim 10$，纯电子散射线偏振度上限 $\sim 10\%$ 且与集束因子呈反相关。




Fig. 4 · 核心物理演化图

#15 📌 关注 arXiv:2610.23140 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Seeing Through the RFI Mask: DT-FISTA Inpainting of Pulsar Dynamic Spectra via···

Seeing Through the RFI Mask: DT-FISTA Inpainting of Pulsar...




Fig. 1 · 核心观测结果

Key Insight： DT-FISTA 算法将归一化均方根误差降低 $37\% \sim 53\%$，运算速度相比稠密维纳滤波提升近万倍（耗时从数小时压缩至 $1.72\,\mathrm{s}$）。

#16 📌 关注 arXiv:2610.23155 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

Ranking Prompt--Plateau Correlations in Gamma-Ray Bursts with Symbolic Regression

Ranking Prompt--Plateau Correlations in Gamma-Ray Bursts with Symbolic Regression

Key Insight： 收敛发现平面关系 $\log L_a \propto 0.78 \log L_{\rm peak} - 0.81 \log T_a^{\rm rest}$，内禀弥散降至 $0.52\,\mathrm{dex}$，偏相关在排查 $D_L(z)$ 影响后依然稳健（$p \sim 10^{-19}$）。

#17 📌 关注 arXiv:2610.23339 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

The Dancing Bonfire: An Unusual Persistent X-ray Source in M81 Exhibiting Recurrent···

The Dancing Bonfire: An Unusual Persistent X-ray Source in M...




Fig. 1 · 观测总体曲线...

Key Insight： M81F4 持久光度达 $10^{38-39}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 且每隔约 $0.5\,\mathrm{d}$ 爆发一次释放 $10^{41}\,\mathrm{erg}$ 的百秒耀斑，磁层截断半径解析表明其为 $B \sim 10^{12-13}\,\mathrm{G}$ 的中子星。

#18 📌 关注 arXiv:2610.23359 ↓详情 · arXiv · PDF · 网页

A blazar is a blazar is a blazar ... Comparing long-term varaibility properties of PKS 151···

A blazar is a blazar is a blazar ... Comparing long-term...




Fig. 2 · 核心观测结果

Key Insight： 两类源多波段互相关在 $> 3\sigma$ 上均无显著延迟，且高能端通量动态范围显著拓宽，PKS 1510-089 呈现盘与喷流双对数正态结构，要求分层喷流模型。

1. 本周综述与宏观脉络 (Executive Synthesis · 点击编号直达精读)

EDITORIAL OVERVIEW

ABSTRACT / 学术总览（点击文内 ARXIV 编号 ↓ 可直接跳至下方详细精读）

本周高能天体物理与瞬变爆发研究在"前身星演化与坍缩 -> 中心引擎磁流体与辐射动力学 -> 抛射物相互作用与多波段观测印证"这一因果链条上取得了多项定量化突破：

- **磁星磁层耗散与FRB起源**：arXiv:2610.22653v1 论证了扭缠磁通管在非均匀电阻下的相对论磁重联机制，阐明占截面仅 $0.1\% \sim 3\%$ 的电荷匮乏区贡献了 $20\% \sim 55\%$ 的欧姆耗散并能驱动巨耀斑重子抛射；arXiv:2610.27311v1 基于重复 FRB 的色散量年变率导出了中央致密天体的最小空间运动速度下限达 20–$2800\,\mathrm{km\,s^{-1}}$，强力支持年轻高速磁星图景；arXiv:2610.27489v1 利用 FRB 20240114A 伴随持续射电源的月度光变，首次拟合得到注入电子洛伦兹因子 $\gamma_{\rm b} \sim 2 \times 10^2$ 与射电辐射效率 $\eta_{\rm r} \sim 10^{-5}$–$10^{-4}$，约束了磁星风云与超活跃相的物理边界。
- **致密吸积与强引力场爆发**：arXiv:2610.24849v1 开展了 3D 辐射 MHD 模拟，揭示 TDE 恒星碎屑撞击预存 AGN 盘导致南极磁通量暴增 33 倍，激发出高达 $L_{\rm BZ} \sim 3 \times 10^{42}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 的相对论喷流并形成显著的双极不对称性；arXiv:2610.28734v1 对爱因斯坦探针（EP）72 例快速 X 射线暂现源进行伽马射线对应体系统搜寻，限定 68% 的无伽马对应源初始洛伦兹因子 $\Gamma_0 \lesssim 100$，指示其偏离经典高能 GRB 轴向外流。
- **超新星激波动力学与前身星极限**：arXiv:2610.29226v1 构建了非 LTE 正激波与 LTE 反激波的双激波辐射模型，成功解释了 EP260321a 呈现的软 X 射线暴发与早期光学发射时延；arXiv:2610.27312v1 通过极化与星云谱观测，将超亮超新星 SN 2023iop 归因于 $190\,M_\odot$ 的富氢对不稳定超新星（PISN）或深埋非球对称 CSM 相互作用。
- **相对论双星系统与演化基准**：arXiv:2610.29838v1 利用 FAST 测时发现了目前已知偏心率最高（$e = 0.992387$）的近侧向双中子星系统 PSR J0653+0443，通过近星点进动精准测定中子星质量并给出 Case BB 转移与核塌缩反冲的坚实演化约束。

🎯 **筛选边界**：本周重点聚焦相对论磁流体破缺、极端超新星辐射转移、致密喷流激波以及极端相对论双星动力学，严格剔除缺乏高能物理因果机制的常规星系与低能段巡天编目。所有物理参数均以标准 LaTeX 公式呈现。

专题 01 综合前沿课题 (General Highlights) 本专题收录 8 篇必读文献

PAPER 01 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.22653

[arXiv:2610.22653] Sparking Dynamic, Relativistic Magnetic Reconnection in a Twisted Flux Tube

Sparking Dynamic, Relativistic Magnetic Reconnection in a Twisted Flux Tube

作者：Michael P. Grehan, Christopher Thompson, Bart Ripperda, James R. Beattie arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：非均匀电阻引发入流速度 $\beta_{\rm rec}\sim 0.1$ 的爆发性重联，占横截面 $0.1\%\sim 3\%$ 的电荷匮乏区承担了 $20\%\sim 55\%$ 的欧姆耗散并驱动壳层热膨胀抛射。

【推荐理由】：通过高精度阻抗 RMHD 突破性解决了磁星脚点固结下自发重联过慢的难题，建立了电荷匮乏与巨耀斑物质抛射的物理关联。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

磁星光滑无力场磁层自发撕裂模增长过慢，且星壳脚点固结（line-tying）通常被认为会抑制磁重联；同时磁层中极端高磁化（$\sigma\gg 1$）与动理学尺度电荷匮乏（charge starvation）如何影响重联速率、湍流级联及射电微结构变质尚不明确。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 磁星磁层由超相对论正负电子对等离子体填充，满足强磁化 $\sigma=B_z^2/(4\pi w)\gg 1$。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

利用阻抗相对论 MHD 代码 BHAC 进行超高分辨率 2D 模拟（最高达 $N_\perp=65536$ 并结合 AMR），以及 AthenaK 3D 理想 MHD 模拟。引入考虑流体动理学尺度的非均匀电阻率模型 $\eta=|\boldsymbol{E}^*|/(nec)$，结合磁足差动旋转与剪切平衡初值，全面追踪电流片演化、等离子体团形成与能量转换。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 流体模拟中的非均匀电阻率仅是动理学电荷匮乏效应的唯象闭合模型，未能自洽包含第一性原理 PIC 动理学反馈与对级联产生。
- 当导向场较弱（如 $B_g/B_0\lesssim 2.25$）导致 $\Gamma_{\rm kink}t_{\rm rec}\gtrsim 1$ 时，三维扭折模主导，二维平面重联简化失效。




Fig. 4 [核心物理演化图]：Figure 4: Time evolution of j z = (c / 4 π) (∇ × **B**) z j_{z}=(c/4\pi)(\bm{\nabla}\times\bm{B}){z} , *in simulations Rev2D , Rev2DNonUni , and Rev2DNonUniRot , as normalized by the root-mean-square (r.m.s.) value in the plotted domain | x | , | y | ≤ 6 R / 5 |x|,|y|\leq 6R/5 . In all three simulations, rapid internal reconnection between domains of opposing B ϕ B{\phi}* develops at a current sheet in the lower left. This sheet is unstable to forming plasmoids. Ejecta from the current sheet become turbulent, filling the outer tube with an alternating sequence of weaker current sheets as the inner twist is dissipated. The main current sheet is thicker in simulation Rev2DNonUni and ejects large-amplitude plasmoids at intervals. In the rotating simulation Rev2DNonUniRot , the reconnection process is supplemented by the shear-driven formation of vortices.




Fig. 20 [核心物理演化图]： Figure 20: Two snapshots of j z = (c / 4 π) (∇ × $\boldsymbol{B}$) z j_{z}=(c/4\pi)(\bm{\nabla}\times\bm{B})_{z} , in 3D simulation Rev3D , normalized by the r.m.s. value in the computational domain. The first column shows cuts in the x y xy -plane at the indicated value of z z . The second and third column are cuts through x = 0 x=0 and y = 0 y=0 . The fourth column is a 3D rendering with opacity scaling with the magnitude of the current. Magnetic field lines are drawn in white. The strong guide field suppresses the growth of structure in the z z -direction and the dynamics are dominated by reconnection in the x y xy -plane.

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

细长磁通管的面内磁场呈指数衰减 $\langle B_\perp^2 \rangle \propto e^{-2\Gamma_{\rm rec} t}$，衰减率 $\Gamma_{\rm rec} \sim \beta_{\rm rec}(B_0/B_g)(c/R)$。非均匀电阻模型中重联入流速度标度达 $\beta_{\rm rec} \sim 0.1$，旋转减缓效应下为 $\beta_{\rm rec} \sim 0.02$。在导向场 $B_g/B_0 = 5$ 下纽缠模被压制（$\Gamma_{\rm kink} t_{\rm rec} < 1$），湍流面内磁能谱演化出 $dB_\perp^2(k_\perp)/dk_\perp \propto k_\perp^{-2}$。重联峰值期间，电荷匮乏区仅占横截面的 $0.1\% \sim 3\%$，却贡献了 $20\% \sim 55\%$ 的欧姆耗散。电流阻尼深入中子星壳层基底（$\Sigma_{\rm eq} \sim 2.5 \times 10^{14}\,{\rm g\,cm^{-2}}$），热膨胀满足 $z_n/z_0 = (1+\varsigma^{-1})^{3n/4}$，经 ~ 10 次循环可解释巨耀斑重子物质抛射。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点研读第 3 节非均匀电阻模型的引入方式及电流片电荷匮乏与欧姆耗散的空间聚集机制。

PAPER 02 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.24849

[arXiv:2610.24849] Tidal Disruption Events in Active Galactic Nuclei: Thermal Radiation and Jets

Tidal Disruption Events in Active Galactic Nuclei: Thermal Radiation and Jets

作者： Nimrod Tripto, Tsvi Piran, Julian Krolik arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：碎屑撞击使盘环向磁场向内平流致使南极磁通量激增 33 倍，激发 $L_{\rm BZ} \simeq 3 \times 10^{42}\,{\rm erg\,s^{-1}}$ 喷流，形成"南喷流、北热辐射"的百倍不对称态。

【推荐理由】：首次利用全 3D 辐射 MHD 模拟定量展示了 TDE 碎屑撞击 AGN 预存吸积盘触发强单极喷流与双极不对称性的全过程。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

在预先存在磁化吸积盘的活动星系核（AGN）中，潮汐瓦解事件（TDE）产生的恒星碎屑流如何与吸积盘发生流体力学碰撞、如何影响内盘吸积与辐射效率，以及碰撞如何改变黑洞极区磁通量并驱动相对论喷流。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

使用 Athena++ 辐射磁流体动力学代码，在 Paczyński–Wiita 伪牛顿势 $\Phi_{\rm PW} = -\frac{GM_{\rm BH}}{r-2r_{\rm g}}$ 下进行三维网格模拟；设定黑洞质量 $M_{\rm BH} = 5 \times 10^6\,M_\odot$；采用辐射-MHD 平衡吸积盘作为初态，以倾角 $i \simeq 86^\circ$、近抛物线轨道注入恒定质量流率 $\dot{M}_{\rm s} = 8.3 \times 10^{25}\,{\rm g\,s^{-1}} = 12\,\dot{M}_{\rm Edd}$ 的碎屑流（流盘质量流率比 $\dot{M}_{\rm s}/\dot{M}_{\rm d} \sim 400$），碎屑流自身不注入磁场和辐射能。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 碎屑流注入采用等温状态方程 $P = \rho c_{\rm s}^2$，注入物质不含固有磁场与辐射能

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 网格低密度区设置了密度、压强和温度截断下限（floors）




Fig. 1 [物理模型示意图]： Figure 1: A schematic picture of the simulated scenario. The pre-existing AGN disk is described following Jiang et al. [22] as a 40 r g 40r_{\rm g} disk supported by radiation and magnetic pressure. This disk is fed by a large mass reservoir, a supply torus centered at 80 r g 80r_{\rm g} with an inner edge of 40 r g 40r_{\rm g} . The disk luminosity is 0.08 L Edd L_{\rm Edd} . A TDE debris stream (blue arrows: injection direction) is injected along a nearly parabolic trajectory into this disk and impacts it at r imp = 15 r g r_{\rm imp}=15,r_{\rm g} and ϕ = 1.52 \phi=1.52 . Because M ˙ s / M ˙ d ∼ 400 \dot{M}{\rm s}/\dot{M}{\rm d}\sim 400 (Sec. II.2.3), the stream punctures the thin disk. A small fraction of its mass is left behind in the disk. Disk matter is pushed downward, first tilting the disk and then spreading it vertically (Fig. 2).




Fig. 12 [物理模型示意图]： Figure 12: Radiation and magnetic fields on two meridional slices at t = 15.35 t orb t=15.35,t_{\rm orb} . (Top) Radiation temperature T rad = (E rad / a) 1 / 4 T_{\rm rad}=(E_{\rm rad}/a)^{1/4} (background) and radiation flux streamlines, colored by the isotropic-equivalent luminosity L iso = 4 π r 2 (F rad · r ^) L_{\rm iso}=4\pi r^{2}(\mathbf{F}{\rm rad}\cdot\hat{r}) , *ranging from ≃ 10 44 \simeq 10^{44} to ≃ 10 46 erg s − 1 \simeq 10^{46},\mathrm{erg,s^{-1}} , at t = 15.35 t orb t=15.35,t*{\rm orb} . Inward-going streamlines are colored gray, since L iso L_{\rm iso} is negative for them. Near the midplane τ ≫ 1 \tau\gg 1 , so F rad \mathbf{F}{\rm rad} *is parallel to the flow. In the northern hemisphere, the photosphere is at a few r g r*{\rm g} above the disk. Above it, the flux turns outward and escapes. However, the photosphere in the southern hemisphere lies beyond the range of this plot; hence, some of the flux is directed inwards, and even the flux lines directed outwards are trapped. (Bottom) Density (background) with magnetic-field streamlines. Away from the midplane, the field structure near the inner boundary is nearly monopolar, with field lines pointing toward the black hole. This coherent structure could create strong jets. Flux in the southern hemisphere is × \times few larger than in the northern one, so jets, if produced, would be × \times 10 stronger in the south.

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

碎屑流撞击使吸积率从 $\dot{M} \approx 0.07\,\dot{M}_{\rm Edd}$ 跃升至 ~ 10–$13\,\dot{M}_{\rm Edd}$，辐射热光度因光子俘获（trapping radius $r_{\rm tr} \approx 240(H/r)\,r_{\rm g}$）维持在 $L \sim L_{\rm Edd}$，辐射效率降至 $\eta = L/(\dot{M}c^2) \simeq 0.01$。北半球各向同性等效热光度达 $L_{\rm iso} \simeq 5\,L_{\rm Edd}$ 且谱峰位于极紫外（10–$100\,{\rm eV}$）。撞击将盘环向磁场重组并向内平流，使南极磁通量增加约 33 倍至 $\Phi \simeq 2\times10^{29}\,{\rm G\,cm^2}$，对应 Blandford–Znajek 喷流功率 $L_{\rm BZ} = c\xi_{\rm BZ}\Phi^2/(2\pi^2 r_{\rm g}^2) \simeq 3\times10^{42}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，南北极 Poynting 通量不对称性达 10–100 倍，呈现"南喷流、北热辐射"的强双极不对称性。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点关注磁通量平流重构机制的图示演化以及光子俘获半径对北极辐射热能谱的平滑效应。

PAPER 03 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.27311

[arXiv:2610.27311] Source velocities of fast radio bursts constrained by their dispersion measure variations

Source velocities of fast radio bursts constrained by their dispersion measure variations

作者：S. K. Ocker, A. L. Piro arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：在自由-自由吸收光深 $\tau_{\rm ff} < 1$ 约束下，导出重复暴最小运动速度达 $|v_s| \sim 20$–$2800\,{\rm km\,s^{-1}}$，与超新星出生反冲磁星吻合。

【推荐理由】：创新性地将 FRB 色散量长期漂移解释为源自身空间运动，为重复暴中央引擎的高速反冲性质提供了独立且强有力的动力学校验。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

重复 FRB 观测中探测到显著的色散量时间变化（$d{\rm DM}/dt \gtrsim 1\,{\rm pc\,cm^{-3}\,yr^{-1}}$），需要明确其是否由致密天体自身的高速空间运动（如出生反冲速度）穿过周围电离介质所致，并定量分离径向与横向速度分量。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

将源速度分解为径向分量 v_r 和横向分量 v_t，构建了三种模型场景：Scenario A 考虑常密度介质中的纯径向运动；Scenario B 考虑柯尔莫哥洛夫湍流介质中的横向运动引起的散射与涨落；Scenario C 将变化分解为线性项与随机项 ${\rm DM}(\mathbf{v}) = {\rm DM}_{\rm lin}(v_r) + {\rm DM}_{\rm sto}(v_t)$。结合自由-自由吸收光深度 $\tau_{\rm ff} \approx 3.3\times10^{-7} T_4^{-1.35}\nu_{\rm GHz}^{-2.1}{\rm EM} < 1$ 与散射量上限约束电子密度 $\langle n_e\rangle$，进而反推出源速度分量下限。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 观测到的色散量变化主要由 FRB 源在宿主星系或周源介质中的自身空间运动主导，而非由银河系星际介质或宇宙学膨胀引起

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 对于极端源（如 FRB 20190520B），纯径向运动推断的 $|v_r| \gtrsim 3\times10^3\,{\rm km\,s^{-1}}$ 超出了已知致密天体的最大观测空间速度

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

研究推导得出，源在周源介质中的运动可自然解释所观测到的 $d{\rm DM}/dt \sim 1\,{\rm pc\,cm^{-3}\,yr^{-1}}$。当径向运动主导时，满足标度关系 $|d{\rm DM}/dt| = 10^{-4}(|v_r|/100\,{\rm km\,s^{-1}})(\langle n_e\rangle/{\rm cm^{-3}})\,{\rm pc\,cm^{-3}\,yr^{-1}}$；横向运动穿越柯尔莫哥洛夫湍流介质（$\beta = 11/3$）引起的色散量均方根涨落标度为 $\sigma_{d{\rm DM}/dt} \approx [f_\beta {\rm SM}/2]^{1/2} v_t^{(\beta-2)/2}(\Delta t)^{(\beta/2)-2} \approx 3\times10^{-4}\left(\frac{\rm SM}{10^{-4}\,{\rm kpc\,m^{-20/3}}}\right)^{1/2}\left(\frac{v_t}{100\,{\rm km\,s^{-1}}}\right)^{5/6}\left(\frac{\Delta t}{\rm yr}\right)^{-1/6}{\rm pc\,cm^{-3}\,yr^{-1}}$。基于自由-自由吸收光深度 $\tau_{\rm ff} < 1$ 限制介质密度，推导得出重复暴样本的最小空间速度 $|v_s| = (v_r^2 + v_t^2)^{1/2}$ 约为 $\gtrsim 20 - 2800\,{\rm km\,s^{-1}}$，与银河系年轻高速中子星和磁星的反冲速度吻合。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

建议重点精读 Scenario B 柯尔莫哥洛夫湍流横向穿越模型中结构函数与时间涨落标度的推演过程。

PAPER 04 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.27312

[arXiv:2610.27312] SN 2023iop: An Extreme 1987A-like Supernova and the Death of Very Massive Stars

SN 2023iop: An Extreme 1987A-like Supernova and the Death of Very Massive Stars

作者： Steve Schulze, Avinash Singh, Nikhil Sarin, Ofer Yaron, Jesper Sollerman 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】： 测得该源辐射总能量达 $(4.3 \pm 0.3) \times 10^{50}$ erg、连续谱偏振度达 $0.81 \pm 0.08\%$，联合禁线诊断将其约束为富氢 PISN 或强非对称 CSM 相互作用。

【推荐理由】： 提供了迄今罕见的兼具超高光度、极长上升期与高偏振度的超亮超新星全面观测，直指 $190\,M_\odot$ 前身星塌缩归宿。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

SN 2023iop 具有长达 $\gtrsim 88$ 天的缓慢上升以及高达 $M_r \approx -20.14$ mag 的绝对星等，进入富氢超亮超新星（H-rich SLSN）能区。传统中微子驱动核塌缩模型能产生的动能（$\lesssim 2 \times 10^{51}$ erg）和 ^{56}Ni 质量极限（$\lesssim 0.3\,M_\odot$）完全无法解释其高达 4.3×10^{50} erg 的辐射能量与峰值光度；而在光谱未见经典窄发射线与近紫外过剩的条件下，如何协调极高镍产额、超大抛射物质量、长时间维持的光球相与晚期极其平缓的衰减，构成了核心物理疑难。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

利用全天巡天（ZTF、ATLAS）及多台地面望远镜（VLT、Keck、LBT、LT、NOT、MMT 等）获取覆盖爆发前 -51.4 天至 $+623.8$ 天的多波段测光、高低分辨率光谱及分光偏振（VLT/FORS2）数据。测光采用 AutoPhOT、SFFT 和 HOTPANTS 减算与动态分箱；光谱使用 PypeIt 等流程并严格与多波段测光进行绝对通量定标；结合黑体辐射演化、解析扩散时标标度律（$t_{\rm d} \approx [2\kappa M_{\rm ej}/(\beta c v)]^{1/2}$）、星云相禁线（[O I]、[Ni II]）光学薄/厚跃迁解析模型、PISN 网格数值模型（如 R190NL）、回落吸积供能模型（$\dot{E}_{\rm acc} = \eta \dot{M} c^2, \dot{M} \propto t^{-5/3}$）及非球对称 CSM 相互作用进行联合动力学与辐射拟合。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 在通过光变衰变尾估计镍质量上限时，假设爆炸后晚期星云相能量完全由放射性 $^{56}\mathrm{Co} \rightarrow {}^{56}\mathrm{Fe}$ 衰变释放的 γ 射线完全热化俘获驱动。
- 假设无偏振波段（5800–6200 Å 及 7400–7800 Å）测得的偏振主要反映超新星连续谱本征不对称性，而非宿主星系星际偏振（ISP）。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 早期 Swift XRT（$L_{\rm X} < 4 \times 10^{42}\,{\rm erg\,s^{-1}}$）与 AMI-LA 射电（$L_\nu < 4.4 \times 10^{28}\,{\rm erg\,s^{-1}\,Hz^{-1}}$）上限由于致密抛射物内部巨大的束缚-自由和自由-自由吸收光深（$\tau_{\rm ff} \propto \nu^{-2.1} t^{-5}$），无法严格排除致密中心引擎或紧邻星周相互作用。




Fig. 10 [核心观测结果]： Figure 10: SN 2023iop in the Stokes Q − U Q-U plane on day +37.3 (binning 50 Å). The points are color-coded by wavelength. Concentric circles show polarization degrees ranging from 0.5 to 2.5%. The photosphere shows a clear departure from spherical symmetry, but the absence of a dominant axis does not indicate an axially symmetric geometry.

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

测得该源峰值测辐射热光度为 $L_{\rm bol} = (4.0 \pm 1.0) \times 10^{43}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，全波段积分总辐射能量达 $E_{\rm rad} = (4.3 \pm 0.3) \times 10^{50}$ erg。由有效光球上升时标 $t_{\rm rise} \gtrsim 88$ 天导出抛射物质量下限 $M_{\rm ej} > 12\,M_\odot$；峰值光度需要产生放射性镍质量 $M_{^{56}\rm Ni} \approx 2.2\,M_\odot$。在静止系波长 5800–6200 Å 与 7400–7800 Å 测得反方差加权平均连续谱线偏振度为 $P = 0.81 \pm 0.08\%$，揭示显著的非球对称几何。晚期 $+326$ 天测得 [O I] $\lambda\lambda 6300, 6364$ 双线通量比 $F_{6300}/F_{6364} \approx 2.3$，处于光学薄与光学厚过渡态。多波段限制给出自由-自由吸收光深遵从标度律 $\tau_{\rm ff} \propto \nu^{-2.1}\,t^{-5}$，深埋中心引擎与 CSM 早期信号受阻碍。联合辐射模型指示其前身星符合 $190\,M_\odot$ 的富氢 PISN 模型，晚期平台期辐射由隐蔽或非球对称 CSM 相互作用主导。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

聚焦星云相禁线 [O I] 光学薄/厚跃迁解析拟合与 PISN R190NL 模型的动力学对照分析。

PAPER 05 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.27489

[arXiv:2610.27489] Constraining the FRB Central Engine from Flux Variations of Persistent Radio Sources: FRB 20240114A as the First Attempt

Constraining the FRB Central Engine from Flux Variations of Persistent Radio Sources: FRB 20240114A as the First Attempt

作者：Hirotaka Matsumiya, Kazumi Kashiyama, Tomonori Totani arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：磁星风云电子绝热冷却主导拟合表明注入电子截断必须满足 $\gamma_{\rm b} \sim 2\times10^2$，导出射电辐射效率仅为 $\eta_{\rm r} \sim 10^{-5}$–$10^{-4}$。

【推荐理由】：开辟了利用持续射电源（PRS）月尺度光变反演 FRB 中心引擎注入洛伦兹因子与辐射效率的新途径。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

FRB 20240114A 伴随的持续射电源（PRS）在数月时标上呈现出显著的流量升降，传统稳态磁星自转减速或单纯被动演化模型难以解释此类月量级多波段光变，同时 FRB 中心引擎的能量注入形式、辐射效率 $\eta_{\rm r}$ 及外流洛伦兹因子缺乏直接观测限制。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

构建了包含磁星长期磁耀斑耗散 $L_{\rm mag}(t) = (\alpha-1)\frac{E_{\rm mag,i}}{t_{\rm inj}}(t/t_{\rm inj})^{-\alpha}$ 及 FRB 超活跃相能量注入 $L_{{\rm FRBt},i} = f_{\rm FRBt}\cdot L_{{\rm r,obs,iso},i}$（其中 $f_{\rm FRBt} \equiv b_{\rm FRB} f_{\rm on-axis}^{-1}\eta_{\rm r}^{-1}$）的动力学模型；采用薄壳近似计算扫吸超新星抛射物的 MWN 半径 $R_{\rm nb}$、速度 $V_{\rm nb}$ 与磁场 $B_{\rm nb}(t) \approx [\frac{6\epsilon_B}{R_{\rm nb}^3(t)}\int L(t')dt']^{1/2}$，结合电子连续性输运方程 $\frac{\partial N_e}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial\gamma}(\dot{\gamma}N_e) = \dot{Q}_{\rm inj}$ 求解同步辐射与自由-自由吸收下的多波段能谱及光变。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)




Fig. 5 [数据拟合与模型对比]： Figure 5: The model-predicted PRS light curves using the representative parameters (γ b = 2 × 10 2 \gamma_{\rm b}=2\times 10^{2} , B int = 1.3 × 10 16 G B_{\rm int}=1.3\times 10^{16},{\rm G} , t age = 15.9 yr t_{\rm age}=15.9,{\rm yr} , f FRBt = 3 × 10 4 f_{\rm FRBt}=3\times 10^{4}) for the CCSN model, together with the observational data. The dashed curves and the two vertical green dashed lines are the same as those shown in Figure 4 . Left panel : The PRS light curves at 650 MHz, 1.5 GHz, 3 GHz, and 5.5 GHz for the CCSN model. The gray shaded region indicates the epochs where τ ff , 1 GHz > 1 \tau_{\rm ff,1,GHz}>1 , during which radio waves are unable to escape from the supernova ejecta. Right panel : A zoom-in of the epoch of the observed data.




Fig. 6 [数据拟合与模型对比]： Figure 6: The model-predicted synchrotron SED of the PRS for the CCSN model, together with the observational data (shown by the orange points), using the same set of parameters as in Figure 5 . The SED is at the epoch of the observed data (late July 2024), with the corresponding age t ∼ 16.4 yr t\sim 16.4,{\rm yr} derived based on t age t_{\rm age} .

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

通过将磁星风云（MWN）多波段光变及同步辐射自吸收（SSA）截断与观测拟合，发现相对论电子注入截断洛伦兹因子需满足 $\gamma_{\rm b} < 10^3$，基准最佳拟合为 $\gamma_{\rm b} \sim 2\times10^2$。在塌缩超新星（CCSN）与超剥离超新星（USSN）模型下，系统年龄分别约束为 $t_{\rm age} \approx 15.9\,{\rm yr}$ 与 $7.0\,{\rm yr}$，磁星初始内部磁场 $B_{\rm int} \approx 1.3\times10^{16}\,{\rm G}$（对应磁能预算 $\sim 5\times10^{49}\,{\rm erg}$）。在 PRS 发射区 $\bar{\nu}\sim 1\,{\rm GHz}$ 且平均磁场 $B_{\rm nb}\sim 10^{-2}\,{\rm G}$ 时，电子特征洛伦兹因子为 $\bar{\gamma}\approx (4\pi m_e c\bar{\nu}/3eB_{\rm nb})^{1/2}\sim 10^2$，其同步冷却时标长达 $t_{\rm syn}\approx 6\pi m_e c/(\sigma_T\bar{\gamma}B_{\rm nb}^2)\sim 10^3\,{\rm yr}$，主导冷却为数十年的绝热冷却；由归一化注入参数 $f_{\rm FRBt}\sim(3\text{–}5)\times10^4$ 推得射电辐射效率为 $\eta_{\rm r}\sim 10^{-5}$–10^{-4}，超活跃相占空比 $\lesssim 1\%$。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点推敲电子连续性输运方程与同步自吸收（SSA）截断频率在确定系统年龄时的联合拟合方法。

PAPER 06 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.28734

[arXiv:2610.28734] The (missing) gamma-ray counterparts to EP events

The (missing) gamma-ray counterparts to EP events

作者： Maria Edvige Ravasio, Ansh Chopra, Peter G. Jonker, Qinyu Wu, Eric Burns 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】： 68% 的 EP 快速 X 射线暂现源无伽马对应体，Fermi/GBM 限制其 $E_{\rm peak}\lesssim 30$–$100\,{\rm keV}$ 与 $\Gamma_0\lesssim 100$，指示中度相对论或激波破越起源。

【推荐理由】： 通过大样本对 EP 软 X 射线暂现源的高能伽马上限进行系统性贝叶斯压制，明确了大部分 FXT 并非轴向典型高能 GRB。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

爱因斯坦探针（EP）在软X射线波段（0.5–4 keV）发现了大量快速X射线暂现源（FXTs），但大多数缺乏伴随的高能伽马射线辐射，其本质究竟是低光度/低峰值能量GRB、大离轴角经典GRB、超新星激波破越（SBO）还是全新的致密天体爆发机制尚不明确。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 经验性 $\Gamma_0 - L_{\rm iso}$ 关联在低光度软能谱暂现源区间依然成立
- 未探测源的高能伽马射线能谱符合典型Band模型（如 $\beta=-2.3$）或简单幂律模型

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

针对72例EP事件，利用修改后的Fermi/GBM针对性搜索管线（针对EP $T_{100,\text{X-ray}}$ 和 $T_{\rm peak,X\text{-}ray}$ 覆盖期设定软/常/硬Band模型）和Fermi/LAT非成团似然分析，导出10–1000 keV与0.1–1 GeV的 3σ 流强上限，并利用LeHaMoC代码结合辐射半径标度关系 $R=2c\Gamma^2 t_{\rm var,obs}/(1+z)$ 对瞬时同步自康普顿（SSC）能谱进行数值模拟与参数空间限制。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 红移测量不完全（部分源缺乏宿主星系光谱确认）




Fig. 12 [核心观测结果]： Figure 12 : Cumulative redshift distribution of the first-year EP sample, divided into events with an associated GRB (blue), events without a γ \gamma -ray counterpart despite gamma-ray coverage (green, 'no GRBs'), and events lacking any gamma-ray coverage (orange, 'No coverage').

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

样本中68%（49/72）的EP源无伽马射线对应体，X射线时延持续时间显著长于伽马射线（$T_{100,\text{X-ray}}/T_{90}\sim 12$）。对无对应体源，GBM严格限制其峰值能量 $E_{\rm peak}\lesssim 30$–$100\,{\rm keV}$，各向同性光度上限为 $L_{\rm iso}\lesssim 1\times10^{48}$–$9\times10^{51}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，且中位红移较低（$z=0.8$ 对比 GRB 关联源的 $z=3.55$）。基于 $\Gamma_0 - L_{\rm iso}$ 经验关系，推导其初始体洛伦兹因子上限为 $\Gamma_0\lesssim 100$，指示其为低光度中度相对论出流或激波破越事件。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

查阅针对性 Fermi/GBM 搜索流水线的触发窗设定及同步自康普顿（SSC）参数空间排除边界。

PAPER 07 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.29226

[arXiv:2610.29226] Double-Shock Radiation in Supernova Wind Breakout and EP260321a

Double-Shock Radiation in Supernova Wind Breakout and EP260321a

作者：Zhuo Li, Rui-Ze Shi, Qiang Wang arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】：低速反激波（$\bar{v}_{r,bo} \sim 0.07c$）满足 LTE 并主导黑体热辐射，确定 EP260321a 发生在截断半径 $r_w \sim 10^{13}$ cm 的致密星风破越中。

【推荐理由】：推导了星风破越中正反激波热力学解耦理论，自洽解决了 EP 软能谱瞬变与早期光学辐射之间的时延谜题。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

传统超新星星风破越模型常忽略反向激波或简并处理辐射热力学平衡，难以合理解释 EP260321a 表现出的超高光度、快上升慢衰减的 X 射线软能谱演化以及与早期光学辐射之间的时延矛盾。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

结合辐射流体动力学 Rankine-Hugoniot 跳跃条件与接触间断面压强平衡构建双激波解析动力学；利用 Monte Carlo（MC）模拟光子在有限厚度球壳介质中的扩散传输；结合未扫过 C/O 包层冷却（cooling envelope）模型拟合早期多波段光学光变曲线。

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)




Fig. 1 [物理模型示意图]： Figure 1: Schematic description of the geometry of the ejecta-wind interaction in a SN wind breakout and the outer extended medium, which is important for radiation transfer for EP260321a.




Fig. 2 [数据拟合与模型对比]： Figure 2: The prompt X-ray (0.4-2 keV) light curve of EP260321a. The EP-WXT and EP-FXT data are taken from [32] . The curves are the model light curves from MC simulations: MC 1 (green), δ r = 4 × 10 12 cm \delta r=4\times 10^{12},\mathrm{cm} , τ m = 1.5 \tau_{m}=1.5 ; MC 2 (blue), δ r = 2 × 10 12 cm \delta r=2\times 10^{12},\mathrm{cm} , τ m = 2 \tau_{m}=2 ; MC 3 (red), δ r = 1.5 × 10 12 cm \delta r=1.5\times 10^{12},\mathrm{cm} , τ m = 3 \tau_{m}=3 . See text for the other parameters in the MC simulation.

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

推导了双激波结构中内能比 $E_3 = \mu E_2$ 与特征速度比 $\bar{v}_r = \mu v_f$（其中 $\mu = (\delta+2)^{-1} \simeq 1/7$），阐明正激波 $v_{f,bo} \sim 0.5c$ 处于非局部热平衡（non-LTE）而低速反激波 $\bar{v}_{r,bo} \sim 0.07c$ 满足 LTE 并主导黑体热辐射。测定破越半径 $r_{bo} \simeq 5 \times 10^{12}$ cm $\gg R_\star$，确认星风需在 $r_w \sim 10^{13}$ cm 处截断且散射介质壳层质量约为 $M_m \sim 10^{-3} \tau_m \, M_\odot$。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

重点理解正反激波内能比 $\mu = (\delta+2)^{-1}$ 的推导及有限球壳蒙特卡罗辐射转移时延的计算。

PAPER 08 ⭐ 必读精选 🧭 综合前沿课题 (General Highlights) arXiv:2610.29838

[arXiv:2610.29838] PSR J0653+0443: An Eclipsing Millisecond Pulsar in an Extremely Eccentric Double Neutron Star System

PSR J0653+0443: An Eclipsing Millisecond Pulsar in an Extremely Eccentric Double Neutron Star System

作者： Z. L. Yang, J. L. Han, L. G. Hou, Z. W. Chen, Y. G. Gong 等 arXiv 原文 | PDF 直达 | SciX (ADS) | 站内交互雷达

RESEARCH HIGHLIGHT & BREAKTHROUGH / 核心突破与推荐理由

【核心突破】： 测得轨道周期 $79.08\,\mathrm{d}$、近星点速度 $1140\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ 与平均引力波光度 $1.9\times10^{-4}\,L_\odot$，通过消除协方差模型精确提取后开普勒参数，约束次级星反冲速度达数百 $\mathrm{km\,s^{-1}}$。

【推荐理由】： 报道了目前已知轨道偏心率最高（$e=0.992387$）的掩食双中子星系统，提供了强引力场演化、超新星反冲与毫赫兹引力波的独特观测实验室。

🔍 科学问题与背景 (Problem)

传统双中子星形成演化图景中，电子俘获超新星（ECSNe）或超剥离超新星（USSNe）产生的反冲速度较低，难以解释轨道周期长达近 80 天却具有 $e>0.99$ 的极端偏心 DNS 系统的存在；同时，极端偏心率导致现有经典 DD/DDGR 测时模型中开普勒参数间存在极强的数学协方差，制约后开普勒效应与系统参数的精确提取。

🛠️ 观测与研究方法 (Methodology)

1. 观测与数据处理：利用 FAST L 波段（1.0–1.5 GHz）进行四偏振脉冲星高时间分辨率数据采集，使用 DSPSR 叠加脉冲轮廓，PSRCHIVE 提取脉冲到达时间（TOA），并用 TEMPO2 建立相位连接的测时解；\n2. 测时模型创新：针对极端离心率导致 x 与 ω 极高协方差问题，构建了参数重构 $\zeta_1\equiv x\sin\omega/e$ 和 $\zeta_2\equiv x\cos\omega\sqrt{1-e^2}$，建立了消除强相关性的 DDe/DDGR+/DDeGR+ 测时模型；\n3. 形成演化模拟：结合 MESA 恒星演化程序模拟初级星经历 Case BB 物质转移吸积与自转加速，并采用双星星族合成计算次级星发生铁核塌缩超新星（Fe CCSNe）所赋予的反冲速度 V_k（$\sim$ 200–800 $\mathrm{km\,s^{-1}}$）及其轨道形成概率。

📐 物理模型与关键假设 (Models & Assumptions)

- 双星引力波辐射及轨道衰减演化遵循广义相对论 Peters-Mathews 方单

⚠️ 局限性与观测边界 (Limits & Caveats)

- 星族合成模拟显示在 $\sigma_\mathrm{k}=265\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ 条件下形成此类高偏心率及相应周期的 DNS 概率极低（$\lesssim 2.5\times10^{-5}$），表明目前该类型系统的统计演化样本极度受限




Fig. 3 [数据拟合与模型对比]： Figure S5: Δ χ 2 \Delta\chi^{2} map for ω ˙ GR \dot{\omega}{\rm GR} and ω ˙ EX \dot{\omega}{\rm EX} after the best-fitting the timing model to timing data of PSR J0653+0443. Panel (A) shows the probability distribution with the contours at the Δ χ 2 = 1 \Delta\chi^{2}=1 , 4 and 9, and the red cross marks the best-fit value. Panels (B) and (C) show the 1D cumulative possibility density distribution functions (CDF), and the best derived ω ˙ GR + ω ˙ EX = (1.7791 − 0.0009 + 0.0013) × 10 − 2 \dot{\omega}{\rm GR}+\dot{\omega}{\rm EX}=(1.7791^{+0.0013}_{-0.0009})\times 10^{-2} deg yr -1 and ω ˙ EX = (− 1.50 − 0.80 + 0.88) × 10 − 4 \dot{\omega}{\rm EX}=(-1.50^{+0.88}_{-0.80})\times 10^{-4} deg yr -1 .




Fig. 4 [核心物理演化图]： Figure S6: Normalized probability density distribution of DNS systems in the parameter space of orbital period and eccentricity . Panel (A) show the probability density distribution of DNS systems produced in electron-capture supernova (ECSNe) or ultra-stripped supernovae (USSNe) in the population synthesis, with a kick velocity dispersion of σ k = 30 km s − 1 \sigma_{\rm k}=30~{\rm km~s^{-1}} . Squares represent DNS systems in the ATNF Pulsar Catalogue version 2.7.0 (not including those in global clusters), open squares indicate DNS candidates Manchester et al. (2005) , and the red star marks PSR J0653+0443. Panel (B) is similar to Panel (A) but for DNS systems produced in an iron-core collapse supernova (CCSNe) models with σ k = 265 km s − 1 \sigma_{\rm k}=265~{\rm km~s^{-1}} .

📊 关键结论与定量测量 (Quantitative Results)

通过 FAST 测时与近星点跟踪，测得双星轨道周期 $P_{\rm orb} = 79.0840618(1)\,{\rm d}$，偏心率高达 $e = 0.99238692(5)$，投影半长轴 $x = 125.54(3)\,{\rm lt\text{-}s}$。在近星点处测得相对速度峰值 $v_{\rm pc,max} = 1.14 \times 10^3\,{\rm km\,s^{-1}}$，加速度达 $Acc_{\rm pc,max} = 1.11 \times 10^3\,{\rm m\,s^{-2}}$，最小轨道间距 $S_{\rm pc,min} = 0.83\,R_\odot$。在合相处探测到持续 85 s 的射电掩食（真近点角跨度 $\Delta\theta = 6.84^\circ$），约束轨道近乎侧向视角。通过拟合近星点进动率 $\dot{\omega} = 0.017785(11)\,{\rm deg\,yr^{-1}}$ 及 Shapiro 时延，结合贝叶斯分析测得系统总质量 $m_{\rm t} = 2.814^{+0.018}_{-0.021}\,M_\odot$、脉冲星质量 $m_{\rm p} = 1.38^{+0.06}_{-0.10}\,M_\odot$、伴星质量 $m_{\rm c} = 1.44^{+0.08}_{-0.06}\,M_\odot$ 以及倾角 $i = 76^{\circ+8^\circ}_{-15^\circ}$；限制外加非相对论进动率为 $\dot{\omega}_{\rm EX} = (-1.5^{+0.9}_{-0.8}) \times 10^{-4}\,{\rm deg\,yr^{-1}}$。在引力波（GW）辐射方面，系统在近星点发出周期性脉冲状 GW 暴，平均引力波辐射光度为 $L_{\rm GW} = \frac{32}{5}\frac{G^4 m_{\rm p}^2 m_{\rm c}^2 (m_{\rm p}+m_{\rm c})}{c^5 a_{\rm pc}^5 (1-e^2)^{7/2}}\left(1+\frac{73}{24}e^2+\frac{37}{96}e^4\right) = 1.9 \times 10^{-4}\,L_\odot$，能流峰值频率位于 $f_{\rm p0} \approx \frac{(1+e_0)^{\gamma_{\rm GW}}}{(1-e_0^2)^{3/2}} f_0 = 0.357\,{\rm mHz}$（其中 $\gamma_{\rm GW} = 1.1954$）。

🎯 建议精读切入点 (Reading Guide)

研读文中针对极端离心率构建的新测时参数 ζ_1, ζ_2 消除协方差的方法及 MESA 双星演化历史重构。

3. 📌 本周重点关注文献 (Worth-Knowing Selected Works · 共 90 篇)

STRUCTURED COMPENDIUM

以下文献针对特定物理机制或子方向提供重要观测线索与实测约束，采用前沿精选卡片与总览表格双轨呈现。

3.1 重点关注 · 特选导读 (Featured Highlights · 共 10 篇)

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.22662] The transformative power of ALMA2040 for mm-VLBI**

原题： The transformative power of ALMA2040 for mm-VLBI | **作者：** The Event Horizon Telescope Collaboration | PDF

【推荐理由】： 系统论证了全阵列定相 ALMA2040 对下一代 mm-VLBI 视界尺度喷流成像与致密等离子体组分诊断的技术飞跃。

【核心要点】： 在 230 GHz 获得 4 倍基线灵敏度提升，达到 sub-mJy 极限，可将黑洞视界及瞬变喷流成像拓展到弱 5–10 倍的暗弱目标。

【阅读切入】： 重点查看利用频率相位转移（FPT）提升条纹探测信噪比的技术实现方案与 GRMHD 模拟预期对比。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.22709] A New AI/ML Based Image Reconstruction Technique for Hard X-ray Coded Aperture Imagers**

原题： A New AI/ML Based Image Reconstruction Technique for Hard X-ray Coded Aperture Imagers | **作者：** Shayla Sharmin, Branden Allen | PDF

【推荐理由】： 提出了首个打破编码孔径平移不变性限制的深度学习反卷积框架，显著增强了非平面大视场硬 X 射线探测器的瞬变源定位能力。

【核心要点】： CNN-Transformer 混合模型在极高背景噪声（13000 计数）与非平移不变几何下仍可实现 0.25 s 快速推理与 $> 67\%$ 的精准单像素定位。

【阅读切入】： 关注损失函数中泊松负对数似然与 Softplus 激活的配合使用，评估其在高能宽视场探测器中的落地可能。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.22816] A Unified Solution to the Low-Mass X-ray Binary Diversity Puzzle: Saturated Magnetic Braking Coupled with Irradiation-Driven Winds**

原题： A Unified Solution to the Low-Mass X-ray Binary Diversity Puzzle: Saturated Magnetic Braking Coupled with Irradiation-Driven Winds | **作者：** Zhu-Ling Deng, Xiang-Dong Li, Bo Wang 等 | PDF

【推荐理由】： 通过饱和磁制动耦合吸积辐照风，统一解释了中子星低质量 X 射线双星的吸积率阶梯与超致密双星的形成难题。

【核心要点】： 引入物理辐照风效率 $f \in [10^{-5}, 10^{-3}]$ 拓宽了通往 UCXB 的分叉空间，自洽重现了 2A 1822–371 反常轨道膨胀与毫秒脉冲星周期空缺。

【阅读切入】： 阅读 MESA 演化轨迹中辐照风角动量损失放大因子 η 与磁制动饱和机制的耦合推导。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23028] Gamma-ray calorimetry of Seyfert winds**

原题： Gamma-ray calorimetry of Seyfert winds | **作者：** Alberto Domínguez | PDF

【推荐理由】： 通过严谨的 Fermi-LAT 堆叠与量能器建模，定量澄清了射电宁静活动星系核超快外流的强子高能辐射效率。

【核心要点】： 测得塞弗特星系外流强子量热分数仅为 $\rho_{\rm wind} = 0.020$，相比星暴超风低 13.5 倍，表明其缺乏致密靶气体进行有效 pp 碰撞产生 GeV 辐射。

【阅读切入】： 关注理论上限光度 $L_\gamma^{\rm max}$ 的定义方法及基于碰撞时标 t_{pp} 的删失数据蒙特卡罗处理。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23081] What can a uniform reflection pipeline establish about supermassive black hole spin? An audit and a corrected analysis of 57 AGN with XMM and NuSTAR**

原题： What can a uniform reflection pipeline establish about supermassive black hole spin? An audit and a corrected analysis of 57 AGN with XMM and NuSTAR | **作者：** K. Balasubramaniam, H. -K. Chang, Ł. Stawarz | PDF

【推荐理由】： 对采用 X 射线相对论反射谱测量 SMBH 自旋的自动化拟合流程进行了极具批判性的严密审计，揭示出严重系统误差。

【核心要点】： 在重新扣除背景并消除局部极小值后，41 个样本中仅 18 个通过质检且仅 1 个源（NGC 4051）具有稳健双边自旋约束，多数极向自旋拟合极度脆弱。

【阅读切入】： 重点查看多起点网格优化如何揭示 (a_*, i) 参数空间中的伪简并以及模型边界截断效应。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23089] Maximal efficiency of geometric beaming and polarization of highly super-Eddington X-ray sources**

原题： Maximal efficiency of geometric beaming and polarization of highly super-Eddington X-ray sources | **作者：** Varpu Ahlberg, Alexandra Veledina, Eugene Churazov 等 | PDF

【推荐理由】： 打破了超爱丁顿吸积源中几何集束的过度简化假设，给出了基于散射辐射转移的真实集束因子上限与偏振预言。

【核心要点】： 由于多次散射导致的大角度逃逸，现实漏斗几何集束上限为 $\mathcal{B} \lesssim 10$，纯电子散射线偏振度上限 $\sim 10\%$ 且与集束因子呈反相关。

【阅读切入】： 重点研读利用 Chandrasekhar H 函数精确处理漏斗壁反射边界及 Stokes 参数光行差变换的代码框架。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23140] Seeing Through the RFI Mask: DT-FISTA Inpainting of Pulsar Dynamic Spectra via Fourier Sparsity**

原题： Seeing Through the RFI Mask: DT-FISTA Inpainting of Pulsar Dynamic Spectra via Fourier Sparsity | **作者：** Yuanshang Huang, Xun Shi | PDF

【推荐理由】： 针对射电脉冲星动态谱 RFI 掩模问题提出快速稀疏修复算法，将运算与显存大幅缩减数千倍，为高保真闪烁弧提取提供关键工具。

【核心要点】： DT-FISTA 算法将归一化均方根误差降低 $37\% \sim 53\%$，运算速度相比稠密维纳滤波提升近万倍（耗时从数小时压缩至 $1.72\,\mathrm{s}$）。

【阅读切入】： 建议重点考察复软阈值调度策略与 Nesterov 动量外推在保证数据一致性投影中的结合方式。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23155] Ranking Prompt--Plateau Correlations in Gamma-Ray Bursts with Symbolic Regression**

原题： Ranking Prompt--Plateau Correlations in Gamma-Ray Bursts with Symbolic Regression | **作者：** Fatemeh Rastegarnia, Rahim Moradi, Brwa Shukur Ismael 等 | PDF

【推荐理由】： 利用符号回归机器学习方法在排除红移虚假相关的严苛条件下，发现了弥散显著优于经典 Dainotti 关系的 GRB 新标度律。

【核心要点】： 收敛发现平面关系 $\log L_a \propto 0.78 \log L_{\rm peak} - 0.81 \log T_a^{\rm rest}$，内禀弥散降至 $0.52\,\mathrm{dex}$，偏相关在排查 $D_L(z)$ 影响后依然稳健（$p \sim 10^{-19}$）。

【阅读切入】： 关注 PySR 符号演化树搜索流程以及基于置换检验的零假设排除测试设计。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23339] The Dancing Bonfire: An Unusual Persistent X-ray Source in M81 Exhibiting Recurrent Luminous Flares**

原题： The Dancing Bonfire: An Unusual Persistent X-ray Source in M81 Exhibiting Recurrent Luminous Flares | **作者：** Jiachang Zhang, Zhiyuan Li, Xiangdong Li 等 | PDF

【推荐理由】： 报道了近邻星系中极为反常的超爱丁顿脉动中子星候选体，其快升慢衰耀斑复发机制对吸积势垒模型提出挑战。

【核心要点】： M81F4 持久光度达 $10^{38\text{–}39}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$ 且每隔约 $0.5\,\mathrm{d}$ 爆发一次释放 $10^{41}\,\mathrm{erg}$ 的百秒耀斑，磁层截断半径解析表明其为 $B \sim 10^{12\text{–}13}\,\mathrm{G}$ 的中子星。

【阅读切入】： 重点查阅 FRED 耀斑叠加剖面分析与吸积盘 RII 粘滞不稳定性阻滞条件的理论匹配。

⭐ 重点关注 **[arXiv:2610.23359] A blazar is a blazar is a blazar ... Comparing long-term varaibility properties of PKS 1510-089 and PKS 2155-304**

原题： A blazar is a blazar is a blazar ... Comparing long-term varaibility properties of PKS 1510-089 and PKS 2155-304 | **作者：** M. Zacharias, A. Wierzcholska | PDF

【推荐理由】： 基于长达 20 年的跨波段监测严格检验了耀变体长期变异性，明确指出了标准单区轻子辐射模型的局限性。

【核心要点】： 两类源多波段互相关在 $> 3\sigma$ 上均无显著延迟，且高能端通量动态范围显著拓宽，PKS 1510-089 呈现盘与喷流双对数正态结构，要求分层喷流模型。

【阅读切入】： 阅读离散互相关函数（DCCF）显著性蒙特卡罗构建与单/双对数正态分布 AIC 判据对比。

3.2 重点关注 · 全周论文简表 (Weekly Compendium · 共 80 篇)

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.31583 2026-10-22	**Formation and Detectability of PSR J0653+0443-like Extremely Eccentric Binary Neutron Stars in the Milky Way** *Formation and Detectability of PSR J0653+0443-like Extremely Eccentric Binary Neutron Stars in the Milky Way* Zhiwei Chen, Jihui Zhang, Youjun Lu	基准模型 M_1（$\alpha = 5, f_{\rm HG} = 0.8$）最佳拟合银河系 BNS 轨道参数分布，对应局部合并率密度为 $R_0 \sim 149\,\mathrm{Gpc^{-3}\,yr^{-1}}$。在 FAST GPPS 可探测样本中，$e > 0.99$ 系统的占比为 $f_{\rm GPPS} = 0.64\%$，预期探测数目为 $\lambda_{\rm GPPS} \simeq 0.31$，对应至少探测到 1 颗的概率为 $P(N^e_{\rm GPPS} \geq 1) = 1 - \exp(-\lambda_{\rm GPPS}) \simeq 26.7\%$；低偏心率（$e \lesssim 0.30$）系统由 ECSN/USSN 主导，而 $e \gtrsim 0.9$ 系统则主要由伴随大出生踢角弥散（$\sigma_{\rm k,2} \sim 265\,\mathrm{km\,s^{-1}}$）或大质量损失的 CCSN 通道形成。	Statistical Properties of Extremely Eccentric BNS
arXiv:2610.31559 2026-10-22	**A Generalized Framework for Rapid Polarization Response Generation in Wide Field-of-View Compton Polarimeters** *A Generalized Framework for Rapid Polarization Response Generation in Wide Field-of-View Compton Polarimeters* Mohamed Gamal Zaid, Merlin Kole, Mark McConnell 等	给出了全能段（数十 keV 至 ~ 1 MeV）及任意离轴天顶角 δ、方位角 λ、偏振角 ϕ_o 下的解析方位散射角分布（ASAD）。提出的 Mode 1 仅需非偏振模拟先验，将单能点模拟量削减 98%（由 62 次减至 1 次），耗时由两周压缩至 ~ 5 小时；提出的 Mode 2 利用基底分解式 $\mathcal{M}^{\rm pol}_{\phi_o}(\varphi) = \mathcal{M}^{\rm unp}(\varphi) + \left[\mathcal{M}^{\rm pol}_{0^\circ}(\varphi) - \mathcal{M}^{\rm unp}(\varphi)\right]\cos 2\phi_o + \left[\mathcal{M}^{\rm pol}_{45^\circ}(\varphi) - \mathcal{M}^{\rm unp}(\varphi)\right]\sin 2\phi_o$，仅需非偏振及 $\phi_o = 0^\circ, 45^\circ$ 两次偏振模拟（节省 95% 模拟量），使 POLAR 全质量模型的残差中位约化卡方从 Mode 1 的 $\chi^2_\nu = 1.37 \sim 2.55$ 彻底降至统计噪声水平 $\chi^2_\nu \approx 1.00 \sim 1.01$，并在极强流强模拟下完全消除了 Mode 1 对偏振度 II 产生的系统低估。	Application to Polarization Analysis

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.31484 2026-10-22	**Prompt Jet Launching and Delayed Thermal Disk in Tidal Disruption Event for Prolonged Activity GRB 220706A** *Prompt Jet Launching and Delayed Thermal Disk in Tidal Disruption Event for Prolonged Activity GRB 220706A* Yuri Sato, Rin Oikawa	1. 塌缩星模型无法成立：中心引擎在喷流头部到达表面前关闭（$t_{\rm engine}\sim 5\times10^{2}\,{\rm s} < t_{\rm bo}\sim10^{4}\,{\rm s}$），喷流被束缚于包层内部。 2. TDE 模型早期喷流：恒星回落时标 $t_{\rm fb}\sim 10^{6}\,\beta^{-3}(M_{\rm BH}/10^{5}M_{\odot})^{1/2}(M_{*}/50M_{\odot})^{-1}(R_{*}/20R_{\odot})^{3/2}\,{\rm s}$，少量碎片在时标 $\tilde{t}_{\rm acc,pro}\sim 10^{5}\,\beta^{-3/2}(\alpha_{\rm vis}/0.1)^{-1}(M_{*}/50M_{\odot})^{-1/2}(R_{*}/20R_{\odot})^{3/2}\,{\rm s}$ 内快速吸积输运磁通，通过 BZ 机制驱动喷流，各向同性伽马射线光度为 $L_{\gamma,{\rm iso,obs}}\sim 10^{50}\,x_{H}^{2}(\eta_{\rm BZ}/0.1)(\eta_{{\rm rad},\gamma}/0.1)(\theta_{j}/0.1\,{\rm rad})^{-2}(M_{\rm BH}/10^{5}M_{\odot})^{2}(B_{H}/10^{8}\,{\rm G})^{2}\,{\rm erg\,s^{-1}}$。 3. 延迟主盘与喷流关闭：碎屑在 $\tilde{t}_{\rm circ}\sim10^{6}\,{\rm s}$ 于圆化半径 $R_{c}\approx 2R_{p}$ 形成主盘，产生光度 $L_{\rm opt,obs}\sim10^{44}\,{\rm erg\,s^{-1}}$ 的光学热辐射；喷流活跃期随超爱丁顿吸积维持，关闭时标预测为 $\tilde{t}_{\rm off}\sim10^{9}\,(M_{\rm BH}/10^{5}M_{\odot})^{-2/5}(M_{*}/50M_{\odot})^{1/5}(R_{*}/20R_{\odot})^{3/5}\beta^{-6/5}\,{\rm s}$。	II Core collapse scenario
arXiv:2610.31450 2026-10-22	**Simulation-based inference of profile evolution for high-precision pulsar timing** *Simulation-based inference of profile evolution for high-precision pulsar timing* Sai C. Susarla, Gregory Ashton, A. Parthasarathy 等	在 PSR~J2145−0750 的 I-LOFAR（112.01--190.14~MHz）观测中，该方法实现了秒级摊销推断，推断的 DM 成功复现约 365 天周期的太阳风调制效应；与传统历元拟合序列的残差 RMS 达到 $2.7\times10^{-4}\ {\rm pc\ cm^{-3}}$（剔除低信噪比后为 $1.6\times10^{-4}\ {\rm pc\ cm^{-3}}$），正交距离回归斜率为 1.06 ± 0.09，两者的系统偏差常数确定为 $\hat{c}=(4.9\pm0.2)\times10^{-4}\ {\rm pc\ cm^{-3}}$。	Introduction
arXiv:2610.31182 2026-10-22	**The XMM-Newton view of the DEM L36 superbubble in the Large Magellanic Cloud** *The XMM-Newton view of the DEM L36 superbubble in the Large Magellanic Cloud* Pawel M. Janas, Patrick J. Kavanagh, Manami Sasaki 等	测得 DEM L36 内部软 X 射线热等离子体温度为 $kT\approx0.17\ {\rm keV}$（0.16–0.18 keV），总气体热能约为 $(3.56\pm0.90)\times10^{51}\ {\rm erg}$。假定等压状态下，东区压力满足 $P/k=(n_{e}+1.1n_{\rm H})T=2.31n_{\rm H}T=(7.45\pm1.96)\times10^{5}\ {\rm K\ cm^{-3}}$。星团历史机械能输入估算达 $(8.72\pm3.02)\times10^{51}\ {\rm erg}$，显著大于实测气体储存能量，表明其存在通过破裂（blowout）向外泄漏冷却的能量损失，同时高观测气体质量证实了冷壳层的质量加载（mass-loading）效应。	Analysis and results
arXiv:2610.30973 2026-10-22	**Weak Radio and Bright Early Optical Emission in EP260321a: A Comparative Study with XRO 080109 Reveals the Role of Circumstellar Material Mass** *Weak Radio and Bright Early Optical Emission in EP260321a: A Comparative Study with XRO 080109 Reveals the Role of Circumstellar Material Mass* Cui-Yuan Dai, Xiang-Yu Wang, Jian-He Zheng	通过多波段联合限制发现 EP260321a 的最快激波速度显著较慢（$\beta_{\rm bo}\lesssim0.02$–$0.08$），远低于 XRO 080109 的 $\beta_{\rm bo}\simeq0.25$；较慢的激波抑制了射电辐射并自然产生了热化软 X 射线谱。两者底层的超新星爆炸能量和整体抛射物速度基本一致（$v_{\rm bulk}\simeq1.0\times10^{9}(M_{c}/5M_{\odot})^{-0.114}\ {\rm cm\ s^{-1}}$ 与 $1.3\times10^{9}(M_{c}/5M_{\odot})^{-0.114}\ {\rm cm\ s^{-1}}$），观测差异主要由星周介质质量决定：EP260321a 爆发前发生了剧烈物质抛射，形成了致密的 CSM 壳层（$M_{\rm CSM}\simeq0.06\ M_{\odot}$，而 XRO 080109 仅为 $\sim10^{-7}\ M_{\odot}$），激波加热的大质量 CSM 壳层在亚天时标（$t_{\nu,p}\simeq0.5$–0.7 d）内释放储存的内能，产生峰值单色光度达 $\nu L_{\nu,p}\sim10^{42}\ {\rm erg\ s^{-1}}$ 的明亮冷却辐射。	A Unified Interpretation of EP260321a and XRO~080109
arXiv:2610.30879 2026-10-22	**Relativistic Dynamical Evolution of Kilonova Spectral Emission** *Relativistic Dynamical Evolution of Kilonova Spectral Emission* Sara Karimi, Soroush Shakeri	研究发现对于中等相对论性膨胀（$\beta\lesssim0.3$），光行时延迟效应（使边缘温度升高）与多普勒增亮效应（使视线方向 $\mu\approx1$ 增亮）作用方向相反并发生近似抵消，从而使观测温度呈现近各向同性，合理解释了 AT2017gfo 的准黑体特征；若忽略该相对论几何动力学效应，推断的动力学温度将被高估最高 7.6%、速度 β 将被高估约 11.9%。对 AT2017gfo 拟合给出有效膨胀速度随时间自 $\beta\simeq0.199\pm0.009$ 降至 0.122 ± 0.006，有效观测温度从 5428 K 降至 3061 K，简并组合量 $\kappa M_{\rm ej}$ 自 $(3.8^{+4.0}_{-1.5})\times10^{-2}$ 微增至 $(6.5^{+3.9}_{-2.4})\times10^{-2}\ {\rm cm^{2}\ g^{-1}\ M_{\odot}}$。	Observations and Methods
arXiv:2610.30770 2026-10-22	**Axial Perturbations of Extended Tolman III in the New $f(R,T)$ Theory** *Axial Perturbations of Extended Tolman III in the New $f(R,T)$ Theory* B. N. Jayawiguna, G. A. Sabian, H. S. Ramadhan 等	在线性修正引力 $f(R,T)=R+2\chi T$ 框架下，流体声速限制 $0<c_{s}^{2}<1$（其中 $c_{s}^{2}=\frac{1}{3}+\frac{8\pi}{3\chi}$）约束耦合参数 $\chi\in[-8\pi,4\pi]$。推导出修正的 Buchdahl 紧致度极限 $\beta_{\rm B}=\frac{128\pi^{2}+8\pi\chi-\chi^{2}}{288\pi^{2}}$ 以及主能量条件极限 $\beta_{\rm DEC}=\frac{48\pi^{2}+8\pi\chi-\chi^{2}}{128\pi^{2}}$。其轴向微扰有效势 $V(x)=\frac{e^{\nu}}{x^{2}}\left\{l(l+1)x+4\pi x^{3}\left[\rho\left(1+\frac{\chi}{4\pi}\right)-p\left(1+\frac{3\chi}{4\pi}\right)\right]-6m(x)\right\}$ 具有更深的势阱；采用 NICER 观测半径 $R=11.4\,{\rm km}$ 时，在 $\chi=0.96\pi$、紧致度 $\beta=0.4662702$ 下计算得到引力波回声时延 $\tau_{\rm echo}=2.39\times10^{2}\,{\rm ms}$，对应特征回声频率 $f_{\rm echo}=72.11\,{\rm Hz}$，与 GW170817 报道的 $\sim72\,{\rm Hz}$ 信号一致（广义相对论预言为 $5.19\times10^{2}\,{\rm Hz}$）。	Gravitational (Axial) Perturbation; Effective potential, quasinormal mode, and gravitational wave echoes
arXiv:2610.30722 2026-10-22	**Search for high-energy neutrinos from Einstein Probe detected Fast X-ray Transients using 14 years of IceCube muon track data** *Search for high-energy neutrinos from Einstein Probe detected Fast X-ray Transients using 14 years of IceCube muon track data* Sri Devaki Meduri, Shantanu Desai	在 27 个 FXT 位置均未发现具有统计显著性的高能中微子超额。最大检验统计量为 EP240801a（${\rm TS}=4.77$，局部 $p=0.04$）。计算给出的 90% 置信度微分缪子中微子通量上限处于 $\mathcal{O}(10^{-10})\ {\rm GeV\ cm^{-2}\ s^{-1}}$ 量级；在假定能谱指数 $\Gamma=2.0$ 及转折能量 $E_{0}=100\ {\rm TeV}$ 下，最严格的上限由 EP241021a 给出：$E^{2}\Phi(E)=2.1\times10^{-10}\ {\rm GeV\ cm^{-2}\ s^{-1}}$。	Analysis and Results

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.30674 2026-10-22	**Early panchromatic spectra reveal helium in the thermonuclear supernova 2024kce** *Early panchromatic spectra reveal helium in the thermonuclear supernova 2024kce* Abigail Polin, Dillon Hasenour, Sahana Kumar 等	在极大光度前 -11.0 d 证认出速度达 $v = 16,400 \pm 120$ km s^{-1}（至 $+8.2$ d 减速至 $14,100 \pm 290$ km s^{-1}）的高速 \ion{He}{1} 吸收复合体，非热激发需要放射性元素衰变（^{56}Ni, ^{52}Fe, ^{48}Cr）提供驱动；流体动力学与辐射转移模拟确定最佳匹配模型为总质量 $0.78\,M_\odot$ 的亚钱氏白矮星系统，包含 $0.69\,M_\odot$ 的 C/O 核心与 $0.09\,M_\odot$ 的氦壳层。	Main:
arXiv:2610.30656 2026-10-22	**Photometric classification and out-of-taxonomy detection of ZTF transients with FLARE** *Photometric classification and out-of-taxonomy detection of ZTF transients with FLARE* Argyro Sasli, Felipe Fontinele Nunes, Xuanrui Zhang 等	通过结合 160 个光变曲线特征与宿主星系测光、点源背景及基于平坦 ΛCDM 宇宙学模型（$H_0 = 70$ km s^{-1} Mpc^{-1}, $\Omega_m = 0.3$）下由光度红移导出的伪绝对星等 $M_{\rm pseudo} = m_{\rm peak} - 5\log_{10}[d_L(z_{\rm phot})/10\,{\rm pc}]$，模型宏 F_1 达到 0.83 ± 0.02。在 1% 虚警率（FPR）下，利用基于 log-sum-exp logits 的 energy 打分器及主动复核循环，仅检查 6% 的警报流即可召回 60% 的分类系统外异常天体，相比静态排序减少了 45% 的人工审核工作量，并在实机回放中成功捕获 FBOT AT 2018cow 及 GRB 对应体。	Methods
arXiv:2610.30604 2026-10-22	**Multiwavelength Classification of Chandra Sources in Omega Centauri** *Multiwavelength Classification of Chandra Sources in Omega Centauri* Steven Chen, Oleg Kargaltsev, Jeremy Hare 等	研究在 omega Cen 中确立了 25 个可靠的星团成员 X 射线源，若计入候选激变变星（CV）、毫秒脉冲星（MSP）和巨星色球活动双星（AB）则达 44 个（与理论预期的 ~ 48 个成员一致）。确认了 18 个背景 AGN、12 颗前景恒星、6 个巨星 AB、9 个 CV，以及双星 MSP Q 与黑寡妇蜘蛛脉冲星 MSP K；同时发现了 7 个候选 MSP（含 2 个 WD-MSP 双星候选体）。此外，在 7 颗孤立 MSP 周围 $3''$ 范围内检测到 ~ 5 颗白矮星（WD）超额（亮 WD 超额显著性 $> 3\sigma$），揭示出致密星团环境下可能存在被动力学瓦解或处于极宽轨道的 WD 伴星遗迹。	IV.2 Identification of Counterparts
arXiv:2610.30506 2026-10-22	**Simulations of a Conducting Sphere Moving through Magnetized Plasma II: Effect of Internal Magnetic Fields and Enhancement of Alfvénic Drag** *Simulations of a Conducting Sphere Moving through Magnetized Plasma II: Effect of Internal Magnetic Fields and Enhancement of Alfvénic Drag* Nicholas Corso, Dong Lai	数值模拟表明，当导电球体内禀磁场与背景场反平行（$\theta_{\rm m} = 180^\circ$）时，有效阻力半径由磁层顶决定为 $R_{\rm eff} = R(1 + b_{\rm in})^{1/3}$，阻力系数遵循 $C_{\rm A} \simeq 1.2(1 + b_{\rm in})^{2/3}$；而在非反平行（如平行 $\theta_{\rm m} = 0^\circ$）情况下，由于开放连接磁通（linked flux $\Phi_{\rm L}$）的增强，阻力系数显著提高约一个数量级至 $C_{\rm A} \simeq 20\, b_{\rm in}^{2/3}$。综合两项效应得到通用的阿尔芬阻力系数关系式： $$C_{\rm A}(b_{\rm in}, \theta_{\rm m}) \simeq 1.2(1 + b_{\rm in})^{2/3} + 20\, b_{\rm in}^{2/3} \cos(\theta_{\rm m}/2)$$ 耗散功率满足 $P = C_{\rm A}\rho_0 R^2 v_0^2 v_{\rm A0} \propto \Phi_{\rm L}$。在亚阿尔芬流（$M_{\rm A} \lesssim 0.1$）极限下，$C_{\rm A}$ 趋于与马赫数无关的常数。	Sub-Alfv'enic Regime
arXiv:2610.30378 2026-10-22	**Chandra and Multiwavelength Study of Pevatron Candiate HESS J1702-420A** *Chandra and Multiwavelength Study of Pevatron Candiate HESS J1702-420A* Hui Yang, Yichao Lin, Jeremy Hare 等	Chandra 观测将 XMMU J170147.3-421407 分辨为一个微弱非时变点源 Src11（CXO J170144.5-421415）及非对称的东西双瓣弥散发射。在 $N_{\rm H} \approx 2.2^{+0.9}_{-0.8} \times 10^{22}\,{\rm cm}^{-2}$ 吸收下，西瓣谱指数为 $\Gamma_{\rm west} = 1.3 \pm 0.3$，东瓣为 $\Gamma_{\rm east} = 1.7 \pm 0.3$，点源谱指数为 $\Gamma = 1.4 \pm 1.0$；假定距离 $d = 4.7$ kpc，系统辐射性质符合经验脉冲星/PWN 标度分布（$L_{\rm X,psr}$--$L_{\rm X,pwn}$ 与 $L_{\rm X}$--L_γ），弥散形态更支持亚音速喷流或被 SNR 反向激波剥离畸变的遗迹 PWN 场景。	Discussion
arXiv:2610.30286 2026-10-22	**Nuclear Millimeter Continuum Emission in Radio-Quiet Active Galactic Nuclei: an ALMA Spectral and Variability Study** *Nuclear Millimeter Continuum Emission in Radio-Quiet Active Galactic Nuclei: an ALMA Spectral and Variability Study* Sophie M. Venselaar, Claudio Ricci, Yoshiyuki Inoue 等	基于 9 个近邻 RQ AGN 的 100、145 与 233 GHz 准同时观测，测得宽波段毫米谱指数中位值为 $\alpha_{\rm mm} = 0.35 \pm 0.09$（范围在 -0.05 至 0.88 之间），偏平谱特征符合同步辐射自吸收（SSA）翻折区或自由-自由吸收混合；在 3 个源中探测到 4–11 天内幅度为 30%–55% 的显著时变（$> 3\sigma$），约束毫米辐射区尺度上限为 $R_{\rm mm} \le c \times \Delta t \lesssim (3.4\text{–}5.0) \times 10^{-3}$ pc（即 1.0×10^3–$1.4 \times 10^4\,R_{\rm g}$，其中 $R_{\rm g} = GM_{\rm BH}/c^2$），亮温度达 $T_{\rm b} \sim 7.52 \times 10^7$–$1.86 \times 10^9$ K，排除了热尘埃与自由-自由辐射主导；确立了 145 GHz 与 X 射线的紧密标度关系：$\log(L_{145\rm GHz}) = (1.42 \pm 0.19)\log(L_{2-10}) - (22.67 \pm 8.26)$ 以及 $\log(L_{145\rm GHz}) = (1.34 \pm 0.09)\log(L_{14-150}) - (19.69 \pm 3.90)$。	Discussion
arXiv:2610.30276 2026-10-22	**Gone Without a Bang: A Search for Failed Core-Collapse Supernovae in ZTF and Predictions for Rubin and Roman** *Gone Without a Bang: A Search for Failed Core-Collapse Supernovae in ZTF and Predictions for Rubin and Roman* Shion Murakawa, Paul Draghis, Kevin Burdge 等	基于 ZTF 搜寻结果，若候选体皆为非 FccSN，在 99% 置信度下给出 ZTF 观测率上限为 < 61 century^{-1}，推得银河系 FccSN 发生率上限为 < 147 century^{-1}；银河系恒星形成模拟预测的银河系发生率约为 0.789 ± 0.022 century^{-1}，ZTF 视场与星等限制下预测探测率约为 0.234 ± 0.006 century^{-1}，显示当前观测零检测对理论模型尚未构成紧致限制。	Discussion

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.30262 2026-10-22	**Charting the Galactic Underworld II: Strategies for Identifying BHs and NSs with LISA** *Charting the Galactic Underworld II: Strategies for Identifying BHs and NSs with LISA* Tom Wagg, Frank E. Prince, Katelyn Breivik 等	在 8 年巡天基准模型下，LISA 预计能探测到约 20–240 个含 BH 或 NS 的双致密天体。通过判据组合可识别 90%–100% 的 BHBH 与 BHNS 以及约 50% 的 NSNS：(1) 结合引力波旋进光度与时延标度 $\dot{f} \propto f_{\rm orb}^{11/3}$，低频截止 $f_{\rm orb} + \Delta f_{\rm orb} < f_{\rm orb}^{\rm WDWD,min} = 3 \times 10^{-4}\,{\rm Hz}$ 能单独识别约 70% 的 BHBH；(2) 极限质量判据 $\mathcal{M}_c - \Delta\mathcal{M}_c > 1.25\,M_\odot$ 能确认约 60% 的 BHBH/BHNS 和 40% 的 NSNS；(3) 超新星反冲驱动的偏心率测量可额外识别 10%–20% 的 NSNS；(4) 处于 Roche 瓣物质转移（RLOF）阶段的 NSWD（约占 60%）会因轨道膨胀产生特征性的负频率导数 $\dot{f} < 0$，其中约 30 颗可被测出并对应超致密 X 射线双星（UCXB）。	Methods for distinguishing NS and BH DCOs from WDWDs in lisa
arXiv:2610.30259 2026-10-22	**The deepest X-ray view of a kiloparsec scale jet at z=6.1** *The deepest X-ray view of a kiloparsec scale jet at z=6.1* Fabio A. Meanti, Luca Ighina, Alberto Moretti 等	延展喷流在空间上分解为组分 A 和 B；核区光子指数为 $\Gamma = 1.86^{+0.09}_{-0.09}$，静止系光度 $L_{2-10\,{\rm keV}} = 7.22^{+0.62}_{-0.58} \times 10^{45}\,{\rm erg\,s^{-1}}$；整体延展喷流呈现更软的谱型（$\Gamma = 2.25^{+0.45}_{-0.44}$），其静止系光度 $L_{2-10\,{\rm keV}} = 1.31^{+0.51}_{-0.40} \times 10^{45}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，占核区光度比例高达 $L_{\rm ext}/L_{\rm core} \sim 18\%$，符合高红移处 CMB 能量密度 $U_{\rm CMB} \propto (1+z)^4$ 急剧上升驱动 IC/CMB 散射增强的图像。	X-ray spectral analysis
arXiv:2610.30255 2026-10-22	**$y$hosts from the past: reheating neutron stars with supernova-sourced ALPs** *$y$hosts from the past: reheating neutron stars with supernova-sourced ALPs* Debajit Bose, Sougata Ganguly, Tanmoy Kumar 等	超新星内部通过核子-核子韧致辐射（及 π^- 转换）产生的非相对论性 ALP 会被束缚在原中子星引力势阱中形成扩展约 $100\,{\rm km}$ 的粒子云，随后以寿命 $\tau_a^{-1} = g_{a\gamma\gamma}^2 m_a^3/(64\pi)$ 衰变释放光子加热中子星。基于冷中子星 PSR J2144−3933 的 HST 测光上限 $T_{\rm NS} \leq 3.4 \times 10^4\,{\rm K}$（对应 $L_{\rm NS} \leq 1.4 \times 10^{27}\,{\rm erg\,s^{-1}}$），在固定核子耦合 $g_{ap} = 2.7 \times 10^{-10}\,{\rm GeV^{-1}}$ 下排除了 $1 - 400\,{\rm MeV}$ 质量区间内大量未探测参数空间，灵敏度下限遵循标度关系 $g_{a\gamma\gamma} \propto m_a^{5/2}$，而衰变耗尽截断（天花板）遵循 $g_{a\gamma\gamma} \propto m_a^{-3/2}$。年轻中子星 Cas A（年龄约 $330\,{\rm yr}$）可封堵更强耦合天花板；未来若通过 JWST 等红外望远镜测定 $2000\,{\rm K}$ 中子星，由于 $g_{a\gamma\gamma} \propto \sqrt{L_{\rm NS}}$，耦合灵敏度可再推进 3 个数量级。	Neutron star reheating and ALP Limits
arXiv:2610.30233 2026-10-22	**General-purpose equations of state for hadron-quark matter: first application to accretion-induced phase transitions in neutron stars** *General-purpose equations of state for hadron-quark matter: first application to accretion-induced phase transitions in neutron stars* János Takátsy, Henrique Gieg, Tim Dietrich	吸积致强子-夸克相变过程在所有测试的混合物态方程中均未产生引力非束缚的抛射物（依据 Bernoulli 判据 $hu_t < -1$ 且 $v^r > 0$），排除了产生可观光学/紫外电磁暂现源的可能；强相变模型（如 BBKF 2.1）在 $\sim 1.3\,{\rm ms}$ 内中心发生剧烈振荡坍缩形成纯夸克核，界面伴随激波加热（$T \sim 20\,{\rm MeV}$），峰值中微子总光度 $L_\nu = \oint dS\, n^i \sqrt{\gamma}(\alpha F_i - \beta_i E)$ 可达 $\sim 10^{52}\,{\rm erg/s}$ 且 $L_{\bar{\nu}_e} \sim L_{\nu_e}$，而在弱相变模型中中微子辐射以 ν_e 为主且光度低约一个数量级。	Methods
arXiv:2610.30095 2026-10-21	**Modeling MAD Sgr A* flares and their dependence on spin** *Modeling MAD Sgr A* flares and their dependence on spin* Eleni Antonopoulou, Antonios Nathanail, Yosuke Mizuno 等	磁通管缠绕方向对黑洞自旋与盘旋转高度敏感：顺行及非自旋黑洞通量管向右顺时针缠绕；逆行黑洞（$a = -1/2, -15/16$）通量管在赤道附近随黑洞自旋缠绕，但在升高数个引力半径后发生急剧反转，转为与盘旋转方向同向缠绕。对于顺时针旋转盘，大自旋黑洞（$\lvert a\rvert = 15/16$）轨迹拟合最佳（通过率达 91%，$\tilde{\chi}_r^2 = 1.94$），而 Schwarzschild 黑洞拟合较差（通过率仅 18%，$\tilde{\chi}_r^2 = 4.8$）；MAD 模拟结果强烈支持大自旋 Kerr 黑洞，但在 Sgr A* 吸积率下其喷流效率（$\sim 150\%$）与缺乏强延伸喷流存在张力。	Conclusions
arXiv:2610.30093 2026-10-21	**Extended vs. thin screen approximation in astrophysical settings** *Extended vs. thin screen approximation in astrophysical settings* Manuel Adlberger, Tobias Kramer	对于点质量引力透镜，Fresnel-Kirchhoff 衍射积分（FKD）与三维全波动解的相对误差仅为 10^{-13}，中心视线极大放大率标度为 $\lvert F_{\rm max}\rvert^2 \approx 8\pi^2 GM\nu/c^3$。在随机高斯关联介质中，当无量纲参数 $X_{\rm c} = 2^{-1/3} l_{\rm c} k (\sigma_{\rm V}/k^2)^{2/3}$ 超过阈值时，闪烁指数 $s_I^2(z)$ 在特征距离 $z_{\rm c} = 2^{1/3} l_{\rm c} (\sigma_{\rm V}/k^2)^{-2/3}$ 处出现首峰并在 $\approx 2.5\,z_{\rm c}$ 处产生次峰；延展介质厚度增加使闪烁指数从薄屏的 Mercier 极限 $\lim_{z\to\infty} s_I^2(z) = 1 - \exp(-2\phi_{\rm RMS}^2)$ 渐近恢复为 1；二次谱中的闪烁弧曲率遵循 $c_\nu = \frac{z_{\rm obs} - z_{\rm screen}}{4\pi c} (\frac{2\pi}{k_0})^2 c_x^2$，延展介质中连续切片间的波场关联打破了薄屏模型的对称性，产生显著的非对称抛物线弧。	Thin screen approach in a random medium
arXiv:2610.29962 2026-10-21	**The diversity of late-time interaction in Type II supernovae** *The diversity of late-time interaction in Type II supernovae* Luc Dessart, Wynn V. Jacobson-Galán, K. Azalee Bostroem	当CDS质量从 $0.1\,M_\odot$ 增至 $2.0\,M_\odot$ 时，壳层密度与线光学深度显著增大，多普勒展宽减小，Lyα 辐射剧烈下挫，Fe线冷却占比在 $2.0\,M_\odot$ 时达到 71%；低氢包层质量（$M_{\rm H,env} \approx 0.19$–$6.86\,M_\odot$）的前身星由于更高的膨胀速度（$v_{\rm CDS} \sim 5002$–$10\,643\,{\rm km\,s^{-1}}$）和更低密度，呈现更高电离态且富N谱线增强；CDS内部或内层抛射物中形成的微量尘埃（如 $2 \times 10^{-4}\,M_\odot$）会引发光学发射线的红蓝不对称性。	Dependence on CDS mass
arXiv:2610.29942 2026-10-21	**PBR sensitivity to boosted dark matter explanation for the KM3-230213A event** *PBR sensitivity to boosted dark matter explanation for the KM3-230213A event* M. H. Reno, T. Venters, M. Abrate 等	若轻子分支比相等（$B_{\tau\tau} = B_{\mu\mu}$），在散射截面 $\sigma_0 = 10^{-33}$–$10^{-32}\,{\rm cm^2}$ 下，PBR 对持续 $1000\,{\rm s}$ 的瞬态暴发在 $E_\chi \gtrsim (1.5$–$4) \times 10^8\,{\rm GeV}$ 具有明确探测灵敏度，并在超高能端优于 KM3NeT；若介体 ϕ 具有轴矢量流质标量耦合，产生味依赖的轻子质量平方加权分支比 $B_{\tau\tau} = B_{\mu\mu} \times (m_\tau/m_\mu)^2$，将使 $\tau\tau$ 灵敏度提高近 20 倍，在 $E_\chi \approx 70$–$760\,{\rm PeV}$ 整个能段均全面超越 KM3NeT 的探测能力。	Results

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.29923 2026-10-21	**Cosmic Ray Observations using Coincident Scintillator and Radio Signals with the Beamforming Elevated Array for COsmic Neutrinos (BEACON)** *Cosmic Ray Observations using Coincident Scintillator and Radio Signals with the Beamforming Elevated Array for COsmic Neutrinos (BEACON)* Zachary Martin, Jackson Hinkel, Kira Perna 等	在 83 天运行中从 2500 万符合触发事例里证认出 22 例宇宙线候选事件，预期背景仅 0.11。候选事件入射电场峰值均值约为 $\sim 300\,\mu\mathrm{V/m}$，最高达 $\sim 3000\,\mu\mathrm{V/m}$；主偏振角与纯地磁辐射模型理论值 $\phi_{p,\mathrm{exp.}} = \sin^{-1}(\lvert\hat{\mathbf{e}}_{\mathrm{geo}} \times \hat{\mathbf{e}}_{\phi}\rvert)$ 高度吻合，纯地磁模型残差统计量 $Q^2_{a=0} = 3.04$（平均绝对角残差 $8.8^\circ \pm 6.4^\circ$），明显优于射电干扰背景（$Q^2_{a=0} = 9.46$）。	labelsec:analysis
arXiv:2610.29833 2026-10-21	**Neutron Star-Main-Sequence Star Collision: Formation and Long-Term Evolution of Thorne-Żytkow Objects** *Neutron Star-Main-Sequence Star Collision: Formation and Long-Term Evolution of Thorne-Żytkow Objects* Yuhao Guo, Xiao-Tian Xu, Dong Lai	TŻO 的形成与长期演化经历三个主要阶段：(1) 热弛豫阶段（时标 $\tau_{\mathrm{th}} \approx \xi \frac{G(M_*+M_{\mathrm{NS}})^2}{R_*}\frac{1}{L_{\mathrm{acc}}} \approx 2\times10^3\,\mathrm{yr}$），动力学激波与吸积驱动核温度升至 $T_{\mathrm{core}} \approx 3.3\times10^8\,\mathrm{K}$，爆发性 CNO 循环填补了经典模型在 8–$14\,M_\odot$ 的间隙；(2) 标准 TŻO 阶段（持续约 $10^7\,\mathrm{yr}$），恒星处于热平衡，半径膨胀至 $R \sim 10^3\,R_\odot$，光度稳定在 $L \approx 6.3\times10^4\,L_\odot$；(3) 黑洞增长阶段（持续约 $10^8\,\mathrm{yr}$），NS 塌缩为 BH。演化终局包层高度超爱丁顿，爱丁顿因子峰值达到 $\Gamma_{\mathrm{Edd}} \simeq 55$，并激发生长模（复频率 $\omega \simeq 0.741 + 0.115i$，增长时标 $\sim 10\,\mathrm{yr}$）的非绝热脉动不稳定性，驱动类似 LBV 的剧烈质量抛射。	Result
arXiv:2610.29800 2026-10-21	**SpinOctopus: A Versatile, User-Friendly, and Extensible Public Code for General-Relativistic Ray-Tracing in axisymmetric spacetime** *SpinOctopus: A Versatile, User-Friendly, and Extensible Public Code for General-Relativistic Ray-Tracing in axisymmetric spacetime* Shiyang Hu, Dan Li, Chen Deng 等	代码实现了对任意定态轴对称度规下事件视界半径 r_{eh} 的高精度求解（牛顿迭代容差达 10^{-15}），在 Kerr 时空下计算的黑洞阴影边界与解析临界曲线最大相对偏差仅 $\varepsilon = 8.9\times10^{-3}$（对应 Sgr A* 仅 $0.045\,\mu\mathrm{as}$）。给出了包含双极发射率 $j_\nu(r,\theta) = j_0(r_{\mathrm{base}}/r)^{p_7}\exp[-\theta^2_{\mathrm{pole}}/(2\sigma_j^2(r))]$ 的相对论喷流模型、高斯辐射球壳 $\mathcal{F}_{\mathrm{S}}(r) = \exp[-(r-r_{\mathrm{shell}})^2/(2\sigma^2_{\mathrm{shell}})]$ 的 Bondi 类吸积流模型，以及由几何薄盘辐射 $\ln[\mathcal{F}_{\mathrm{D}}(r)] = p_1\ln(r/r_{\mathrm{in}}) + p_2[\ln(r/r_{\mathrm{in}})]^2$ 穿盘光线累加所得的总观测特定强度 $I_{\mathrm{obs}} = \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} f_n \mathcal{F}_{\mathrm{D}}(r^i_{\mathrm{hit}}) g^i$，并在高倾角（如 80°）大质量粒子轨道中再现了引力透镜导致的光变峰分裂现象。	Ray-Tracing and Radiative Transfer
arXiv:2610.29436 2026-10-21	**Searches for coincident Gravitational Waves and High-Energy Neutrinos from the KM3NeT and ANTARES telescopes during O3** *Searches for coincident Gravitational Waves and High-Energy Neutrinos from the KM3NeT and ANTARES telescopes during O3* ANTARES Collaboration, KM3NeT Collaboration, O. Adriani 等	两项互补搜索（未建模触发搜索与阈下贝叶斯联合搜索）均未发现显著GW-HEN共源信号（最高关联事例 $\mathrm{IFAR} \lesssim 0.8\,\mathrm{yr}$）。对共同可探测源发生率密度给出 90% 置信度上限：基于阈下搜索，对于假定引力波能量 $E_{\mathrm{GW}} = 10^{-2}\,M_\odot c^2$ 与中微子各向同性能量 $E_{\mathrm{iso},\nu} = 10^{51}\,\mathrm{erg}$ 的瞬变源，其源率密度上限被约束为 $R_{\mathrm{UL}} < 4\times10^3\,\mathrm{Gpc^{-3}\,yr^{-1}}$；触发搜索排除了 SGC 与 ADI 模型在 $< 200\,\mathrm{Mpc}$ 内的辐射源。	Triggered search
arXiv:2610.29259 2026-10-21	**General Relativistic Simulations of the Nonlinear Evolution of r-modes in Rapidly Rotating Neutron Stars** *General Relativistic Simulations of the Nonlinear Evolution of r-modes in Rapidly Rotating Neutron Stars* Justin K. Yu, Andrew Melatos	数值模拟测得 $l = \lvert m\rvert = 2$ 的 r 模无量纲频率为 $\kappa = \lvert f_{\text{r-mode}}/f_{\text{spin,eq}} - 2\rvert \approx 0.7197$（对应 $f_{\text{r-mode}} \approx 1014\,\mathrm{Hz}$），比牛顿值 $\kappa_{\mathrm{N}} = 2/3$ 高约 8%，该偏差由相对论红移/参考系拖拽造成的频降 $\Delta\kappa_{\mathrm{GR}} = -0.0860$ 与离心形变造成的频升 $\Delta\kappa_{\mathrm{spin}} = 0.1510$ 共同抵消决定。随着振幅 $\tilde{\alpha}$ 增大，频率展现二次非线性依赖关系：$\kappa(\tilde{\alpha}) = 0.720 - 4.09\times10^{-3}\tilde{\alpha} - 1.56\times10^{-2}\tilde{\alpha}^2$（或 $f_{\text{r-mode}} \approx 1014 + 0.044\tilde{\alpha} + 6.8\tilde{\alpha}^2\,\mathrm{Hz}$）。在 $10\,\mathrm{kpc}$ 处测得的引力波特征应变为 $h_{\text{r-mode}} \approx 9.7\times10^{-22}$，比线性四极矩公式估算高约 35%。此外，在四极与径向伴生模式处测得引力波辐射振幅服从 $\propto \alpha_0^2$ 的标度律，提供了两列 r 模与轴对称模式发生三模非线性耦合（three-mode coupling）的直接证据。	Nonlinear r-modes
arXiv:2610.29243 2026-10-21	**Hybrid Stars with a Crossover Equation of State** *Hybrid Stars with a Crossover Equation of State* G. A. Tsalis, Ch. C. Moustakidis	研究发现平滑跨越导致物态方程相较纯强子相变软，降低了中子星最大质量；但当有效袋常数满足 $B_{\mathrm{eff}} \geq 180\,\mathrm{MeV}$ 时，最大质量仍可支撑超过 $2\,M_\odot$ 的天文观测下限。在过渡区，声速平方 c_s^2 产生峰值并随 B_{eff} 增大而更尖锐，高密度下渐近趋于共形极限 $1/3$。对于给定的夸克模型，相变交叉化学势 μ_{cros} 随着强子物态刚度参数 η 的增加而指数减小，且得到的无量纲潮汐形变度 Λ 与 GW170817 观测限制高度吻合。	Crossover Equation of State

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.29127 2026-10-21	**Investigating a TeV-Halo Candidate around PSR J1928+1746 with HAWC** *Investigating a TeV-Halo Candidate around PSR J1928+1746 with HAWC* The HAWC Collaboration, R. Alfaro, C. Alvarez 等	检测显著性达 $\sim 17\sigma$，内禀角延展为高斯宽度 $\sigma = 0.19^\circ \pm 0.02^\circ$（物理尺度 $R_{68} \simeq 22\ \mathrm{pc}$）。在参考能量 $E_0 = 12\ \mathrm{TeV}$ 处，对数抛物线拟合谱指数 $\alpha = 2.09 \pm 0.11$、曲率 $\beta = 0.35 \pm 0.08$、通量归一化 $K = (5.0 \pm 0.5) \times 10^{-15}\ \mathrm{cm^{-2}\ s^{-1}\ TeV^{-1}}$。在轻子扩散模型下，采用标度律 $D(E_e) = D_0(1 + E_e/3\ \mathrm{GeV})^{1/3}$ 拟合得到 $D(100\ \mathrm{TeV}) \simeq 2.1 \times 10^{27}\ \mathrm{cm^2\ s^{-1}}$（比 ISM 抑制约 500 倍）；单区轻子逆康普顿模型给出电子截止能量 $E_{\mathrm{cut},e} = 87^{+73}_{-28}\ \mathrm{TeV}$，能量需求 $W_e(E_e > 1\ \mathrm{TeV}) \simeq 3.3 \times 10^{46}\ \mathrm{erg}$，仅占自转减速能 $E_{\mathrm{sd}} \simeq 4.1 \times 10^{48}\ \mathrm{erg}$ 的 $< 1\%$，电子能量密度 $\epsilon_e \sim 2 \times 10^{-2}\ \mathrm{eV\ cm^{-3}}$，完全符合 TeV 晕特征。	The TeV-Halo Candidate near PSR~J1928+1746
arXiv:2610.28938 2026-10-21	**X-ray Comptonization in an Accreting Kerr Black Hole System with a Tilted Disc and Thermal Corona: A General-Relativistic Monte Carlo Simulation. II. Polarization Signatures** *X-ray Comptonization in an Accreting Kerr Black Hole System with a Tilted Disc and Thermal Corona: A General-Relativistic Monte Carlo Simulation. II. Polarization Signatures* Mainak Chatterjee, Dipankar Bhattacharya	研究发现 X 射线偏振信号由相互竞争的几何与辐射过程主导：(1) 在无散射极限下，Kerr 时空引力弯折捕获了强偏折且去偏振的光子，使 DOP 拟合振幅从平直时空的 $A = 11.02 \pm 0.64\%$ 升至 $A = 14.30 \pm 0.71\%$；光子发射半径从 $R_0 = 9.5\,R_{\mathrm{g}}$ 缩至 $4.5\,R_{\mathrm{g}}$ 时振幅从 8.84% 升至 11.02%。(2) 日冕多次康普顿散射与外盘反射起去偏振作用，外盘反照率 ρ_{alb} 从 0.15 增至 0.95 时振幅降至 $6.34 \pm 0.57\%$；进动 DOP 调制幅度从 1.007% 降至 0.548%。(3) 内外盘联合系统中，外盘稳态辐射显著稀释内盘进动效应，使全盘总 DOP 仅在狭窄范围（$\sim 2.8\%$）微弱波动（调制幅度仅约 0.09%，AOP 摆动仅约 0.3°），成功解释了为何 IXPE 未能在 Swift J1727.8-1613 等源中测出显著的 QPO 偏振调制。	Conclusions
arXiv:2610.28817 2026-10-21	**Probing the QPO and spectro-temporal evolution of MAXI J1750-327 with XPoSat during its first detected outburst : Constraints on black-hole mass and spin** *Probing the QPO and spectro-temporal evolution of MAXI J1750-327 with XPoSat during its first detected outburst : Constraints on black-hole mass and spin* Meghamani Haldar, Biki Ram, Shubhrangshu Ghosh 等	观测证实 MAXI J1750-327 在爆发初期经历快速硬到软态转变，内盘温度由 $T_{\mathrm{in}} = 0.43 \pm 0.04\ \mathrm{keV}$ 升至 0.92–$1.01\ \mathrm{keV}$，光子指数由 $\Gamma = 2.03 \pm 0.02$ 变陡至 $2.93^{+0.22}_{-0.23}$。基频 QPO 频率由历元 1 的 $\nu_{\mathrm{QPO}} = 1.75 \pm 0.05\ \mathrm{Hz}$ 单调漂移至历元 4 的 $8.77 \pm 0.22\ \mathrm{Hz}$，分数 rms 振幅由 9.1% 降至 6.8%（由 Type-C 向 Type-B 转变并在软态猝灭）。结合全局 Lense-Thirring 进动标度（$\nu \propto r_{\mathrm{in}}^{-3}$）与吸积盘截断半径 $R_{\mathrm{o},j} = \xi f_{\mathrm{col}}^2 D_{10} (N_{\mathrm{diskbb},j}/\cos i)^{1/2}\ \mathrm{km}$，在贝叶斯推断下测定黑洞质量为 $M_{\mathrm{BH}} = 7.92^{+6.19}_{-3.72}\,M_\odot$，无量纲自旋为 $a_* = 0.163^{+0.116}_{-0.056}$。	Discussion
arXiv:2610.28781 2026-10-21	**A Comprehensive X-ray Characterization of the Pulsar Wind Nebula CTB 87: Evidence for Reverse-Shock Interaction from Its X-ray and Broadband Emissions** *A Comprehensive X-ray Characterization of the Pulsar Wind Nebula CTB 87: Evidence for Reverse-Shock Interaction from Its X-ray and Broadband Emissions* Jaegeun Park, Jason Alford, Hongjun An 等	X 射线表面亮度剖面在 1--5 keV 与 5--10 keV 下的指数衰减尺度分别为 $l = 45''.0 \pm 1''.0$ 与 $36''.4 \pm 2''.3$（呈 3.4σ 显著差异），证实尺寸随能量增大而收缩的同步辐射冷却特征。全区积分谱排斥单幂律，折断幂律（BPL，$E_{\mathrm{b}} = 5.12 \pm 0.26\,\mathrm{keV}$，$\Gamma_1 = 1.89 \pm 0.05$，$\Gamma_2 = 2.73 \pm 0.10$）与指数截止幂律（CPL，$\Gamma = 1.23 \pm 0.10$，$E_{\mathrm{c}} = 5.29 \pm 0.67\,\mathrm{keV}$）拟合显著更优。演化单区模型显示反向激波在 $t \sim 4.7\,\mathrm{kyr}$ 时压缩星云使磁场增至 $B \sim 50\,\mu\mathrm{G}$，但稳态多区与单区模型均表明必须存在演化效应或多电子成分才能兼顾 X 射线弯折与 $\lesssim 1\,\mathrm{TeV}$ 处的伽马射线过剩。	Discussion
arXiv:2610.28775 2026-10-21	**Can we constrain the binary neutron star merger time from kilonova light curves?** *Can we constrain the binary neutron star merger time from kilonova light curves?* Noah Jamsin, Marion Pillas, Marko Ristić 等	在 Rubin/LSST 巡天节奏下，仅靠千新星光变反演并合时刻 t_0 的 90% 置信区间宽度中位数为 $5.49\,\mathrm{days}$；若在并合前 $3\,\mathrm{h}$ 引入两个相邻滤光片的测光上限，后验宽度可收缩约 60%；红移先验（固定 D_L）带来的改善 $< 5\%$。在 AT2017gfo 测光结合单点合成上升期观测的最优场景下，t_0 估计不确定度可压缩至 $0.03\,\mathrm{days}$（$0.72\,\mathrm{hours}$）。对于余辉扣除后的 GRB-KN 样本（如 GRB 211211A），1σ 精度可达 $8.7\,\mathrm{hours}$；若首个探测晚于并合 $\gtrsim 4\,\mathrm{days}$（如 GRB 060614），后验弥散则宽达 $> 120\,\mathrm{hours}$。	Discussion and Conclusions
arXiv:2610.28744 2026-10-21	**The renormalization-group running of neutrino mixing is undetectable** *The renormalization-group running of neutrino mixing is undetectable* Gabriela Barenboim, Mauricio Bustamante, Qinrui Liu	证明中微子外线处于质壳（$p^2 = m_i^2$），若强行设定 $\mu = Q$，外腿自能中出现的对数项 $\propto \ln(Q^2/M_X^2)$ 会通过简并放大效应精确抵消质量矩阵从 M_X 到 Q 的跑动，使物理混合矩阵退回为唯一的壳上矩阵 $\hat{U}$；顶点修正无简并放大且受圈因子抑制（SM 中非对角项受 GIM 机制压低至 $\sim 10^{-27}$）；零基线实验已给出严格限制（如跑动参数 $|\beta_{12}|, |\beta_{13}| \lesssim 0.006$--$0.008$），高能天体物理中微子到达地球的味比严格由固定混合矩阵 $\hat{U}$ 决定。	The argument, step by step

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.28741 2026-10-21	**Exploring PSR J0901-4046 as an ultra-slowly rotating neutron star versus a white dwarf** *Exploring PSR J0901-4046 as an ultra-slowly rotating neutron star versus a white dwarf* Banibrata Mukhopadhyay, Nirupam Roy, Zenia Zuraiq 等	若 PSR J0901-4046 为孤立强磁化白矮星（B-WD），其表面磁场仅需 $B_s \sim 6.4 \times 10^8 - 3.1 \times 10^{10}$ G（对应磁倾角 $\alpha \approx 2^\circ - 8^\circ$），能自然规避量子临界磁场 $B_{\rm crit} \approx 4.414 \times 10^{13}$ G 的抑制；白矮星转动能损率可充足支持射电辐射（如长周期源 GLEAM-X J162759.5-523504.3 达 $\dot{E}_{\rm rot} \gtrsim 10^{33}\ {\rm erg\ s^{-1}}$），且整星紫外光度 $L_{\rm UV} \lesssim 10^{30}\ {\rm erg\ s^{-1}}$，符合未探测到 X/UV 高能辐射的观测现状。	Modelling pulsar as a multipolar object
arXiv:2610.28740 2026-10-21	**A Hybrid Neural Network Emulator for M1 Neutrino Reaction Rates in Binary Neutron Star Merger Simulations** *A Hybrid Neural Network Emulator for M1 Neutrino Reaction Rates in Binary Neutron Star Merger Simulations* Yi Qiu, David Radice, Raffaele Ferrari 等	混合方案将总不透明度计算耗时降低约 8.7 倍，NN 前向传播比被替代的 2D 积分核快约 12 倍，使端到端 BNS 模拟全局吞吐量从 1.085×10^7 提升至 2.347×10^7 ZCPS（实现 2.16 倍整体加速）。全局合并模拟中中微子峰值光度达 $\simeq 3.4 \times 10^{53}\,{\rm erg\,s^{-1}}$，与基准积分模拟相比光度差异 $\lesssim 5\%$，平均能量差异 $\lesssim 1\%$；非束缚抛射物质量吻合在 10% 以内（$2.32 \times 10^{-3}\,M_\odot$ 对 $2.54 \times 10^{-3}\,M_\odot$），质权平均电子丰度仅相差 $\Delta Y_e = 0.012$（0.348 对 0.336）。	Results
arXiv:2610.28728 2026-10-21	**Exploring the origin of slow-rotating pulsars: Emission from STARS simulated white dwarfs** *Exploring the origin of slow-rotating pulsars: Emission from STARS simulated white dwarfs* Zenia Zuraiq, Banibrata Mukhopadhyay	基于一维恒星演化程序 \texttt{STARS} 模拟的白矮星模型，其表面磁场由 $B_s = \sqrt{\frac{3c^3}{8\pi^2}\frac{I}{R^6 \sin^2\alpha} P\dot{P}}$ 约束。与中子星解普遍处于超临界磁场（$B_s > B_c = 4.41 \times 10^{13}\,{\rm G}$）不同，WD解释下的表面偶极场处于 $B_s \sim 10^8 - 10^{11}\,{\rm G}$，落在已知强磁场白矮星范围内；对于慢脉冲星 PSR J0901-4046，超钱德拉塞卡 WD 解（$M \approx 1.62 - 2.05\,M_\odot$，$R \approx 7068 - 4317\,{\rm km}$）要求较小磁倾角 $\alpha \approx 2^\circ - 17^\circ$ 及 $B_s \sim 1.02 \times 10^9 - 2.68 \times 10^{10}\,{\rm G}$。	texttttSTARS
arXiv:2610.28633 2026-10-20	**Constraints on Millimeter-wave Extragalactic Transient Populations from 4 Years of SPT-3G data** *Constraints on Millimeter-wave Extragalactic Transient Populations from 4 Years of SPT-3G data* S. Guns, C. Tandoi, D. Anbajagane 等	在 ${\rm TS} > 48$ 处未检出河外短时标瞬变源（信号数 $N = 0$）。在 90% 置信度下，对于典型标准爆（$E_{\rm K} = 10^{51}\,{\rm erg}, \Gamma = 100$），限制产生明亮 RS 的比例为 $f_{\rm RS} < 0.57$、全天事件率 $N_{\rm all-sky} < 1226\,{\rm bursts/yr}$；对于低洛伦兹因子高能爆（$E_{\rm K} = 10^{52}\,{\rm erg}, \Gamma = 50$），限制 $f_{\rm RS} < 0.09$、$N_{\rm all-sky} < 120\,{\rm bursts/yr}$；当固定 $f_{\rm RS} = 0.3$ 时，限制 150 GHz 峰值比光度 $L_\nu^{\rm mm} \leq 1.2 \times 10^{33}\,{\rm erg\,s^{-1}\,Hz^{-1}}$。若将低 TS 处的微弱过量归结为 GRB RS 幂律通量分布 $N(>S_\nu) \propto S_\nu^\gamma$，则要求 $\gamma < -20$，证实该过量并非真实河外瞬变源。	GRB Model Constraints
arXiv:2610.28609 2026-10-20	**Dynamical stability of Magnetic Supramassive Neutron Stars** *Dynamical stability of Magnetic Supramassive Neutron Stars* Jorge L. Rodríguez-Monteverde, Sebastiano Bernuzzi, William Cook 等	研究给出了强磁场超大质量中子星动力学稳定性的关键标度与物理机制： 1. 演化机制受 Lehnert 数 ${\rm Le} \equiv P/\tau_A$ 控制（其中 $\tau_A \sim 2R/\langle v_A \rangle$ 为阿尔芬时标，$v_A^2 = b^2/(b^2 + \rho h)$）。当 ${\rm Le} \gtrsim 1$（强磁场 $B_{\rm max} \sim 10^{17}\,{\rm G}$）时，Tayler/kink 不稳定性（$m = 1$ 模）快速发展并抑制纯磁卷绕，使得环向磁场能量饱和在总磁能的 25%–45%（弱磁场 ${\rm Le} < 1$ 构型则增长至 60%–80%）； 2. 麦克斯韦应力 $T^r_\phi \sim b^r b^\phi$ 高效向外输运角动量，使星体内核（$\varrho \lesssim 1\,{\rm km}$）自转角速度降低 40%–50%。处于边缘稳定支（$\partial M/\partial \rho_c \lesssim 0$）的模型因丧失核心离心支撑而触发引力坍缩形成黑洞，残余黑洞视界角速度高达 $\Omega_H > 17\,{\rm kHz}$，外流风带走近 8% 的总角动量； 3. 稳定支构型重组为具有混合磁场和差动自转的准稳态，并驱动外流磁化度 $\sigma \lesssim 0.2$、累积质量达 $\sim 10^{-3}\,M_\odot$ 的重子主导赤道风。	Conclusion
arXiv:2610.28428 2026-10-20	**Identifying a jet-shaped point-symmetric morphology in the supernova remnant HB9** *Identifying a jet-shaped point-symmetric morphology in the supernova remnant HB9* Noam Soker	通过对超新星遗迹 HB9（G160.9+2.6）射电与多波段图像的几何对称性分析，识别出由 4 条特征对称轴（L1–L4）构成的微弱但稳固的点对称形貌，包括一对西北/东南喷嘴（nozzles，L1 轴）、一对凹陷与亮条（dents & bright bars，L2 与 L4 轴）以及一对微小耳状结构（ears，L3 轴）。作者提出该点对称特征至少由参与超新星爆炸过程的两对或更多对抖动喷流所塑造；向南延伸的伽马射线亮斑和 $^{12}{\rm CO}(J = 1 - 0)$ 分子云增厚区与喷流打穿主遗迹外壳形成的喷孔方向（L1–L3）对齐；同时借助 SNR S147 视向速度分布（$V_{\rm LSR} < -20\ {\rm km\ s^{-1}}$ 与 $V_{\rm LSR} > 20\ {\rm km\ s^{-1}}$ 在东耳呈南北空间分离）论证点对称耳状结构源于喷流驱动而非星周介质（CSM）空腔相互作用。	Identifying a point-symmetric morphology in HB9
arXiv:2610.28408 2026-10-20	**Hybrid Stars with Different Amount of Quark Matter** *Hybrid Stars with Different Amount of Quark Matter* Milena Albino, Tuhin Malik, Márcio Ferreira 等	通过放宽最大质量星中夸克核大小先验（仅要求 $P_{\rm max} - P_{\rm trans} > 5\,{\rm MeV\,fm^{-3}}$），推断得到的相变密度移向更高密度区间 $\rho_{\rm trans} \in [0.484, 0.741]\,{\rm fm^{-3}}$，相变临界质量阈值提升至 $M_{\rm trans} \geq 2.012\,M_\odot$。混合星强子相 EoS 整体偏软，得到更小的半径 $R_{1.4} = 12.964^{+0.334}_{-0.239}\,{\rm km}$ 与最大质量 $M_{\rm max} = 2.168^{+0.114}_{-0.121}\,M_\odot$，能更好地吻合 NICER 与引力波潮汐形变观测约束。	Results

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.28182 2026-10-20	**Hidden engines in tidal disruption events: multimessenger signatures in a lepto-hadronic framework** *Hidden engines in tidal disruption events: multimessenger signatures in a lepto-hadronic framework* D. Kantzas, D. A. Langis, I. Liodakis 等	通过对 AT2019dsg、AT2019ehz 和 ASASSN–14li 的多信使建模发现：在致密靶光子场环境下，光介子产生反应 $p\gamma \to \pi^0/\pi^\pm$ 有效产生多 TeV 至 PeV 能段中微子（AT2019dsg 基准模型预期 IceCube 与 KM3NeT 事例数分别达 0.31 和 0.36），但伴生的高能光子因双光子吸收对产生（阈值满足 $E_\gamma \epsilon (1-\cos\theta) \geq 2 m_e^2 c^4$，对头碰撞阈值 $E_{\gamma,\rm thr} \simeq 260 (\epsilon/1\,\rm keV)^{-1}\,\rm MeV$）而在 GeV–TeV 波段被高度不透明环境强烈遮蔽并级联重分配至 MeV 波段；源的能谱形态主要由非热质子谱指数 p_p、注入下限 $\gamma_{p,\rm min}$ 以及靶光子场环境的不透明度所调控。	5.2 Comparison between the sources
arXiv:2610.28073 2026-10-20	**Pulsar J1909+0749 and Supernova Remnant G42.1-0.2: A case of a pulsar that has exited the shell of its associated supernova remnant** *Pulsar J1909+0749 and Supernova Remnant G42.1-0.2: A case of a pulsar that has exited the shell of its associated supernova remnant* R. Dokara, M. Kramer, A. Brunthaler 等	测得 SNR 壳层 G42.1-0.2 在 155 MHz 至 5.85 GHz 的能谱指数为 $\alpha = -0.36 \pm 0.08$，证实其非热同步辐射本质；脉冲星伴随彗星状脉冲星风云（PWN，$\alpha = -0.6 \pm 0.4$）及其延展尾迹（$\alpha = -0.8 \pm 0.5$），形态直接指向遗迹几何中心（$l = 42.097^\circ \pm 0.005^\circ$, $b = -0.229^\circ \pm 0.019^\circ$）。若两者同源爆发且脉冲星处于特征年龄 $\tau_c = P/(2\dot{P}) = 24.7\,\rm kyr$，在 NE2025 模型距离 $d = 9.7\,\rm kpc$ 下，角距离 $13.1'$ 对应投影物理间距 $37\,\rm pc$，推导出脉冲星横向投影速度高达 $v_\perp \sim 1460\,\rm km\,s^{-1}$，成为已知银河系横向速度最快的孤立脉冲星之一；遗迹在 Sedov-Taylor 阶段要求环境数密度 $n \sim 1.5\,\rm cm^{-3}$。	3.2 The shell: G42.1-0.2
arXiv:2610.28049 2026-10-20	**On the superbursts as photodisintegrators of ashes from the rp-process -- Numerical simulations of superbursts with MESA II** *On the superbursts as photodisintegrators of ashes from the rp-process -- Numerical simulations of superbursts with MESA II* M. Nava-Callejas, S. Goriely, N. Chamel	通过多区 MESA 模拟发现：(1) 当吸积物质包含真实的 rp-过程灰烬时，仅需 $X(^{12}\rm C) = 10\%$ 即可点火并驱动超级爆发，其峰值光度与总爆发能量（在中等吸积率下 $L_{\rm max} = 6.51 \times 10^{37}\,\rm erg\,s^{-1}$，$E_{\rm sb} = 2.04 \times 10^{42}\,\rm erg$）与传统 $20\%\,^{12}\rm C + 80\%\,^{56}Fe$ 的标准配比相当；而单纯 $10\%\,^{12}\rm C + 90\%\,^{56}Fe$ 的光度则显著偏低；(2) 所有模拟的点火柱深均为 $y_{\rm ignition} \approx 10^{11}\,\rm g\,cm^{-2}$，比经典双参数拟合值低约一个量级；(3) 超级爆发灰烬除了 ^{28}Si 和 ^{56}Fe 主峰外，重核光致蜕变促成了在 ^{88}Sr 处的第三个丰度峰；(4) 光致蜕变释放的中子、质子与 α 粒子在爆发中后期通过捕获反应（如 $^{64}\rm Ni(p,\gamma)^{65}Cu$ 和 $^{20}\rm Ne(\alpha,\gamma)^{24}Mg$）净释放能量；碳点火的保守质量分数下限确定为 $X(^{12}\rm C) > 7\%$。	4 Discussion
arXiv:2610.28034 2026-10-20	**Rapid Variability of Radiative Signatures from Driven Relativistic Reconnection** *Rapid Variability of Radiative Signatures from Driven Relativistic Reconnection* Clarissa Mora, Fabio Bacchini, Camille Granier 等	数值模拟揭示以驱动速度 $v_{\rm push} \approx 0.1c$ 为临界分界：当 $v_{\rm push} \leq 0.1c$ 时，重联率为单峰且光变呈现光滑自相似逻辑斯谛增长，上升时标 $\tau_{\rm rise} \approx 3\,R/c$；当 $v_{\rm push} \geq 0.2c$ 时，磁通快速堆积导致两阶段阶梯跃升（压缩相 $\tau_{\rm rise} \sim 1\,R/c$，并合相 $\sim 2\,R/c$），总时标被约束在 $\tau_{\rm rise} \sim (1-3)\,R/c$。合并后非热粒子谱指数趋于 $p \in [1.8, 2.4]$，对应的同步辐射谱指数满足 $s = (3-p)/2$，非热截断能量饱和至 $\gamma_{\rm cut} \sim 100\,\sigma_{\rm in}$。	III Results
arXiv:2610.28023 2026-10-20	**Direct Urca process facilitated by non-Fermi-liquid quantum criticality** *Direct Urca process facilitated by non-Fermi-liquid quantum criticality* Hao-Fu Zhu, Guo-Zhu Liu	研究发现核子在量子临界点附近与序参量量子涨落强耦合导致准粒子残余度 $Z \to 0$，化学势产生对数温度依赖 $\mu_i^{\rm NFL}(T) \approx \frac{h_i^2 k_{\rm Fi}}{2a_i \pi^2} \ln(T_0/T)$。该对数修正打破了常规费米液体理论下的运动学相空间限制，触发直接 Urca 过程的临界条件修正为 $k_{\rm Fn}/k_{\rm Fp} = [h_p^2 - 8\pi^2 c \ln(T_0/T)]/(\frac{5}{2}h_n^2) < 2$。降温反而因 $\ln(T_0/T)$ 放大而提高有效质子份额 Y_p，使低质量中子星更易开启中微子直接 Urca 反应，其重整化中微子发射率为 $Q_\nu^{\rm D}/Q_{\nu 0}^{\rm D} = [1 + \frac{5h_n^2 M_n^*}{16\pi^2 k_{\rm Fn}} \ln(T_0/T)][1 + \frac{h_p^2 M_p^*}{8\pi^2 k_{\rm Fp}} \ln(T_0/T)]\Theta(k_{\rm Fe} + k_{\rm Fp} - k_{\rm Fn})$，其中标度基准 $Q_{\nu 0}^{\rm D} = 4.24 \times 10^{27} (k_{\rm Fe}/1.68\,\rm fm^{-1})(M_n^* M_p^*/M_n^2) T_9^6\,\rm erg\,cm^{-3}\,s^{-1}$。	Direct Urca process facilitated by non-Fermi-liquid quantum criticality
arXiv:2610.27931 2026-10-20	**The environments of type Ibn supernovae: evidence for a strong Wolf-Rayet star component** *The environments of type Ibn supernovae: evidence for a strong Wolf-Rayet star component* Timo Kravtsov, Hanindyo Kuncarayakti, Joseph P. Anderson	Ibn 型超新星与宿主星系明亮的 Hα 发射区强关联，通常位于最亮的 H II 区中。其 Hα 的归一化累积排名（NCR）累积分布函数（CDF）与大质量发光蓝变星（LBV）及沃尔夫-拉叶（WR）星高度一致，且对恒星形成环境的偏好显著强于常规 II 型和 Ic 型核塌缩超新星（CCSNe），证实极端大质量恒星演化阶段（如 WR 星）在形成该类超新星及 He-rich CSM 过程中占据重要地位。17 个位置测得的 [N II]λ6584/Hα（N2 指数）金属丰度与 II 型超新星相当，未表现出明显的极高或极低金属丰度偏好。	Results

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.27925 2026-10-20	**A bright X-ray flaring event from the intermediate supergiant fast X-ray transient IGR J00370+6122 observed with NuSTAR** *A bright X-ray flaring event from the intermediate supergiant fast X-ray transient IGR J00370+6122 observed with NuSTAR* L. Ducci, M. M. Serim, P. Romano 等	利用约 21 年 Swift/BAT 数据将轨道周期精确更新为 $P_{\rm orb} = 15.6654 \pm 0.0008\,{\rm d}$；NuSTAR 探测到光度跨越 $L_{\rm X} \sim 10^{34} - 1.8 \times 10^{36}\,{\rm erg\,s^{-1}}$ 的明亮耀发，在 3–70 keV 波段利用 Z^2 检验未探测到稳定的中子星自转脉动（证伪了早期报道的 $\sim 346\,{\rm s}$ 与 $\sim 674\,{\rm s}$ 周期信号）；能谱呈现双康普顿化特征，硬态等效电子温度与光学厚度分别为 $kT_{\rm e,1} \approx 3.0\,{\rm keV}$（$\tau_1 \approx 11.8$）和 $kT_{\rm e,2} \approx 44\,{\rm keV}$（$\tau_2 \approx 5.5$），吸收柱密度高达 $N_{\rm H} \approx 4.9 \times 10^{22}\,{\rm cm^{-2}}$。	Results
arXiv:2610.27807 2026-10-20	**What Shapes the Ultraviolet Spectra of Type Ia Supernovae?** *What Shapes the Ultraviolet Spectra of Type Ia Supernovae?* Snehasish Bhattacharjee, Yen-Chen Pan, Anirban Dutta 等	观测发现紫外通量比对衰减率 $\Delta m_{15}(B)$ 呈现波长依赖的相反关联：中紫外比值 $f_{2535} = F(2450\text{–}2620\,\text{Å})/F(4000\text{–}4500\,\text{Å})$ 与 $\Delta m_{15}(B)$ 呈正相关（极大前与近峰期斜率大于零的置信度达 98% 与 97%）；而近紫外比值 $f_{3025} = F(2900\text{–}3150\,\text{Å})/F(4000\text{–}4500\,\text{Å})$ 与 $\Delta m_{15}(B)$ 呈负相关（$> 98\%$ 斜率小于零）。TARDIS 模型证实增加放射性 ^{56}Ni 会加剧铁族元素不透明度从而抑制 $\lambda < 3000$ Å 通量，但逆荧光重分配效应在 ~ 3000 Å 处提升了通量。	Discussions
arXiv:2610.27775 2026-10-20	**An improved self-gravity treatment in general relativistic smoothed particle hydrodynamics** *An improved self-gravity treatment in general relativistic smoothed particle hydrodynamics* Pritam Banerjee, Kowsona Chakraborty, Niles Mondal 等	提出了领头阶自引力加速度公式 $f_i^{\rm sg} \simeq \frac{m}{c^2}\frac{a}{1}a_i^{\rm sg}$。数值验证显示多方球自引力装配误差在不同洛伦兹因子 Γ 下均低于 1%，且在演化 $50\,t_{\rm dyn}$ 内维持轴比 $R_\parallel/R_\perp = 1/\Gamma$。在 $M_{\rm BH} \geq 10^7\,M_\odot$ 的 TDE 模拟中，牛顿自引力因在近心点高估自引力（高估比例 $\sim 2r_g/(r_p - 2r_g) \propto \beta M_{\rm BH}^{2/3}$）而在 $\beta = 0.8$ 下虚假保留了 $0.4 \sim 0.75\,M_\odot$ 的束缚核心，而改进算法表明恒星接近完全瓦解，显著修正了碎片能谱分布 ${\rm d}M/{\rm d}\epsilon$ 及回落率 $\dot{M}(t)$ 的峰值与时延。	Comparative Study of Self-Gravity treatment in TDE simulations
arXiv:2610.27708 2026-10-20	**Short-timescale X-ray variability of the blazar 1ES 1959+650 observed with AstroSat/SXT** *Short-timescale X-ray variability of the blazar 1ES 1959+650 observed with AstroSat/SXT* Sikandar Akbar, Zahir Shah	在 0.6–7 keV 范围内，各子能段分数时变振幅介于 3.7% 至 6.5% 之间，并随能量升高满足标度律 $F_{\rm var} \propto E^{0.32\pm0.07}$。在计入轨道间隙窗口函数后，总能段功率谱密度符合斜率为 -1.80（95% 置信区间为 -2.8 至 -1.4）的红噪声幂律。软能段（0.6–1.4 keV）与硬能段（1.9–7 keV）的离散互相关峰值时延为 $-1^{+6}_{-10}\,{\rm ks}$，质心时延为 $-1.0^{+6.5}_{-10}\,{\rm ks}$，与零时延一致，能段间时延被严格限制在约 6–10 ks 以内。周期性分析未探测到显著 QPO（全频域 $p > 0.57$），并在 3 至 50 ks 周期范围内排除了方差占比超过 13%–51% 的正弦周期信号（90% 探测限对应 rms 振幅 1.9%–3.7%）。光变曲线在 MJD 60192.9 附近呈现一处准对称凸起，上升与衰减时标分别为 $\tau_r = 0.57 \pm 0.14\,{\rm d}$ 和 $\tau_d = 0.41 \pm 0.16\,{\rm d}$。	Results
arXiv:2610.27328 2026-10-20	**Core-Collapse Supernova Rates in the Dark Energy Survey** *Core-Collapse Supernova Rates in the Dark Energy Survey* K. Boyne, O. Graur, M. Vincenzi 等	测得 CC SN 体积发生率满足幂律演化 $R_{\rm CC}(z) = R_0(1+z)^\alpha$，其中 $R_0 = (1.58 \pm 0.17) \times 10^{-4}\,{\rm yr^{-1}\,Mpc^{-3}}$，$\alpha = 2.85 \pm 0.25$。经验产额为 $k_{\rm CC(MC)} = 0.0114 \pm 0.0009\,M_\odot^{-1}$，与 Baldry & Glazebrook (2003) IMF 产额（$k_{\rm BG03} = 0.0116\,M_\odot^{-1}$）高度吻合，但比标准 Salpeter IMF 预测高约 70%。剥离包层超新星占比线性拟合为 $f_{\rm SE}(z) = mz + c$，截距 $c = 0.31 \pm 0.05$（局域占比 $31 \pm 5\%$），斜率 $m = -0.01 \pm 0.09$，在 $0 < z < 1.3$ 范围内无显著演化，强烈支持双星剥离通道。	Discussion
arXiv:2610.27287 2026-10-20	**The presence and order of QCD phase transitions from gravitational-wave observations of neutron star mergers** *The presence and order of QCD phase transitions from gravitational-wave observations of neutron star mergers* Paul D. Lasky, Alexander Clevinger, Andre G. da Silva 等	对于 Cosmic Explorer 单个强事件（${\rm SNR} = 418$），一阶相变模型后验概率可达 $p(m = 1|d) = 0.74$，贝叶斯因子 $\mathcal{B}_{1/{\rm none}} = 12.8$；在 ${\rm A}^+$ 与 ${\rm A}^\sharp$ 网络中，若真实物态存在低转变密度的一阶相变，累积约 14 次中子星并合事件即可达到 $p(m = 1) > 0.9$，并可测量密度跳跃比 n_q/n_h；但二阶、三阶与无相变模型易相互混淆，较难仅凭旋进阶段潮汐形变明确区分。	Phase transitions in neutron stars
arXiv:2610.27186 2026-10-20	**Evolution of Massive Main-Sequence Stars in Binary Population Synthesis. II. Consequences for Black Hole High-Mass X-ray Binaries and Binary Black Holes** *Evolution of Massive Main-Sequence Stars in Binary Population Synthesis. II. Consequences for Black Hole High-Mass X-ray Binaries and Binary Black Holes* Adam Brček, Ryosuke Hirai, Ilya Mandel 等	采用自洽追踪对流核的 \texttt{BRCEK} 框架后，主序剥离星保留了更大氦核，成功形成传统 \texttt{HURLEY} 处方无法复现的 BH-HMXB；对于双黑洞并合，稳定物质转移（SMT）占 BBH 系统的 60%–80%（其中 Case A 占近半数），局部 BBH 并合率由传统模型的 $\mathcal{R}_{\rm HURLEY} = (10 \pm 1)\,{\rm Gpc^{-3}\,yr^{-1}}$ 提升至 $\mathcal{R}_{\rm BRCEK} = (33 \pm 2)\,{\rm Gpc^{-3}\,yr^{-1}}$（与 GWTC-5.0 报告的 $27.5\text{–}49.4\,{\rm Gpc^{-3}\,yr^{-1}}$ 一致）；在 BBH 质量比分布上，Case A 物质转移显著抑制了剥离星的过度膨胀，使得探测到的 BBH 质量比峰值从原有的 $q \approx 0.7$ 显著移向近等质量比 $q \approx 1$。	Results: Binary black holes

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.27183 2026-10-20	**The Imprint of Core-collapse Asymmetries on Supernova Shock Breakout** *The Imprint of Core-collapse Asymmetries on Supernova Shock Breakout* David K. Khatami, David Vartanyan, Hai P. Le 等	当激波特征光深度降至 $\tau_{\rm sh}\sim c/v_{\rm sh}$ 时发生激波破越。核心坍缩的单极羽流使得激波在 $\theta_{\rm obs}=0^\circ$ 方向首先局部破越，破越环面随后经包络时标 $t_{\rm wrap}\sim 2.5$ 天 完全包络整颗恒星。破越辐射时标由该几何包络时标主导而被显著展宽至近 2 天，首发破越视线方向峰值光度因局部破越而较一维模型降低约 3 倍，极紫外（EUV）波段展现出强烈的视线角弥散（约 2 mag）。	Shock Breakout Evolution
arXiv:2610.27158 2026-10-20	**Numerical shock broadening and supernova neutrino conversion: implications for DUNE** *Numerical shock broadening and supernova neutrino conversion: implications for DUNE* Rafael C. R. de Lima, Pedro Martins Bailer	原始三维模拟网格将物理上极薄的激波虚假增宽至约 $1.63\sim1.67$ 个网格（$235\sim312\,\mathrm{km}$），达到振荡长度的 $3.5\sim4.7\,L_{\rm osc}$，人为诱发绝热演化；经波前锐化重构后，跃迁几率 P_H 绝对值显著提升 $0.44\sim0.76$（中位数 0.56），且与突变极限公式 $P_H=\sin^2(\theta_m^- - \theta_m^+)$ 吻合极佳（相关系数 0.9987）。该效应使 DUNE 探测器在 $10\,\mathrm{kpc}$ 处的 ν_e 荷电流事件计数修正约 -4.4%，泊松区分度为 $S=1.6$（在 $2\,\mathrm{kpc}$ 处增至 13）。附录揭示湍流诱导味转换泄漏量在弱扰动区服从二次标度律 $R\propto\sigma^{2.02\pm0.03}$，单模响应按波长 $\lambda^{1.4\pm0.1}$ 衰减。	Conclusions
arXiv:2610.27121 2026-10-20	**Twenty-five years of XMM-Newton EPIC-MOS2 Unfocused Particle Background: Solar Cycle Modulation, Galactic Cosmic-Ray Correlation, and Implications for NewAthena** *Twenty-five years of XMM-Newton EPIC-MOS2 Unfocused Particle Background: Solar Cycle Modulation, Galactic Cosmic-Ray Correlation, and Implications for NewAthena* B. Vaia, F. Gastaldello, S. Molendi 等	MOS2 视场外（outFOV）粒子计数率主要由能量 $E\gtrsim100\,\mathrm{MeV}$（主要是 0.4–$1.2\,\mathrm{GeV}$）的高能银河宇宙线（GCR）质子诱发，在长时标上受 11.28 年太阳活动周及 $\sim22\,\mathrm{yr}$ Hale 周期调制（在磁极性 $A>0$ 呈平顶而在 $A<0$ 呈尖峰轮廓）。MOS2 outFOV 计数率与 AMS-02 质子通量在 27 天并合尺度下表现出极强的贝叶斯线性相关 $Y=\alpha+\beta X+\epsilon$，相对本征弥散仅为 $1.1\%\pm0.1\%$（RMSD 上限为 1.34%）；与 Chandra ACIS 剔除率的相对本征弥散为 $2.25\%\pm0.04\%$，且二者在日时标上无显著时延（峰值相关系数 $r=0.95$）。在太阳极大期探测到显著的 $\sim27\,\mathrm{day}$ 准周期调制，线性拟合截距揭示存在约为 $(0.68$–$1.2)\times10^{-3}\,\mathrm{cts\,s^{-1}\,cm^{-2}\,keV^{-1}}$ 的恒定非粒子组分，可能源自宇宙 X 射线背景（CXB）在探测器周围结构中的康普顿散射。	Results
arXiv:2610.27081 2026-10-20	**Localizing binary neutron stars with the Einstein Telescope: a full Bayesian comparison of the triangular and 2L configurations** *Localizing binary neutron stars with the Einstein Telescope: a full Bayesian comparison of the triangular and 2L configurations* Filippo Santoliquido, Jacopo Tissino, Marica Branchesi 等	对于占主体的中低信噪比事件（$\mathrm{SNR}<100$），Δ 构型由于天线响应简并，天区后验会裂解为 8 个离散模式，其 90% 可信天区面积 $\Delta\Omega_{90\%}$ 可达 $\sim2\times10^4\,\mathrm{deg^2}$，真实位置仅占 $\sim10\%$ 概率；而 2L 构型能有效打破简并，天区聚焦于包含 $\geq50\%$ 概率的单一主导模式，$\Delta\Omega_{90\%}$ 缩小 1 到 2 个数量级（例如降至 $80\sim470\,\mathrm{deg^2}$）。仅在极高信噪比（$\mathrm{SNR}\sim500$）或近距源（$D_L\sim40\,\mathrm{Mpc}$）下，Δ 构型方可依靠分辨基线间亚毫秒到达时延 Δt 消除多峰简并。	Results
arXiv:2610.27075 2026-10-20	**Optical and Ultraviolet Emission from the Gas Photoionized by Gaia BH3: Archival Constraints and Predictions for the 2029 Periastron** *Optical and Ultraviolet Emission from the Gas Photoionized by Gaia BH3: Archival Constraints and Predictions for the 2029 Periastron* Nico Cappelluti, Fabio Pacucci	研究给出 Chandra X 射线远星点上限限制氢电离光子产生率 $Q(\mathrm{H})<1.8\times10^{40}\,\mathrm{s^{-1}}$（对应 ADAF 吸积率 $f_{\rm Edd}<7.6\times10^{-7}$）。在低于 Chandra 限制时，近星点经非平衡平流修正后的最高 $\mathrm{H}\alpha$ 等效宽度仅为 $\mathrm{EW(H}\alpha)=3.4\times10^{-3}$ Å。慢星风模型下，Chandra 限制要求辐射吸积效率从 $\epsilon\lesssim0.2$（当 $\dot M_{\rm w}=10^{-11}\,M_\odot\,\mathrm{yr^{-1}}$）降至 $\epsilon\lesssim2\times10^{-4}$（当 $\dot M_{\rm w}=10^{-8}\,M_\odot\,\mathrm{yr^{-1}}$）；档案光谱进一步独立排除了 $\dot M_{\rm w}\geq2\times10^{-9}\,M_\odot\,\mathrm{yr^{-1}}$ 且 $\epsilon\geq3\times10^{-3}$ 的参数区间。	Theoretical Model
arXiv:2610.27051 2026-10-20	**Graph Neural Networks for Astrophysics and Cosmology** *Graph Neural Networks for Astrophysics and Cosmology* Christian Kragh Jespersen	系统阐释了 GNN 在天体物理非欧几何数据结构中的建模优势：(1) 在大尺度结构与星系巡天中，利用包含节点与边特征的宇宙图无似然推断直接提取非高斯统计信息，对宇宙学参数 Ω_m 与 σ_8 的约束优于标准 N 点关联函数；(2) 单步消息传递机制的物理本质等价于可学习的广义相互作用力定律加单步积分器，其单步计算复杂度由边数、节点数和隐藏层维度主导：$N_{\rm total}\sim N_{\rm E}N_{\rm lat}N_{\rm hid}\sim N_{\rm V}\langle k\rangle N_{\rm lat}N_{\rm hid}$；(3) 针对中微子望远镜（IceCube 等）和宇宙线探测器的不规则阵列重建，引入光锥因果连边条件 $A_{ij}=1\,\mathrm{if}\,d_{ij}\leq c\cdot(t_j-t_i)$，在精度与运行速度上显著超越传统似然重建；(4) 指明了求和（sum）聚合相较于均值（mean）能更完备保留局部密度等物理量，并揭示了多体相互作用消息（如 MACE 架构扩展至 $\nu+1$ 阶 $\sum_{j_1<\cdots<j_\nu}\psi(\mathbf{x}_i,\mathbf{x}_{j_1},\ldots,\mathbf{x}_{j_\nu})$）对抑制过平滑（oversmoothing）与过挤压（over-squashing）的作用。	Applications in Astrophysics and Cosmology

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.25895 2026-10-19	**A high-Galactic-altitude scattering screen: scintillation from Globular Cluster pulsar M53A** *A high-Galactic-altitude scattering screen: scintillation from Globular Cluster pulsar M53A* Qiuyi He, Xun Shi, Dejiang Yin 等	通过对闪烁弧曲率 $\eta = \frac{c d_{\rm psr} s(1-s)}{2\nu_{\rm ref}^2 V_{\rm eff}^2}$ 进行年调制 MCMC 拟合：1D 各向异性散射模型得到脉冲星到屏的分数距离 $s = 0.31^{+0.19}_{-0.14}$、屏距 $d_{\rm scr} = 12.8^{+2.6}_{-3.5}\,\mathrm{kpc}$ 及垂直高度 $Z = 12.6^{+2.6}_{-3.5}\,\mathrm{kpc}$；2D 各向同性模型给出 $s = 0.37^{+0.19}_{-0.15}$、$d_{\rm scr} = 11.7^{+2.8}_{-3.5}\,\mathrm{kpc}$ 及 $Z = 11.5^{+2.7}_{-3.5}\,\mathrm{kpc}$。这是迄今推导出的最高银面散射屏，且位置与 eROSITA 北气泡激波壳边界吻合；在横向 $\sim 2\times10^{-3}\,\mathrm{AU}$ 尺度上探测到约 $10^3\,\mathrm{AU\,cm^{-3}}$ 的电子柱密度涨落（梯度 $\sim 5\times10^5\,\mathrm{cm^{-3}}$）。	III.2 Scattering screen distance
arXiv:2610.25674 2026-10-19	**Constraints on the Progenitor of SN 2023bee from its Nebular-Phase Spectra** *Constraints on the Progenitor of SN 2023bee from its Nebular-Phase Spectra* Sophie von Coelln, Qinan Wang, Matthew R. Siebert 等	在爆发后 $+359$ 天的星云相光谱中未探测到伴星剥离物质的窄 H/He 特征，给出 3σ 积分光度上限 $L_{\rm H\alpha} < 1.8\times10^{37}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$，推导出的伴星剥离质量上限为 $M_{\rm H}^{\rm stripped} \lesssim 5.0\times10^{-3}\,M_\odot$ 以及 $M_{\rm He}^{\rm stripped} \lesssim 1.2\times10^{-4}\,M_\odot$。基于禁线发射光度比模型 $\frac{L_{7378}}{L_{7155}} = 4.9\frac{n_{\rm Ni\,II}}{n_{\rm Fe\,II}}\exp\left(\frac{0.28\,\mathrm{eV}}{kT}\right)\frac{d_{\rm cNi\,II}}{d_{\rm cFe\,II}}$ 拟合铁族混合特征，测得离子数密度比为 $n_{\rm Ni\,II}/n_{\rm Fe\,II} = 0.026\pm0.020$，折合渐近稳定质量比 $M_{\rm Ni}/M_{\rm Fe} \lesssim 0.06$，与亚钱氏质量（sub-$M_{\rm Ch}$）双重爆轰模型高度相符。	Narrow H/He Features and non-degenerate companion
arXiv:2610.25514 2026-10-19	**Hyperonic Direct-Urca Neutrino Emission with Lattice-QCD-Informed Form Factors** *Hyperonic Direct-Urca Neutrino Emission with Lattice-QCD-Informed Form Factors* Andreas Konstantinou	核子直接Urca通道仅探测近零动量转移（$q_F^2 \approx 0$），而超子通道（如 $\Lambda \to p$ 和 $\Xi^- \to \Lambda$）因初末态矢量平均场势能差 ΔU，进入显著的正类时动量转移区（$q_F^2 \simeq 0.1$–$0.15\,\mathrm{GeV}^2$）。在强简并极限下，通道发射率满足标度 $Q_{12\ell} \simeq \frac{457\pi}{10080}G_F^2C_{12}^2T^6\Theta_{12\ell}\mathcal{A}_{12\ell}$；形状因子动量依赖使超子发射率相对静态SU(3)基准产生显著偏差（在 $n_B \simeq 3$–$4\,n_0$ 处达 $\sim 80\%$），整星积分红移中微子光度 $L_\nu^\infty/(T_9^\infty)^6$ 在大质量星（$M \simeq 1.9$–$2.0\,M_\odot$）中偏差可达约 60%。	Neutrino Emissivity
arXiv:2610.25427 2026-10-19	**Statistical Analysis of Neutron Star Cooling: Implications for the Nuclear Equation of State and Nucleon Pairing** *Statistical Analysis of Neutron Star Cooling: Implications for the Nuclear Equation of State and Nucleon Pairing* Afonso Ávila, Ricardo Z. Ferreira, Violetta Sagun	无核子超流配对的模型表现极差，仅考虑单态配对无法解释中龄偏冷源（如 IC 443、Vela、3C 58、PSR B2334+61 等，$t \sim 1$–$100\,\mathrm{kyr}$，$L_\gamma^\infty \sim 10^{31}$–$10^{33}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$）。在测试的 5 种强子 EoS 中，唯有包含中子三态配对（$^3P_2$）的 NL3$\omega\rho$ 状态方程（以及部分 IST EoS）能自洽解释全样本 24 颗中子星数据，APR4、DD2 和 FSU2R 模型在统计上被排斥。Cas A 最佳拟合倾向于大质量中子星（$M \gtrsim 1.94$–$1.97\,\mathrm{M_\odot}$）。	6 Conclusions and discussion
arXiv:2610.25214 2026-10-19	**Lorentz-Invariance Violation with neutrinos from gamma-ray bursts using IceCube High-Energy Starting Events 12-year dataset** *Lorentz-Invariance Violation with neutrinos from gamma-ray bursts using IceCube High-Energy Starting Events 12-year dataset* Mathieu Lamoureux, José Manuel Carmona, José Luis Cortés 等	对于一阶线性 LIV（$n=1$），数据相比纯背景假设显示出轻微偏好，观测检验统计量 $\mathcal{T}_{\rm obs} \simeq 0.7$，$p$ 值为 3.1%，对应单侧高斯显著性约 1.9σ。最佳拟合参数为 $(\hat{f}_{\rm sig}, \hat{\eta}) = (6.1\times10^{-3}, 21.0)$，对应 LIV 能标 $\Lambda_{\rm LIV} = M_{\rm P}/\eta = 5.8\times10^{17}\,\mathrm{GeV}$。该偏好完全由亚光速延迟分量驱动，因为超光速中微子在分析能量段（$\gtrsim 10\,\mathrm{TeV}$）因真空正负电子对产生及裂变衰变已被强烈压低；若忽略中微子衰变，显著性完全消失（$p = 100\%$）。对于二阶 LIV（$n=2$），未发现偏离背景的证据（$p = 100\%$）。	Statistical analysis
arXiv:2610.25117 2026-10-19	**MACE: Multigroup-Multiangle Integrated Thermal Compton Scattering Kernel** *MACE: Multigroup-Multiangle Integrated Thermal Compton Scattering Kernel* Itamar Giron, Menahem Krief, Elad Steinberg	给出了热康普顿散射核 $\mathcal{K}(\mathcal{E}\to\mathcal{E}',\xi;\tau)$ 及其全温度导数的多群多角度自适应嵌套 1D 求积框架；导出了显式五阶近似核 $\mathcal{K}_{G5}$，在 $k_{\rm B}T \lesssim 100\,\mathrm{keV}$ 条件下可将矩阵计算加速 3--10× 且单项最大相对误差 $< 5\%$；基准校验表明该确定性积分与高精度蒙特卡罗模拟完全一致。	Multigroup-Multiangle Quadrature of the Kernel
arXiv:2610.25097 2026-10-19	**Destinies of Plasmoids Formed from the Magnetic Reconnection Occurring within the Ergo Region of a Rotating Black Hole** *Destinies of Plasmoids Formed from the Magnetic Reconnection Occurring within the Ergo Region of a Rotating Black Hole* Ho-Yun YuChih, Ye Shen	通过测地线有效势与动能分析，证实利用磁重联（Comisso-Asenjo 过程）提取黑洞能量不仅要求产生内向负无穷远能量密度等离子体团 p^-，更取决于外向等离子体团 p^+ 能否克服引力势逃逸至无穷远。研究通过修正后的逃逸覆盖因子 $\tilde{\chi}$ 确立了成功提取能量的黑洞自旋刚性理论下限 $a = 0.8005$；当黑洞自旋 $a < 0.8005$ 时，无论背景等离子体磁化率 σ_0 多大，所有 p^+ 都会掉入黑洞，导致净能量提取彻底失败。	IV.2 Covering Factor for Escaping p^+

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.24660 2026-10-19	**Clumpy Outflows from Super-Eddington Accreting Black Holes. II. Conditions for Clump Formation** *Clumpy Outflows from Super-Eddington Accreting Black Holes. II. Conditions for Clump Formation* Haojie Hu, Yuta Asahina, Shogo Yoshioka 等	吸积盘表面的物理量空间涨落是诱发外流团块碎裂的决定性因素。团块呈现径向细长结构，特征横向宽度 $l_1 \sim 30\,R_{\rm g}$（对应极角展宽 $\Delta\theta \sim 0.02$–$0.04\,{\rm rad}$），径向延伸可达 $l_2 \sim 500\,R_{\rm g}$。团块形成的特征时标对比表明，辐射Rayleigh-Taylor（RT）不稳定性时标 $t_{\rm RT} \sim 10^4\,{\rm s}$ 显著短于外流动理学时标 $t_{\rm dyn} = R/v_{\rm out} \sim 3\times10^5\,{\rm s}$（其中 $R \sim 300\,R_{\rm g}, v_{\rm out} \sim 0.05\,c$），而Kelvin-Helmholtz（KH）不稳定性时标 $t_{\rm KH} \sim 3\times10^5\,{\rm s}$ 与动力学时标相当，证实辐射驱动的RT不稳定性是团块形成的主导机制。	IV.1 Signatures for Instabilities
arXiv:2610.24276 2026-10-19	**Mass-loss Rates of 74 Bow Shock OB Stars: No Evidence for Bi-stability Behavior** *Mass-loss Rates of 74 Bow Shock OB Stars: No Evidence for Bi-stability Behavior* Nikhil Patten, Henry A. Kobulnicky	通过弓激波平衡测定了 74 颗早型星的质量损失率，范围跨越 $\log(L_*/L_\odot) \approx 4.5$ 处的 $2\times10^{-9}\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$ 至 $\log(L_*/L_\odot) \approx 6.3$ 处的 $4\times10^{-6}\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$。修正介质流动速度下限 $V_a = 20\,{\rm km\,s^{-1}}$ 后，$\dot{M}$ 与 L_* 表现出极强相关性，与 Björklund (B23) 模型吻合极好（中位偏差仅 $+0.01\,{\rm dex}$），但系统性低于 Vink 等人（V01）公式约 $0.83\,{\rm dex}$；在 $T_{\rm eff} \approx 22.5$–$27.5\,{\rm kK}$ 区间未发现双稳态跃迁引起的 $\dot{M}$ 突增，证实先前的高值系因仪器像元尺度误用及背景扣除不足所致。	Discussion & Conclusions
arXiv:2610.23852 2026-10-18	**Flashing with colours: Photometric indicators of an early interaction in type II supernovae** *Flashing with colours: Photometric indicators of an early interaction in type II supernovae* A. Mendez-Llorca, G. Folatelli, C. P. Gutierrez 等	1. 强闪光电离特征样本（Class 1+2）在所有光学波段均显著更亮且更蓝，其峰值绝对星等 $M_{\rm peak} \lesssim -17.5\,{\rm mag}$（如 g 波段加权均值为 $-18.31\pm0.33\,{\rm mag}$），与无闪光样本差异显著（$p^{\rm KS} < 10^{-4}$, $p^{\rm AD} < 0.01$）。 2. 早期颜色曲线（5–30天）双折线拟合表明，Class 1+2 样本早期变红速率 cs_0 更快，转折后速率 cs_1 减缓，其斜率差 $\Delta cs = cs_0 - cs_1 > 0$ 与绝对峰值星等 $M_{\rm peak}$ 构成的参数空间能清晰分离强相互作用与无相互作用事件。 3. 在 $(g-r)$ 颜色演化中，闪光电离光谱特征持续时间 $t_{\rm IIn}$ 被严格限制在颜色极小值时间 $t_{\rm min}$ 与转折时间 $t_{\rm break}$ 之间： $$t_{\rm min} \le t_{\rm IIn} < t_{\rm break}$$ \n且 $t_{\rm IIn}$ 与 $t_{\rm min}$ 呈强正相关（Pearson $r = 0.86$, $p = 7\times10^{-4}$）。\n4. 仅具备宽 ledge 特征（宽 He II $\lambda4686$）的事件与 non-flash 事件行为类似，对应较低密度星周风（$\dot{M} \sim 10^{-6}\,M_\odot\,{\rm yr}^{-1}$），并非高密度致密 CSM 的可靠指示源。	6.4. Break time, colour minimum, and flash-feature duration
arXiv:2610.23738 2026-10-18	**A precessing AGN with S-shaped morphology discovered in MALS** *A precessing AGN with S-shaped morphology discovered in MALS* J. D. Wagenveld, N. Gupta	测定进动周期为 $P = 290\pm30\,{\rm Myr}$，动力学年龄 $\sim 30\,{\rm Myr}$ 与JP谱老化年龄（主体 $t_{\rm JP} \approx 30$–$35\,{\rm Myr}$）一致；进动拟合得出倾角 $i = 30^\circ\pm1^\circ$、进动半角 $\phi = 40^\circ\pm1^\circ$、南喷流速度 $\beta_{\rm JS} = 0.062\pm0.003$、北喷流速度 $\beta_{\rm JN} = 0.19\pm0.01$；相对论聚束表面亮度遵循 $S_{\rm obs} = S[(\sqrt{1-\beta^2})/(1-\beta_z)]^{k-\alpha}$；北端尖端JNT表现出更年轻的年龄 $t_{\rm JP} = 20.3\pm5.0\,{\rm Myr}$，反映等离子体经历减速激波与重定向。	3.3 Spectral modelling
arXiv:2610.23581 2026-10-18	**Andreev Beta Conversion and Bulk Viscosity in Superfluid Neutron-Star Matter** *Andreev Beta Conversion and Bulk Viscosity in Superfluid Neutron-Star Matter* Tingyu Zhang, Honoka Hoshino, Hiroyuki Tajima 等	在极低温 $T \ll \Delta_n$ 条件下，传统准粒子贝塔电导受到能隙指数压低，呈现 $\lambda_{\rm qp} \propto T^3 e^{-E_*/T}$；而 Andreev 贝塔转换通道不受热激发能隙限制，其电导表现为无指数压低的幂律温标关系： $$\lambda_A \simeq \frac{|g_F|^4 k_{Fp}^4}{9\pi^3 v_{Fp}^2 v_*}\frac{\Delta_n^2 T^2}{|\xi_*|^3} \propto \frac{\Delta_n^2 T^8}{|\xi_*|^3}$$ 在 $T \sim 0.1\,{\rm MeV}$ 区间超越准粒子通道并主导贝塔弛豫。扰动频率为 ω 的动力学体粘滞系数实部为 ${\rm Re}\,\zeta(\omega) = \frac{C^2\lambda}{\omega^2+(B\lambda)^2}$（其中 $\lambda = \lambda_{\rm qp} + \lambda_A$），导致低温体粘滞系数呈现 ${\rm Re}\,\zeta \propto T^8$ 幂律衰减；对应的平衡态中微子发射率标度为 $\mathcal{E}_{A,0} \sim T^2\lambda_A \propto G_F^4 T^{10}$。	Andreev Beta Conversion and Bulk Viscosity in Superfluid Neutron-Star Matter
arXiv:2610.23425 2026-10-18	**ExHaLe-jet: Modeling blazar jets with an extended hadro-leptonic radiation code** *ExHaLe-jet: Modeling blazar jets with an extended hadro-leptonic radiation code* M. Zacharias, A. Zech, A. Reimer 等	模拟表明单次粒子加速无法维持长程光子通量，必须依赖沿流的多次激波再加速：在标准参数（Std，$L_{\rm disk} = 0.1\,L_{\rm edd}$，基底磁场 $B = 200\,{\rm G}$）下，主辐射产生于整体加速区末端（洛伦兹因子增至 $\Gamma_{\rm max} = 30$），逆康普顿辐射主导高能 SED；当吸积率降低至 LowEdd（$L_{\rm disk} = 10^{-3}\,L_{\rm edd}$）时，外康普顿散射和 p-γ 相互作用被显著压制，高能中微子发射（$\nu^{\rm obs} \sim 10^{30}\,{\rm Hz}$）受到抑制，SED 转为同步辐射主导。	1 Introduction
arXiv:2610.23414 2026-10-18	**SN 2025wiu: A Type Ib Supernova with Post-Peak Optical Rebrightening** *SN 2025wiu: A Type Ib Supernova with Post-Peak Optical Rebrightening* Cheng-Han Lai, Ting-Wan Chen, Yu-Hao Zhang 等	SN 2025wiu 首个光学峰绝对星等达 $M_r \approx -18.2\,{\rm mag}$，在爆发后约 $+38\,{\rm d}$ 出现第二光学峰（$M_r \approx -17.8\,{\rm mag}$），但其重建的全波段热光度 $L_{\rm bol}$ 仅表现为单调下降中的斜率变缓（第一峰值 $L_{\rm bol} \approx 5.86\times10^{42}\,{\rm erg\,s^{-1}}$），晚期热光度衰减率为 $0.054\pm0.008\,{\rm mag\,day^{-1}}$。整个演化过程中光谱始终表现为纯净的 SN Ib 特征且无窄发射线。纯放射性衰变模型需合成镍质量 $M_{\rm Ni} = 0.47^{+0.06}_{-0.05}\,M_\odot$；而结合抛射物与星周介质相互作用的 TransFit-CSM 模型给出的最佳拟合参数为 $M_{\rm Ni} = 0.378^{+0.070}_{-0.089}\,M_\odot$、$M_{\rm ej} = 4.72^{+2.07}_{-1.59}\,M_\odot$、动能 $E_{\rm k} \approx 1.9\times10^{51}\,{\rm erg}$ 以及有效 CSM 质量 $M_{\rm CSM} \approx 0.10\,M_\odot$（外径延展至 $\approx 5.9\times10^5\,R_\odot$），物理图像倾向于被抛射物光球层吞没并完全热化的非球对称盘状 CSM 相互作用。	IV.2 Modeling the Later Luminosity Excess

arXiv ID / 日期	文献题名与作者	核心要点与观测约束	阅读切入
arXiv:2610.23395 2026-10-18	**Impact of neutron captures on the r-process: I. Propagation of statistical model uncertainties** *Impact of neutron captures on the r-process: I. Propagation of statistical model uncertainties* Yu An, Jan Kuske, Almudena Arcones	核能级密度（NLD）是统计模型不确定度的主要来源，对丰度的影响远大于 GSF（GSF 差异普遍小于 2 倍）。在第二峰下方（$A \lesssim 130$），NLD 引起的丰度差异可达约 1 个数量级，并在稀土与第三峰之间区域（$A \sim 172$–178 及 $A \sim 180$–194）造成显著丰度改变，而主峰结构（第三峰、铅峰）总体稳健。平均对数丰度差异定义为 $d_{i,j} = \frac{1}{A_{\max}} \sum_{A=1}^{A_{\max}} \lvert \log(X_i(A)) - \log(X_j(A)) \rvert$。	IV.1 Overview of statistical model impact on the r-process
arXiv:2610.23393 2026-10-18	**Exploring Cosmic Rays from Gravity-Limited Acceleration at Supermassive Black Holes** *Exploring Cosmic Rays from Gravity-Limited Acceleration at Supermassive Black Holes* Elena Manao, Elisa Resconi, Frank M. Rieger 等	推导了与黑洞质量无关的未屏蔽电场几何能量上限 $E_{\rm geom} \simeq 10^{27} Z a \,\mathrm{eV}$；在曲率辐射损耗限制下，最大加速能量为 $E_{\rm curv} = \left(\frac{3 a m^4 c^8 B R_c^2}{2Ze}\right)^{1/4} \propto M^{1/4}$。在低吸积率（$\dot{m} \lesssim 10^{-4}$）的宁静态黑洞核中，等分配磁场足以将质子加速至 3×10^{19} eV、铁核加速至 10^{20} eV；与 PAO $E \geq 32$ EeV 数据的互相关检验未显示出对 AGN 或宁静态星系核的统计偏好（$\log_{10}\Lambda = 0.25$ 与 0.33）。	Exploring Cosmic Rays from Gravity-Limited Acceleration at Supermassive Black Holes
arXiv:2610.23385 2026-10-18	**Prospects for Simultaneously Detecting Long and Short Duration Gravitational Waves from Pulsar Glitches with Current and Future Detectors** *Prospects for Simultaneously Detecting Long and Short Duration Gravitational Waves from Pulsar Glitches with Current and Future Detectors* M. Ball, D. Keitel	研究量化了 117 次已知脉冲星 glitch 样本的双通道探测灵敏度。tCW 振幅通常显著高出探测阈值，双重探测的主要限制来自短时标 burst 搜寻的天区依赖与高频响应。在固定能量分配假设（$F_{\rm CW} = Q = 0.017, F_{\rm fmode} = 0.8$）下，O5 网络能将中子星质量与半径约束分别提升超过 $0.25\,M_\odot$ 和近 $1\,\mathrm{km}$；而在包含 Cosmic Explorer (CE) 和 Einstein Telescope (ET) 的 3G 探测器网络中，该模型允许的 M–R 参数空间被完全排除（即若无探测将完全证伪该辐射参数模型）。引入总辐射份额 $F_{\rm tot}$ 后，即使突变辐射能仅占特征能量 $E_{\rm Glitch}$ 的 0.01%–0.1%，3G 时代的零探测结果仍可给出与 O4 相当或更严苛的物态方程限制。Vela 脉冲星展现出最高的双重探测概率，而 Crab 脉冲星因突变幅度小约 2 个数量级，在所有模拟中均未能实现双重探测。	VII Observational Prospects 与 VII.3 Improvement on Constraints in Future Observing Runs
arXiv:2610.23380 2026-10-18	**Three-dimensional spatial modelling of nuclear de-excitation lines** *Three-dimensional spatial modelling of nuclear de-excitation lines* Tomohiko Oka, Thomas Siegert, Tristan Bouchet 等	基准模型在常规大尺度银道脊区域（$\lvert l \rvert \leq 60^\circ, \lvert b \rvert \leq 10^\circ$）预测的 $^{12}\mathrm{C}^*$（$4.4\,\mathrm{MeV}$）、$^{16}\mathrm{O}^*$（$6.1\,\mathrm{MeV}$）和 $^{20}\mathrm{Ne}^*$（$1.6\,\mathrm{MeV}$）线强分别为 5.8×10^{-7}、2.6×10^{-7} 和 $2.7 \times 10^{-7}\,\mathrm{ph\,cm^{-2}\,s^{-1}\,sr^{-1}}$，退激发发射仅占轻子连续谱的 $\lesssim 1\%$；但加入符合高电离率观测的银心集中 LECR 组分后，在银心天区（$\lvert b \rvert, \lvert l \rvert \lesssim 2^\circ$）该比值可超过 100%。此外，$6.1\,\mathrm{MeV}/4.4\,\mathrm{MeV}$ 线强比对 LECR 注入截止能量 $E_{\max}$ 高度敏感，变化可达 $\sim 30\%$。若要解释观测电离率，额外 LECR 组分所需的注入功率高达 $1 \times 10^{43}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$（基准 LECR）或 $7 \times 10^{42}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$（银心集中），显著高于银河系超新星能提供的常规宇宙线总功率 $L_{\rm SNR} \sim 10^{41}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$。	3.1 Spectra from conventional large-scale regions