**ESTADO DO MARANHÃO**
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNÓSTICO DO DIAMANTE**
**DR. LUIZ ALFREDO NETO GUTERRES SOARES JUNIOR**

PACIENTE: **NOEMIA DA SILVA FONTENELE**
DATA DA REALIZAÇÃO: **16/04/2021**
DATA DE NASCIMENTO: **10/09/1959**

SUS: **701804238682772**

## TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL

**HISTÓRIA:**

**TÉCNICA:** Realizados cortes axiais com aquisição volumétrica de 3.0 mm de espessura em aparelho multidetectores, interessando os espaços discais. Foram também obtidas reconstruções sagitais e coronais.

**ACHADOS:**

1. Eixo dorsal preservado, apresentando cifose fisiológica na posição de estudo.
2. Alteração textural difusa óssea, podendo estar relacionada à redução da densidade mineral, correlacionar com dados clínicos.
3. Osteófitos marginais anterolaterais dos corpos vertebrais dorsais mais evidentes em D3 a D9.
4. Redução do espaços intervertebrais dorsais, notadamente em níveis médios.
5. Pedículos íntegros.
6. Lâminas, processos espinhosos e transversos sem alterações.
7. Forames intervertebrais livres.
8. Canal vertebral com diâmetro preservado.
9. Articulações interapofisárias de aspecto preservado.
10. Não se observa protrusões ou herniações discais significativas nos níveis avaliados.

Thalitta Vieira
*Dra. Thalitta Vieira Silva Ferreira*
*Radiolosgista*
*CRM: 7374*

CTR
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

**Nome:** NOEMIA DA SILVA FONTENELE, 62 A
**Médico:** SONIA MARIA TAVARES LIMA
**Convênio:** EMSERH
**Protocolo:** 756426 Data: 06/05/2022
**Senha:** 1021623

# RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSACRA

## TÉCNICA:

Foram obtidas imagens da coluna lombossacra em aparelho de RM, nas sequências pesadas em T1 e T2 nos planos sagital e axial.

## RESULTADO:

Corpos vertebrais lombares com alinhamento posterior mantido e altura preservada.

Osteófitos marginais incipientes em corpos vertebrais distais.

Pedículos e lâminas íntegros.

Articulações interapofisárias sem alterações expressivas.

Irregularidades , alteração na intensidade de sinal situados nos platôs vertebrais opostos de L5-S1, por processo degenerativo, associado à desidratação discal e protrusão discal difusa, que determina compressão na face ventral do saco dural e redução na amplitude dos forames neurais. Alterações degenerativas disco vertebrais.

Mínimas protrusões discais difusas de L3-L4 e L4-L5, sem determinar radiculopatia.

Demais espaços intersomáticos anatômicos.

Não há evidência de hérnia discal na região estudada.

Canal raquiano e forames de conjugação têm amplitudes conservadas.

Ligamentos amarelos de espessura e intensidade de sinal preservado.

CRM: 3462-MA / RQE: 2188

**Nome:** NOEMIA DA SILVA FONTENELE, 62 A
**Médico:** SONIA MARIA TAVARES LIMA
**Convênio:** EMSERH
**Protocolo:** 756426 Data: 06/05/2022
**Senha:** 1021623

Cone medular em topografia habitual com intensidade de sinal preservado.

Raízes da cauda equina com distribuição habitual.

Musculatura paravertebral sem alterações significativas.

**IMPRESSÃO : Laudo descritivo**

CRM: 3462-MA / RQE: 2188