ICS 67.060
X11
备案号：

DB22

吉　林　省　地　方　标　准

DB22/T 1129—2007

地理标志产品 梅河大米

Product of geographical indication—Meihe rice

2007-11-01 发布　　2007-11-06 实施

吉林省质量技术监督局 发布

前　言

本标准根据国家质量监督检验检疫总局《地理标志产品保护规定》和GB17924-1999《原产地域产品通用要求》而制定。

本标准附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由梅河口市人民政府　提出

本标准由吉林省地理标志产品保护办公室 归口

本标准由吉林省质量技术监督局 批准

本标准主要起草单位：吉林省通化市农业科学研究院 梅河口市质量技术监督局

本标准主要起草人：许哲鹤、杨银阁、陈超、李长山、姜海勇、张凯、郭赫宇、许永福

本标准2007年11月1日首次发布

地理标志产品 梅河大米

1 范围

本标准规定了地理标志产品梅河大米的保护地域范围、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的梅河大米。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志
GB 1354 大米
GB 2715 粮食卫生标准
GB 3095 环境空气质量标准
GB/T 5009.36 粮食卫生标准分析方法
GB 5084 农田灌溉水质标准
GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
GB/T 5492 粮食、油料检验 色泽、气味、口味鉴定法
GB/T 5494 粮食、油料检验 杂质、不完善粒检验法
GB/T 5496 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法
GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法
GB/T 5502 粮食、油料检验 米类加工精度检验法
GB/T 5503 粮食、油料检验 碎米检验法
GB/T 5511 粮食、油料检验 粗蛋白质测定法
GB/T 6543 瓦楞纸箱
GB 7718 预包装食品标签通则
GB/T 17891-1999 优质稻谷
NY 20 优质食用稻米
NY/T 83 米质测定方法
NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
国家质量监督检验检疫总局令（2005） 第75号 定量包装商品计量监督管理办法

3 保护地域范围

3.1 保护地域范围

梅河大米保护地域范围限于国家质检总局2006年第191号《公告》批准的范围，即梅河口市现辖行政区域。梅河大米保护地域范围图见附录A。

3.2 自然环境

3.2.1 日照

年平均日照时间为2 556h,水稻生长季节平均日照时数为1 159h。

3.2.2 气温

年平均气温5.4℃， 无霜期：137d～145d，大于等于10℃有效积温2 960℃。出穗至成熟期有效积温970℃ ～1050℃。

3.2.3 降水

年平均降水量708mm，5～9月份降水量550～600mm。

3.2.4 土壤

土壤类型为草甸型白浆土，间有草炭土和河淤土，pH值5.1～6.35，有机质含量2.28%～4.42%。日渗透量3.8mm～6.8mm。速效氮含量104mg/kg～304mg/kg,速效磷含量11mg/kg～48mg/kg，速效钾含量76mg/kg～186mg/kg。

3.2.5 水源

以南北两大灌渠为主，以境内河流、水库、塘坝为辅，水质符合GB5084的要求。

3.2.6 环境空气

稻作区环境空气符合GB3095 中二级规定。

4 术语和定义

GB 1354、GB/T 17891定义的加工精度、不完善粒、杂质、碎米、黄粒米、直链淀粉含量、胶稠度、垩白米率、垩白度、蛋白质含量及下列术语和定义适用于本标准。

4.1 梅河大米 **Meihe rice**

以产于本标准第3章规定的范围内的水稻，经精细加工而成，并且符合本标准要求的大米。

4.2 碱消值 **alkali spreading value**

精米在30℃，浓度1.4%氢氧化钾溶液中，浸泡23h后米粒的解析程度。

5 要求

5.1 栽培技术

采用旱育双稀栽培技术，参见附录B。

5.2 原料要求

应选用第 3 章规定的产区内，品种为秋田小町、吉粳 83 等食味特色不低于该品种的中晚熟常规优质粳稻为原料。

5.3 感官指标

感官指标应符合表 1 规定。

表1 感官指标

项　　目	指　　标
色　　泽	呈蜡白色，米粒半透明、表面有光泽
气　味、口　味	蒸煮后，米饭有油光、饭香浓郁、入口柔软滑顺、粘而不粘口，适口性好、凉后仍能保持良好口感
食味品质/（分）　　≥	70

5.4 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表 2 理化指标

项　　目		指　　标
水分/(%)	≤	15.5
直链淀粉（干基）/(%)		15～20
胶稠度/（mm）	≥	70
垩白粒率/（%）	≤	15.0
垩白度/（%）	≤	2.0
碱消值/（级）		6～7
蛋白质含量/（%）		6.0～8.5

5.5 净含量偏差

单件产品净含量负偏差及受检批产品净含量平均偏差按国家质检总局《定量包装商品计量监督管理办法》规定执行。

5.6 加工质量指标

加工质量指标应符合表3规定。

表 3 加工质量指标

加工精度	黄粒米/（%）≤	不完善粒/（%）≤	杂质/（%）≤			碎　米/（%）≤	
			总量	糠粉	矿物质	总 量	小碎米
以标准样品为准，等于或高于国标特等米标准样品	0.1	1.0	0.1	0.08	不得检出	15	1.5

5.7 卫生指标

应符合GB 2715规定。

6 试验方法

6.1 抽样

按GB 5491规定执行。

6.2 感官检验

按GB/T 5492规定检验，透明度按NY20规定检验，食味品质按GB/T17891中附录B进行。

6.3 理化指标

6.3.1 水分

按GB/T 5497规定检验。

6.3.2 直链淀粉、胶稠度、垩白粒率、垩白度

分别按GB/T 17891中6.5、附录A、6.2、6.3规定检验。

6.3.3 碱消值

按NY/T 83中6.2规定检验。

6.3.4 蛋白质含量

按GB/T 5511规定检验。

6.3.5 净含量

按JJF 1070规定检验。

6.4 加工质量指标检验

6.4.1 加工精度

按GB/T5502规定检验。

6.4.2 黄粒米

按GB/T 5496规定检验

6.4.3 不完善粒、杂质

按GB/T 5494规定检验。

6.4.4 碎米

按 GB/T 5503 规定检验。

6.5 卫生指标检验

按GB/T 5009.36规定检验。

7 检验规则

7.1 出厂检验

7.1.1 厂质量检验部门应按本标准规定对出厂前的产品逐批进行检验，检验合格并签发合格证的产品，方可出厂。

7.1.2 出厂检验项目包括感官指标、水分、加工质量指标。

7.2 型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部要求。每年至少进行一次型式检验。有下列情况之一时，亦应进行型式检验。

a) 新产品投产时；
b) 原料、生产工艺设备有较大变化，可能影响产品质量时；
c) 停产半年以上，恢复生产时；
d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
e) 国家质量技术监督部门提出型式检验要求时。

7.3 判定规则

型式检验和出厂检验受检产品检验项目全部合格时，判定整批产品为合格品。卫生指标如有一项不符合本标准规定，即判定该批产品为不合格品；其他项目若有一项以上（含一项）不符合本标准规定时，应重新从该批产品中抽样复检，复检结果有一项不合格，则判整批产品为不合格。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

产品销售包装标签应符合GB 7718规定。产品运输包装图示标志应符合GB/T 191规定。

8.2 包装

8.2.1 内包装

内包装为符合国家食品卫生要求的塑料袋，也可采用符合食品卫生要求的其他包装材料，包装物应清洁、密封牢固。

8.2.2 外包装

外包装用瓦楞纸（或白板纸）箱，瓦楞纸箱应符合GB/T 6543规定，箱内附产品质量合格证。

8.2.3 单独使用塑料编织袋装时，塑料编织袋应符合食品卫生要求和其产品标准的规定。袋口缝制严密，无泄漏。产品质量合格证标签缝制在袋口时，合格证上生产日期应露出袋口便于查验。

8.3 运输

运输时避免日晒、雨淋、装卸时应轻拿轻放，防止摔撞、重压，严禁与有害、有毒、有异味物品混运。


8.4 贮存

库房应清洁、干燥、阴凉、通风，避免日光直射。产品不得直接接触地面、墙壁。不得与有毒、有害、有异味的物品同库贮存。远离热源，常温下贮存，保质期为6个月。

附录 A

（规范性附录）

梅河大米保护地域范围



附录 B
（资料性附录）
水稻旱育双稀栽培技术

B.1 品种

秋田小町、吉粳 83 等食味特色不低于该品种的中晚熟优质常规粳稻品种。

B.2 土壤条件

草甸型白浆土，或草炭土和河淤土。pH 值 5.1 至 6.35 之间，有机质含量≥2.28%。

B.3 栽培管理

B.3.1 育苗

4 月 10 日～20 日播种。人工插秧旱育稀播，每平方米播催芽种子不超过 200g；机插盘育旱育苗，每盘播催芽种子不超过 120g,适时浇水，通风练苗。

B.3.2 本田移栽

移栽期 5 月 15 日～5 月 31 日。移栽密度：行距×株距为 30cm×(13.3～20)cm，采用人工或机械移栽。

B.3.3 本田肥水管理

施肥按 NY/T394 中 A 级绿色食品规定执行，有机肥和化肥相结合，测土配方施肥，每公顷施氮量（纯氮）≤120 kg。移栽后深水护苗，缓苗后浅水增温促分蘖，之后“浅—湿”交替灌溉，收获前一周撤水。

B.3.4 收获

完熟期采用人工或机械收割、脱粒，自然晾晒，按品种单收、单贮。